

الادمان

دراسة نفسية لأسبابه ونتائجه

دكتورة

عفاف محمد عبد المنعم

0167297



مكتبة
Bibliotheca Alexandrina

الجامعية
رابعة - ١٦٣-٢٨٣
الصفحة - ٢٦٦٧٧٠٩

الإدمان

دراسة نفسية لأسبابه ونتائجه

الادمان

دراسة نفسية في أسبابه ونتائجه

دكتورة

عفاف محمد عبد النعم

١٩٩٤

دار المعرفة الجامعية

٤٠ شارع سويف - الأزاريطة - ٤٨٣٠١٦٢
٢٨٧ شارع النيل - سويف - ٥٩٧٣١٦٢

إهداء

إلى

مدير ومرا

مقدمة

شهدت المجتمعات محلياً وعالمياً أزمات نتاج التطور السريع الملحوظ. وتعتبر مشكلة تعاطي العقاقير المخدرة بأنواعها العديدة من الظواهر الخطيرة التي تحتاج دول العالم في عصرنا الحالي. وقد نالت هذه الظاهرة اهتمام عدد كبير من الباحثين والهيئات العالمية والإقليمية ورصدت الأموال وخضعت العقول لدراساتها. لمحاولة الوصول لحل يحد من انتشارها والسيطرة عليها.

وللإعتماد على المخدرات شروط أوردتها منظمة الصحة العالمية World Health Organization وهي:

(أ) وعى ذاتي برغبة مندفعة للتعاطي.

(ب) مؤشر التكيف العصبي حيث يتم التعاطي ولكي يتجنب المدمن الأعراض المؤلمة مثل الصداع، التوتر، عدم القدرة على التركيز، واضطرابات الإدراك .. وغيرها.

(ج) يحظى الإدمان بأولوية تفوق أهمية باقي مظاهر السلوك اللازمة للحياة. فالمدمن يعطي الأهمية للحصول على المخدر بقدر يفوق أولوية حصوله على أي شيء آخر مهما كان مهماً وضرورياً⁽¹⁾. ولالإدمان تعريفات متعددة سنوردها في جزء لاحق من هذا الكتاب ونخلص من هذه التعريفات إنه حالة (تعلق / اعتماد) شديد من جانب الشخص على تناول مادة ما، بغرض إحداث تغييرات نفسية من خلال تأثير هذه المادة على الجهاز العصبي. لبعض هذه المواد خاصية التدخل في كيميائية

(1) W.H.O International Program on the Diagnosis and classification of mental Disorders; Subgroup 4: Alcohol and Drugs Related Problems. Washington, 25-29th Augst 1980.

الجسم بحيث يعتادها الجسم ولا يعود قادراً على الاستغناء عنها بدون تعرضه لاضطرابات (تد تصل إلى حد الموت). وفي هذه الحالة نتكلم عن الاعتماد الفيزيولوجي Addiction على أية حال فإن مصطلح الإدمان يطلق على حالات التبعية النفسية والفيزيولوجية لمادة الإدمان. وعلى ذلك فإن حدوث الإدمان يحتاج إلى توافر عوامل ثلاثة هي :

١ - توافر المادة المدمنة (ويختلف حال الفرد ومظاهر الإدمان باختلاف المادة المستخدمة).

٢ - الشخص المدمن (شخصية قابلة للاعتمادية أو لظروف خارجية خاصة تخضع لها).

٣ - الظروف البيئية والاجتماعية (اللحظة الاجتماعية - الثقافية)^(١) وهناك بعض علماء النفس الذين يصنفون مشكلات إدمان المخدرات ضمن السلوك المضاد للمجتمع أو السلوك السيوكيائي فهناك مجموعة من العوامل الاجتماعية تسهم في هذه المشكلة وتجعل منها خطراً يهدد الأمة والتقدم فيها ، وكذلك هناك عوامل فردية كامنة في شخصية المدمن تقوده للإدمان ، وقد نظر الكثير من العلماء والباحثين إلى الإدمان كسلوك مرضي باعتباره إحباطاً لا يقوي الراشد على مواجهة آثاره النفسية بحلوله واقعية مناسبة سواء أكان ذلك نتيجة لضخامة الاحباط أو الاستعداد وعدم قدرته على احتمال الاحباط . فالإدمان محصلة لعوامل مركبة بعضها فيسيولوجي والبعض الآخر سيكولوجي - اجتماعي.

فالمدمنون يشتركون في معاناتهم من اضطرابات الاتصال على مختلف الصور ، فمواد الإدمان تؤثر أولاً على وعي المدمن وعلى حواسه مما يؤدي لاضطراب اتصاله بالواقع وبالأخرين ، خلل الاتصال هذا يجابه

(١) محمد حسن غانم. العلاج النفسي لمشاعر الرضخ والحجل لدى المدمنين. مجلة الثقافة النفسية، مركز الدراسات النفسية والنفسية - المجدية، العدد الثامن، المجلد الخامس ١٩٩٤. ص ص ١٧ - ١٩.

تلقائياً بقساوة الواقع ويردود فعل الآخرين التي تعقد هذا الخلل وتوجهه إلى مرحلة حرجة قد تصل إلى حدود انقطاع الاتصال.

إن تأثير المواد على صعيد الجهاز العصبي ينعكس بإضطراب احساس المدمن بذاته وجسده وبالعالم الخارجي . هذا الاضطراب يخلق علاقة مضطربة بين المدمن والواقع بدءاً من اضطراب احساسه بالوقت ووصولاً لإضطراب اتصاله مع الواقع والآخرين. وقد تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بمشكلة الإدمان نظراً لاستعمالها وإرتباطها بالعديد من المشكلات الخطيرة والمدمرة، وينعكس هذا الاهتمام فيما تقوم به الدولة على اختلاف أجهزتها من جهود سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي عن طريق التعاون الدولي في سبيل مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها والذي يتخذ اشكالاً متعددة للمقاومة منها : مكافحة الأمتية، القانون، الاتفاقيات الدولية وهي ما يسمى بمكافحة العرض. ثم ما بعد ذلك ما تتطلبه جهود الوقاية بأشكالها المختلفة ثم التوعية والعلاج سواء أكان هذا العلاج طبي أو نفسي أو اجتماعي وأخيراً إعادة تأهيل ثم إعادة استيعاب اجتماعي للمدمنين في المجتمع بعد شفائهم.

كما أننا يجب أن نفرق بين الإدمان والتعود... فكثيراً ما نسمع أن فلاناً يأخذ قرصاً منوماً منذ عشرين سنة وقد أصبح مدمناً وأن آخر يتناول الأقراص المهدئة يومياً لتحمل مشقة أعماله وأنه في عداد المدمنين وأن تلك السيدة لا تستطيع تحمل زواجها إلا بالاعتماد على بعض المطمئنات وهي الآن مدمنة ، فكل هذه الأمثلة تدل علي التعود أو الاعتماد وهو مختلف تماماً عن الإدمان ، وليس له المضار المعروفة عن الإدمان، لأنه لكي نطلق اسم المدمن على أي إنسان لا بد أن تتوافر فيه الشروط التالية:

■ الزيادة المستمرة في كمية العقار، (أي أنه إذا بدأ بقرص أو بقرصين فبعد شهر يأخذ ٤ أقراص وبعد ثلاثة أشهر يتناول عشرة أقراص... وهكذا) فهنا نشك في الإدمان.

■ الاعتماد التام نفسياً وجسماً على هذا العقار ولا بديل عنه .
وتصبح حاجة الفرد إلى العقار ملحة قهرية وأهم من الطعام والشراب .

- التدهور الاجتماعى ، لأن المدمن لا يمانع من الالتجاء إلى أي وسيلة للحصول على العقار ، من الكذب إلى السرقة إلى التزوير إلى التلغيق مما يؤثر تأثيراً واضحاً على عمله وحياته الزوجية والاجتماعية .

■ وأخيراً ومن أهم أعراض الإدمان ، الأعراض الجانبية الشديدة عند التوقف عن أخذ العقار ، أو الامتناع عنه كمحاولة للعلاج ، فهنا يشعر المريض بأعراض شديدة من آلام فى الجسم إلى عرق غزير إلى أرق شديد ، إلى هياج عصبى وأحياناً أعراض جسمية من إسهال ، إلى سرعة ضربات القلب ... الخ .

■ أما المتعود فهو يأخذ العقار بنفس الجرعة يومية ولا يزيدها بل وأحياناً ينسى أخذها دون حدوث أي أعراض جانبية ومشكلة المدمن تتعدي ذاته وتؤثر على مجال العائلة بأكملها فاهماله لعمله وبيته يجعل الحياة الزوجية محطمة تماماً وينشأ الأطفال فى جو مرضى يسبب لهم عدة أمراض نفسية وعقلية عند نضجهم .

ولكن هذا لا يمنع إنتشار إدمان الحشيش ، والأفيون ، والكوكايين ، ثم حالياً الأقراص المنومة مثل الباربي٣ ، فسباراكس ، فانادروم ، لومنيال ... الخ أو الأقراص المنشطة أو المنبهة مثل الريتالين ، مجموعة الامفيتامين والموجودة فى العقاقير التى تسد الشهية . بل وأخيراً ظهرت عدة حالات إدمان للأقراص المطمئنة إن أخذت دون إشراف طبي مثل كواتيان ، ترنكيلان ، ليبريم ، فاليريم ... الخ .

وانتشرت فى السنوات الأخيرة ظاهرة إدمان عقاقير الهلوسة مثل : ل.س.د . والحشيش فى أوروبا مما جعل الحكومات تنظم حملات للمقوض على مزوجى هذه العقاقير . على أنه من الاسباب التى تدعو الفرد لأن يلجأ للإدمان من وجهة نظره أو حسبما اتفق هى :

■ آلام جسمية مستمرة مثل الصداع المزمن ... آلام روماتيزمية ...
نوبات متكررة من الغص الكلوي أو المراري ... آلام الأورام الخبيثة . إذ
يلجأ المدمن للعقار لتهدئة آلامه ثم يزيد من الجرعة حتى يصل للدرجة
الإدمان لئلا أن كثيرا من مدمني الأفيون بدأوا ذلك عند سماع النصيحة
يأخذ قطعة أفيون لتخفيف آلام الأسنان ثم كسلهم للذهاب إلى طبيب
الأسنان وزيادة الكمية تدريجياً حتى الوصول للدرجة الإدمان.

■ الضغط المتواصل في العمل و الإرهاق الشديد وصعوبة التوافق مع
رؤسائه ومرؤسيه . والخوف المستمر من المسؤولية . وغدث الثقة في الذات .

■ عدم التوافق الزوجي ... فكثيراً ما يلجأ الزوج أو الزوجة إلى
استعمال العقاقير أو الخمر لقتل الملل بعد الزواج أو لاكتشاف عدم توافق
الشخصيات أو لعدم الانسجام العاطفي ، أو لصعوبة الارتواء الجنسي أو
لصعوبات المادية أو لعلاقات عاطفية جديدة ... الخ.

■ الأمراض النفسية والعقلية: فالذي يعاني من حالة قلق نفسي وعدم
الثقة بالذات ، والخلل المستمر والحساسية المفرطة ، وعمله يتطلب منه
الاختلاط بالناس ، ومناقشة الأمور بهدوء ، وهو لا يستطيع القيام بكل
هذه الاعباء ، فهنا يلجأ هذا المريض إلى العقاقير المنشطة أو المطمئنة
وكلما زادت مشاكله زاد من كمية الأقراص حتى يصل للدرجة الإدمان ،
وكذلك الذين يعانون اكتئاباً أو الأرق الليلي فسوف يلجأون إلى الأقراص
النومة للهروب من الآلام النفسية الشديدة وتبدأ في زيادة الكمية
للقضاء على آلامها حتى تصبح في عداد المدمنين . وعادة ما يصاب
المدمن بعدة أعراض عقلية من جراء كثرة ما يتناوله من خمر أو أقراص ،
ويصبح في حالة هياج عصبي مستمر ، ويثير المشاكل والمشاحنات مع
عائلته وأولاده ، وإن لم يحصل غلى العقار بسهولة فلا مانع عنده من
الحصول عليه بالقوة والصنف والتهديد لأنه يصبح في حالة شبه جنونية.

ومهما تغير العقار فإن المدمن يظل مستعداً للإدمان^(١) ولقد أدى الاهتمام والبحث في طرق السلوك الاعتمادي إلى ابتكار عدة تكنيكات علاجية ، ورغم أن بعض هذه الأساليب حصل على دعم امبريقي يؤكد فعاليتها ، فإن البعض الآخر ما زال في حاجة إلى مزيد من التقويم ، ولما كان الإدمان يمثل مشكلة متعددة الأبعاد فقد ظهرت الحاجة إلى تكامل عدد من التكنيكات العلاجية لتقديم برامج علاجية شاملة .. ورغم التحسن الملحوظ في عائد هذه التكنيكات ، فما زالت هناك بعض المشاكل المنهجية مما يدعو إلى التزايد المطرد للمشكلات المرتبطة بالإدمان إلى زيادة البرامج الوقائية بدرجاتها المختلفة .. لأن البرامج العلاجية في حد ذاتها ليست كافية لمواجهة الآثار النفسية والجسمية المترتبة على الإدمان ، كما أنه لا بد وأن تتطور أهداف العلاج في ضوء الفحص الشامل لجوانب حياة المدمن مثل خبراته الماضية وقدراته وإمكاناته والاضطرابات الأخرى التي يعاني منها والخلفية الاجتماعية والثقافية له .. على أن تشمل خطة العلاج أهدافاً قصيرة المدى ، وأخرى طويلة المدى مع اختيار التكنيكات ذات الكفاءة العالية وأن تخضع هذه التكنيكات واخطط العلاجية للمراجعة والتجديد باستمرار^(٢).

فلا بد أن يكون العلاج للإدمان علاجاً متكاملاً. وهذا العلاج المتكامل يتألف من ثلاث مكونات أساسية ، أحدهما طبي والآخر نفسي والثالث اجتماعي. المكون الطبي : فيقوم المكون الطبي على مهدين رئيسيين : مبدأ النظام التدريجي للمدمن من المخدر الذي أدمنه أو مبدأ سد القنوات العصبية التي يسلكها المخدر داخل جسم المدمن للتأثير في سلوكياته.

(١) محمد رفعت، ١٩٨٠، الأمراض النفسية والعصبية، بيروت: دار النهضة العربية. ص

ص ٩٦ - ١٠٤

(2) Nierenberg, T.D., Treatment of Substance abuse, In: C. Walker(Ed) Hand book of Clinical Psychology, Dowsones - Irwin. 1982.

فإذا اختار المعالج الطريق الأول ، طريق القطار التدريجي ، فإنه ينتقى للقيام بهذه المهمة مخدراً أضعف بكثير من المخدر الذي أدمنته الحالة ولكن من نفس فصيلة المخدر. ويعطى المدمن هذا المخدر البديل بجرعات وعلى فترات محددة، على أن تخفض الجرعة وتطول الفترات بين الجرعات تدريجياً حتى ينتهى الأمر إلى قفاز كامل للحالة.

أما إذا اختير الطريق الثانى، طريق سد القنوات العصبية، فإنه ينتقى لذلك عقاراً يتلخص تأثيره فى سد المستقبلات العصبية العدة أساساً فى مخ المدمن لاستقبال العقاقير ثم توزيع آثارها العصبية السلوكية فى جسم المدمن . ويستمر فى إعطاء هذا العقار حسب نظام محدد ولفترة محدودة حتى ينتهى الأمر بالمدمن إلى أن يعود بجسمه إلى حالة التوازن الفزيولوجى دون حاجة إلى وجود المخدر أو مشتقاته . ويصحب ذلك إنطفاء اللفتة إلى المخدر.

■ المكون النفسى من المعروف أن هناك أساليب متعددة للعلاج النفسى لحالات الإدمان على إختلاف أنواعها ، كما أنه يجرى ابتكار المزيد من هذه الأساليب فى الآونة الراهنة مما ينشر مزيد من الآمال المعلقة على المستقبل المنظور. ومن أشهر العلاجات النفسية الحديثة فى الميدان ما يعرف بمجموعة العلاجات السلوكية للإدمان . وهى تعتبر من الثمار الرئيسية لتطبيقات العلوم النفسية الحديثة فى ميدان الاضطرابات النفسية . وتقوم فى مجموعها على سلسلة أساسية مؤداها أن جميع أشكال السلوك الصادرة عن الفرد بما فى ذلك التباطى والإدمان إنما هى أشكال تكتسب وتنمو فى ظروف حياتية (أى بيولوجية نفسية اجتماعية حضارية) معينة ومن ثم تصدق عليها قوانين اكتساب العادات وغورها ، وكذلك قوانين وإجراءات التخلص من العادات أو تعديلها . ومعنى ذلك أن العلاج يتطلب قدر من الإجراءات العلاجية المعقدة، ومن أشهر طرق العلاج السلوكى فى هذا الصدد طريقة بودن H.M.Boudin وهى تعتمد على ثلاثة مقومات رئيسية هى:

١ - تدريب المدمن على ملاحظة الذات ورصد ما يصدر عنها Self monitoring.

٢ - التدريب على تقييم الذات Self-evaluation بناء على ما يصدر عنها.

٣ - برمجة تعديل السلوك بناء على المعطيات التي نصل إليها من البندين السابقين.

ويستغرق انجاز هذا البرنامج بضعة شهور ويمكن تطبيقه علي مدمنين محتجزين داخل المصحات ، كما يمكن تطبيقه علي أساس نظام العيادة الخارجية ، وقد جرب هذا النظام العلاجي على عدد من مدمني الهيرون في مدينة فلوريدا الأمريكية وكانت نتائجه على درجة عالية من الكفاءة .

■ المكون الاجتماعي : ويطلق عليه اسم الرعاية اللاحقة وتنقسم إلى قسمين هما : إعادة التأهيل ، Rehabilitation وإعادة الاستيعاب الاجتماعي Social reintegration .

■ إعادة التأهيل. فغالبا ما يستخدم مصطلح إعادة التأهيل في مجال علاج التعاطي والإدمان استخداماً واسعاً ليضم ما يوصف بأنه إعادة التأهيل المهني والمقصود به هو العودة بالمدمن إلى مستوي مقبول من الأداء المهني وتتضمن إجراءات إعادة التأهيل في هذا الصدد ثلاثة عناصر هي : الارشاد المهني Occupational Counselling ، وقياس الاستعدادات المهنية Occupational aptitudes والتوجه المهني Occupational guidance والتدريب Training .

■ إعادة الاستيعاب الاجتماعي ويعتبر إعادة الاستيعاب الاجتماعي هو الخطوة الأخيرة والمكملة لإجراءات الرعاية اللاحقة ولا يشترط أن تأتي زمنياً بعد فترة إعادة التأهيل المهني، بل يمكن تصور تزامن الخطوتان^(١).

(١) مصطلح سوب، المخدرات والمجتمع. نظرة تكاملية. عالم المعرفة ، العدد ٢٠٥ ص ص

الفصل الأول

- مقدمة.
- الحجم العالى للمشكلة.
- النول الأمريكية.
- آسيا والشرق الأقصى.
- أوروبا.
- الشرق الأدنى والأوسط.
- استراليا ونيوزيلندا.
- حجم المشكلة محليا.

مقدمة :

تعتبر المخدرات قسماً من أقسام المكيفات التي قد يدفع الفرد الى تعاطيها نتيجة أسباب اجتماعية أو نفسية أو شهوانية أو نتيجة لطبيعة حرفة المدمن ومهنته، ويدأوم تعاطيها تتأصل في نفسه عادة الإدمان بحيث لا يستطيع التخلص منها بسهولة دون أن تترك في نفسه أثراً وضراً. وهذا الأثر وذلك الضرر يختلفان باختلاف نوع المخدر موضوع الإدمان ومقدار ما يتعاطاه المدمن منه، وأوقات التعاطى وحالة المدمن الصحية والعصبية والنفسية.

وللمخدرات آثار سيئة وتأثير أسوأ على الأجسام والعقول وهذا ما دفع الكثيرين للكتابة عن هذه الميساوي ويصفونها بما أحسوا به ولا يحظه من فعلها، وقد وصف المقريزي سيطرة المخدرات وتأثيرها وخواصها فذمها ذمًا شديدًا وعدّد قبائح مدمنيها ومستعجليها، وما فعل بعض الملوك في شأن ابطالها. (١)

فمعظم بلدان العالم عرفت تعاطى المخدرات بأنواعها المختلفة في فترة أو أخرى من فترات تاريخها. فمعظم الشعوب أكتشفت وأستعملت أنواعاً مختلفة من النباتات المخدرة لأغراض التخدير والعلاج على الأقل إلا أن تعاطى المخدرات لأغراض غير طبية قد اتخذ صورة وبائية في بعض المجتمعات أكثر من غيرها ويعتبر تعاطى المخدرات غلطاً سلوكياً وثقافياً، فشيوع استعمال المخدرات في أى مجتمع يعتمد أساساً على الأنماط الاجتماعية، كالاتجاهات السيكولوجية للمخدرات أو الشخصية السيكولوجية العامة للمدمنى المخدرات، فيختلف المخدر المستخدم في كل

(١) أنور المصري ١٩٥٥، المخدرات آثارها وجرائمها وعقوباتها. القاهرة: مكتبة الخانجي.

بلد تبعاً للعوامل الحضارية المحددة لهذا البلد.^(١)

ويعتبر إدمان المخدرات من أكثر الأمراض الاجتماعية انتشاراً في العالم بأسره، فيذكر من يؤرخون لانتشار تعاطي المخدرات أن منطقة البحر الأبيض المتوسط وخاصة أفريقيا وآسيا، كانت من الوجهة التاريخية من أول مناطق المخدرات وأن هذه الآفات انتقلت منها بعد ذلك إلى الهند والصين وبعض البلدان في أوروبا ثم أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

والطبيعة البشرية تسعى دائماً وأبداً إلى الوصول إلى اللذة والبعد وتجنب الألم وكل ما يؤدي إلى المتاعب، فنجد أن المخدرات هي تلك الأداة التي توفق بين اللذة والألم، فبمذ بزوغ الحضارة استخدمت المخدرات كوسيلة لإحداث تغيرات في حالات الوعي والشعور والسعادة واليقظة والتنبيه، فالمخدرات تحدث تغيرات عميقة فيها وتضيف لها أبعاداً جديدة^(٢). ومن هذا يبدو لنا أن تعاطي المخدرات ظهر وانتشر منذ آلاف السنين، ولكن إساءة الاستعمال لهذه المخدرات وإدمانها هو الشكل الأكثر ملاحظة وانتشاراً في القرن العشرين، فما من يوم لم تطلعنا فيه جريدة محلية أو عالمية أو نشرات الأخبار عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات المهربة، وضبط أنواع جديدة من العقاقير، وما يشكل الفرع من هذا الانتشار للمخدرات هو انتشارها بين الشباب، ويعتبر انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب من أكثر الأزمات التي يمر بها المجتمع لأن الإدمان لا يقتصر أثره على الشخص فقط ولكن له أثره السيء أيضاً على من يحيطون به فالتعاطي يخلق حالة من التعود مما يجعل الفرد المتعاطي يشعر بحاجة شديدة إلى تكرار تناولها وتكرار هذا التعاطي يسبب ضعفاً

(١) سمير نعيم أحمد ١٩٧١. الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لتعاطي المخدرات.

القاهرة: المكتب الدولي العربي لشئون المخدرات. ص ٧.

(2) Belknap J. K., 1978, Drugs and Human Behaviour, In: Joltzman, W.H., (ed) Introductory Psychology in Depth-developmental Topics; New York: Harper's College Press P. 256.

جسيمياً حتى أن المدمن ليعرف من شكله الخارجى من نحافته وشحوب وجهه واضطراب مشيته، ويساعد على هذا الضعف زيادة كمية المخدر التى يتعاطاها المدمن تدريجياً، وفقدان شهيته للطعام، وكذلك فإن للمخدرات تأثير سئ على المخ والقوى العقلية، كما يسبب الإدمان على المخدرات هبوط مستوى أخلاق متعاطيها، ويتصف بحب الذات وعدم الشعور بالمسئولية والى التكرار لمبادئ الأمانة والشرف، وغالباً ما تتعدى أضرار الإدمان الشخص المدمن لتمتد الى أسرته، فقد يفقد المدمن مورد رزقه بسبب تدهم صحته ونقص كفايته الجسمية والعقلية. وهو من وجهة أخرى يفسد أسرته باعتباره رب أسرته بسبب هبوط مستوى خلقه وفقدان شعوره بالمسئولية فقد تنحل الأسرة بالطلاق.

وقد أشارت منظمة الصحة العالمية فى أحد تقاريرها أن إنتشار تعاطى العقاقير يزداد بصورة واضحة بين الأطباء والمرضات، ورجحت ذلك بأنه يرجع لطبيعة عملهم الذى يجعلهم يتدمجون بين هذه الفئات ولعلمهم بالأدوية وما تجلبه من راحة، فإذا تعب أحدهم لجأ الى المخدر لكى يخفف الآلمه، وإذا شعر بالأرق لجأ الى منوم لكى يكف من أرقه الى غير ذلك من الأسباب، وكذلك فالأطباء يملكون دائماً إمكانية الحصول على المخدر وكيفية استعماله. (١)

وتختلف النظرة لموضوع الإدمان بحسب تخصص العالم والباحث، فعالم الفارماكولوجى يرى أن المخدرات لها تأثيرات كيميائية عميقة على جسم الإنسان، مما يجعله يستمر فى تعاطي المخدرات، ويرى علماء الاجتماع أن الضغوط البيئية والحرمان والفقر والمشاكل الاجتماعية هى

(1) Pescor M.J., 1980, "Physician Durg Addicts", In: Griffith Ed-ward and Awin Arfith (eds), Durg Problem in the Sociocultural Context A Basis for Polices and Programme Planning. New York, Geneva. P. 164.

المسببة للإدمان، وكذلك قد يكون الإدمان ناتجاً عن توافر المخدر وعدم
تحریم تعاطيه أو لأسباب خاصة بالفرد كالمريض، والأرق، أو الرغبة فى
المتعة... الخ. (١)

وبالبحث فى هذا البحث ترى أن الإدمان مشكلة نفسية ناجمة عن
اضطرابات فى شخصية الفرد المدمن وعدم تكيفه مع الواقع المحيط به
كذلك ناتجة عن ظروف اجتماعية دفعت المدمن الى اللجوء الى المخدر
كمخرج له من هذه الاضطرابات.

الحجم العالمى للمشكلة :

يحدثنا التاريخ أن الانسان قد عرف المخدرات منذ العصور الأولى
التي ترجع الى العصر الحجري، حيث أستخدمتها بعض القبائل فى
طقوسها الدينية وأستخدمتها كثير من المجتمعات لمعالجة بعض الأمراض
كآلام المفاصل والنقرس والامساك والذهول كما عرفها إمبراطور الصين
شن ننج Shen neng منذ ٢٧٠٠ سنة قبل الميلاد وقد روى المؤرخ
هيريوت منذ ٥٠٠ سنة قبل الميلاد أن قبائل الست البربرية -Scythees-
التي كانت تقطن فى شمال البحر الاسود بالباكستان أو فى القوقاز
كانت تقوم بحرق حبوب القنب الهندى لاستنشاق الأدخنة المتصاعدة منه.
وأن أكثر ما يلفت النظر فى ظاهرة إدمان المخدرات بأنواعها المختلفة أنها
ظاهرة انتشرت فى أقدم وأعرق مجتمعات حضارية مثل الهند، والصين،
والعراق، ومصر، ولم يكن شيوخ الإدمان فى تلك المجتمعات ظاهرة ملازمة
لتحضرها، بل لتحقيق الإدمان فيها بعد فترات من رقيها وغناها تجار
المخدرات من الخارج وإبان مرحلة اضمحلالها الحضارى، وقد قامت
بحضارة هذه المجتمعات على اكتشاف الزراعة والبناء الزراعى لنظام
الانتاج، وسيادة نظام الزراعة كقيلة باحداث تغيرات جوهرية فى طبيعة

(١) سليمان الجندي ١٩٧١، ظاهرة إدمان المخدرات بين خطر واقع وخطر يتوقع. القاهرة:
المكتب الدولي العربى لشئون المخدرات. ص ٩٩.

الانسان، فاستقرار الانسان والتزامه بالرقعة الزراعية دفعه ومكنه من تقييد علاقاته الاجتماعية ومن ضبط أكبر نزعاته الحيوانية، وقد ترتب على اكتشاف الزراعة أن أصبح الانسان لأول مرة فى تاريخه ينتج أكثر مما يستهلك و زاد لديه فائض الانتاج، وانعكس كذلك على البناء الاجتماعى، فظهر نظام الحرف والتخصص وانعكس ذلك على التكوين الاجتماعى فظهرت الطبقات الاقتصادية، ففائض الانتاج قد سمح للبعض أن يتفوقوا فى ملكيتهم إلى الحد الذى يمكنهم من استغلال الغير. ويشير تاريخ الملكية إلى أن الزراعة قد خلقت لأول مرة فى التاريخ الانسانى موقف التبعية بدلاً من العبودية وظل تأثيرها نشطاً فى ارساء نظام الطبقات الاقتصادية وتبعية الانسان مرة أخرى الى مالك مصدر الانتاج مهد إلى تكوين مجال نفسى واجتماعى مناسب للإدمان كمرض نفسى اجتماعى، كما أن النظام الصناعى فى دول أخرى قد جعل هذا المجال فرصة له ينمو من خلالها بواسطة المخدرات. (١١)

ولم يكن ينظر الى مشكلة إدمان المخدرات حتى نهاية القرن التاسع عشر على أنها مشكلة دولية تتطلب اتفاقاً متعدد الأطراف، كما تستلزم عملاً جماعياً على نطاق عالمى، وكان الاعتقاد الغالب أن إساءة استعمال المواد المحدثة للإدمان كالأفيون وأوراق الكوكا والحشيش راجع إلى العادات المتأصلة لدى السكان فى بعض الأقطار مما ساعد على الاعتقاد بأن المشكلة داخلية لا تهم سوى الشعوب التى تعانى منها، ولكن بعد ذلك أستجبت بعض التطورات التى جعلت مشكلة المخدرات مشكلة عالمية، وقد شملت هذه التطورات اتساع التجارة الدولية وما أدت إليه طبيعة المجتمع الصناعى الحديث من ايجاد جو سيكولوجى قرعزع فيه الإدمان نظراً لما أسفر عنه تعقد الحياة من زيادة الطلب على المخدرات المنشطة ومشتقاتها.

(١١) أحمد فايز ١٩٨١، الأمراض النفسية والاجتماعية - دراسة فى اضطراب علاقة الفرد بالمجتمع - القاهرة: مطبعة النسر الذهبى. ص ٤١٤ - ٤١٥.

فإدمان المخدرات أو بيعها أو امتلاكها لا يقتصر على شعب دون غيره أو على بلد معين، ولكن ظاهرة إدمان المخدرات تفشت في كل شعوب العالم، وأصبحت خطراً يهدد العالم بأسره، فإدمان المخدرات خطر يهدد الدول الصناعية المعتمدة على التكنولوجيا، كما يهدد التنمية التي تعاني من سوء الأحوال الاقتصادية.

ويمكن أن نقرر بصفة عامة أن تعاطى المخدرات بأنواعها المختلفة وخاصة الأفيون ومشتقاته والحشيش وعقاقير الهلوسة والحبوب والمنهيات والمنومات التي تؤدي للإدمان سينتشر بصورة وبائية خطيرة في النصف الثاني من القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية لعدة مؤشرات هامة هي:

١ - تنوع المخدرات التي تتعاطاها فئات الجمهور المختلفة وظهور أنواع جديدة دائماً، فهناك تعاطى الحشيش الذي يعرف باسم الماريجوانا - Marijuana - وتعاطى الأفيون بمختلف مشتقاته وخاصة المورفين الذي يؤخذ عن طريق الحقن في الشرايين، وكذلك الهيروين، وكذلك بغض المخدرات المشابهة للأفيون ومشتقاته في الخصائص التخديرية ولكنها محضرة معملياً لأغراض طبية مثل: المبردين Mepridine والميثادون - Methadon كما ينتشر تعاطى الحبوب المخدرة مثل النيمبيوتال Nembutal والسيكونال Seconal، وهما ينتميان إلى البارابيتيورات Barbiturates، وينتشر استعمال البنزدرين Benzdrin والكوكايين Cocaine وعقاقير الهلوسة المعروفة باسم Lesergicacid Dytheiamide (Lsd)، وظهر أخيراً نوع جديد من الإدمان بين المراهقين والأطفال هو إدمان إستنشاق المواد الطيارة الداخلة في صناعة الصمغ الذي يعرف باسم Glue Sniffing.

٢ - التزايد المستمر في أعداد المتعاطين الذين يتعاطون المخدرات المختلفة بين الجمهور في الولايات المتحدة.

٣ - التزايد المستمر في عدد مدمني المخدرات بين الشباب والمراهقين

حيث أثبتت الدراسات أن ٦٠٪ من مدمنى المخدرات تتراوح أعمارهم بين ١٧ - ٢٥ سنة.

وبالرغم من الجهود المتزامنة لمعرفة عدد المتعاطين فى أمريكا، إلا أن كل البحوث والاحصائيات لم تنجح فى الحصر الكامل لعدد المتعاطين هناك، وسواء وصلت الدولة إلى تقدير دقيق أو لم تصل، فإن المشكلة متفشية فى الولايات المتحدة بصورة أذهلت الباحثين والمستولين وجذبت إنتباههم سواء فى دوائر البوليس أو فى ميادين الطب والعلاج أو فى مجالات الشباب، والجريمة إلى أن انتهى الأمر إلى عصابة الأمم المتحدة.^(١)

وقد بين الإحصاء الذى عرضه قسم المخدرات فى دورته السابعة عشر عام ١٩٦٢ أن بلاد العالم تنقسم إلى ثلاثة مجموعات هى:

(أ) المجموعة الاولى: وتتكون من ٢٩ دولة يوجد بها مدمن واحد بين كل ١٠٠٠ أو أقل من السكان وهى أعلى نسبة فى الإدمان ومن هذه الدول مصر.

(ب) المجموعة الثانية: وتتكون من ٢٧ دولة، ويوجد بها مدمن واحد بين كل ١٠٠٠ - ٥٠٠٠ شخص من عدد سكانها.

(ج) المجموعة الثالثة: وهى تمثل باقى دول العالم ويوجد بها مدمن بين كل ٥٠٠٠ شخص أو أكثر من السكان.

وهناك التقرير الذى بعثت به الدول الأعضاء فى هيئة الأمم المتحدة إلى شعبة المخدرات تنفيذاً للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام ١٩٦١، المعدلة ببروتوكول ١٩٧٢، وتشير احصائيات المخدرات من ١٩٤٧ - ١٩٧٩ إلى أن أكثر المخدرات انتشاراً فى العالم هو الحشيش الذى بلغ أعلى معدل لضبطه عام ١٩٧٩، حيث بلغت الكمية المضبوطة منه ٦٥٨١ طناً وأن أقل أنواع العقاقير انتشاراً هى عقاقير الهلوسة التى بلغ أعلى معدل

(١) حامد عبد السلام زهران ١٩٧٧، علم النفس الاجتماعى. القاهرة: عالم الكتب ص ١٥.

لضبطها عام ١٩٧٥، ١١ كجم بالإضافة الى ٢٠٦٠٠٠ جرعة، كما تشير الإحصائيات إلى أن مجموعة الكوكايين سجلت أعلى معدل للتصاعد بعد عام ١٩٧١ حيث كان إجمالي المضبوط من عقاقير هذه المجموعة لا يتجاوز الطن الواحد سنوياً، ثم أخذ يتزايد بشكل يندرج بالخطر الشديد وخاصة في أمريكا الشمالية والجنوبية، وأوروبا الغربية، إلى أن وصل عام ١٩٧٩ إلى حوالي ٧ طن وقد وضع من الإحصائيات أن حجم مشكلة المخدرات قد زاد زيادة عظيمة في العشر سنوات الأخيرة، وفيما يلي عرض لانحياها المخدرات في كل مناطق العالم المختلفة: (١)

١ - أفريقيا :

ما زال الحشيش هو المخدر المفضل لدى المتعاطين في أغلب الدول الأفريقية ولكنه لم يعد وحده، بل انتشر تعاطي الامفيتامينات Amphetaminats والبارابيتورات Barbiturates والميثاكالون Methacholون وخاصة في المناطق الحضرية.

٢ - الدول الأمريكية :

الاتجاه الغالب في الدول الأمريكية هو ارتفاع تعاطي الحشيش والكوكايين والامفيتامينات، والبارابيتورات، والميثاكالون، وقد زاد معدل الهيروين في مناطق الشمال الشرقي في القارة، وأستمر انتشار تدخين عجينة الكوكا في بيرو وتزايد تعاطي الكوكايين في دول أمريكا الشمالية، ودلت التقديرات الأولية التي وضعتها الحكومة الفيدرالية أن عدد مدمني الكوكايين يتراوح بين ١١ - ١٢ مليون مدمن. وقد أرتفع معدل تعاطي الحشيش بين أطفال المدارس، وما زال تعاطي الفينكلورين منتشراً بين الشباب في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وقد انتشرت

(١) الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (١٩٨٢): التقرير السنوي. القاهرة: هيئة المطابع الأميرية. ص ١١٥.

إساءة استعمال عقاقير الهلوسة LSD في كثير من دول القارة، وكذلك انتشرت إساءة استعمال المذيبات الطيارة مثل الاسيتون والتولدين وخاصة بين الشباب في سن المراهقة.^(١)

٣ - آسيا والشرق الأقصى :

يمثل تعاطي الهيروين بين الشباب في المناطق الحضرية مشكلة رئيسية في بورما وتايلاند وستغافورة وماليزيا وهونغ كونج، وكذلك تعاطي المورفين، ويقبل متوسطو العمر على تعاطي الأفيون عن طريق التدخين، ويزداد تدخين الحشيش بصورة وبائية إلى حد كبير بين الشباب والطلبة في اليابان، وكذلك زادت مشكلة الحشيش تفاقماً في الهند بين العمال ذوي الدخل المنخفض وكذلك زادت المشكلة وضوحاً في ماليزيا، مما أدى إلى جعل وحدة العمل الوطني التابعة لمجلس الوزراء توصي بفرض الاعدام عقوبة على من يحوز أو يحرز عقاقير مخدرة تزيد عن ٢٥ جم أو أكثر.^(٢)

٤ - أوروبا :

استمرت الزيادة الحادة في تفشي تعاطي الهيروين وخاصة عن طريق الحقن في كثير من دول أوروبا الغربية، وزادت الكميات المتاحة من الهيروين في هذه الدول، وكذلك زاد الأفيون ومشتقاته. وقد تحدد عدد المدمنين في ألمانيا الغربية بفرد إلى عشرة آلاف فرد سنة ١٩٥٣. أما في إنجلترا فقد ارتفع عدد المدمنين من ٣٥٩ سنة ١٩٥٧ إلى ١٣٤٩ سنة ١٩٦٦.

وقد زادت بالتالي أعداد الوفيات بين متعاطي الهيروين، وكانت أغلب هذه الوفيات بين الشباب. وقد شهد عام ١٩٧٩ في ألمانيا الغربية ٦٢٣ حالة، وفي إيطاليا ٢٩٠ حالة، وفي سويسرا ١٠٢ حالة، وفي عام ١٩٨٠

(1) Mc Clathim, W.G. 1975, Sociocultural Factors in Marijuana Use in United States in: Rubin V., (ed), Cannabis and Cultural, New York: Mouton. P. 131.

(2) Schultes R. E., et al, 1968, Gannabis. New York: Harvard University. P. 339.

كان عدد الوفيات ٤٩٤ حالة فى ألمانيا الغربية، وفى ايطاليا ٣٠٥ حالة وفى الدنمارك ١٥٠ حالة، وفى النمسا ٥٦ حالة، وارتفع فى الدول الأوروبية معدل التعاطى لأكثر من عقار واحد وفى الاتحاد السوفيتى توجد حالات متعددة لتعاطى المورفين وخاصة بين المرضى وكذلك تعاطى محدود للحشيش.

٥ - الشرق الأدنى والأوسط :

تكاد جميع دول الشرق الأدنى والأوسط تواجه مشكلة إساءة استعمال الحشيش والأفيون، فبينما ينتشر فى مصر تعاطى الحشيش، نجد أن الأفيون هو الأكثر انتشاراً فى إيران وباكستان وكذلك الهيروين الذى يعد مدمنة فى إيران بحوالى خمسين ألف مدمن. ويقابل تدفق الأفيون من الشرق إلى الغرب تدفق المواد النفسية (الامفيتامينات، الباربيتورات، وعقاقير الهلوسة) من الغرب إلى الشرق. بالإضافة إلى تدفق حامض الخليك اللامائى من بعض دول أوروبا الغربية لاستعماله فى صناعة الهيروين فى بعض دول الشرق الأدنى.

٦ - استراليا ونيوزيلندا :

قدر عدد مدمنى الهيروين المزمنين فى استراليا بحوالى ١٢٠ ألف مدمن، وقدر عدد متعاطى الحشيش بحوالى ٥٪ من السكان الذين تجاوزوا سن الرابعة عشر. وكذلك فى استراليا اتجه نحو تعاطى مزيج من أكثر من عقار. (١١)

وفى تقرير للجنة الدولية للمخدرات التابعة للأمم المتحدة يقدر عدد مدمنى الحشيش بحوالى ٣٠٠ مليون فرد عام ١٩٧٩. ويقدر فورت fort ١٩٦٥ عدد من يستخدمون المنبهات فى العالم عام ١٩٦٢ بحوالى خمسة مليون فرد، كما يقول أن هناك ١٠ مليون مدمن مخدرات ومئات

(1) Schaeffer, J., 1975, The Significance of Marijuana in a small Agricultural Community. Mouton: The Hauge and Paris. P. 119.

الالوف ممن يستخدمون عقاقير الهلوسة وبخاصة (LSD)⁽¹⁾.

كما تقدم يتضح لنا مدى تفاقم خطورة مشكلة إدمان المخدرات بصورة أذهلت كل العاملين في هذا الميدان، وإن كان الانتشار يختلف في توزيعه الكمي وأيضاً في نوع المخدر المنتشر في كل بلد إلا أن هذا لا يمانع من وجود المشكلة في كل دول العالم من أكبر الدول تقدماً إلى أصغرها نمواً وتنمية. ولكن هذه الأرقام والاحصائيات لا تقبل عدد المدمنين تمثيلاً صادقاً، ولكن هي إثبات لما هو موجود بالفعل في قبضة رجال الشرطة وعيادات العلاج. ولكن ليس كل المدمنين يمتدحون للعلاج وليست لديهم الرغبة في التخلص من الإدمان، وهذا يوضح أن عدد المدمنين خارج هذه الاحصائيات ربما يضاعف هذا الرقم المحصور أو يزيد.

حجم المشكلة محلياً :

يحدثنا التاريخ أن الانسان المصري قد عرف المخدرات منذ زمن بعيد، ففي النقوش الفرعونية التي وجدت على المقابر الفرعونية ما يثبت أن قدماء المصريين قد استخدموا الأفيون في عمل وصفات دوائية. وكذلك كان هناك انتشار للحشيش الذي يرجع إلى القرن الثالث عشر الميلادي. ففيما يذكره المؤرخون أن الحشيش كان يعرف في مصر بالحشيشة. وابن البيطار هو أول طبيب مصري وصف التخدير الذي يحدثه القنب الهندي النبات في مصر، وذكر أنه يزرع في بساتين مصر ويعرف بنحشيشة الفقراء لأن الفقراء كانوا يستخدمونه.

وترجع هذه التسمية إلى أن شيخاً من شيوخ الطرق يدعى الشيخ حيدر هو الذي اكتشف هذا النبات وأكتشف أثره على النفس وما يحدثه من سرور وبهجة، فقال به لاتباعه وأمر بكتمان أمره إلا عن الفقراء لأنه يزيل الهموم والآلام عن نفوسهم.

(1) Fort D. P., 1967, Drug as a Mean of Relieving Tension. New York: Holt Corp. P. 19.

وتعانى مصر من مشكلة الادمان لجميع أنواع المخدرات المختلفة منذ وقت بعيد. فمُنذ سنة ١٨٧٩ اضطر المشرع المصرى إلى منع زراعة الحشيش واستيراده فى محاولة للاقلال من تعاطى الحشيش ، كما أنه منع زراعة الأفيون. إلا أن هذه التشريعات لم تمنع وجود متعاطين للحشيش ومدمنين للأفيون. وقد أضيف اليهما بعد الحرب العالمية الأولى دخول المخدرات البيضاء (الهيروين والكوكايين) إلى مصر وكان أفراد الطبقة الخاصة هم أول من تعاطوها. ولكن عدوى الإدمان لم تلبث أن انتقلت إلى الطبقات الدنيا وأصبحت تشكل كارثة لم يخلصنا منها إلا قيام الحرب العالمية الثانية وتوقف السفن التى كانت تقوم بنقل هذه المواد من مناطق انتاجها. فارتفعت أسعارها ارتفاعاً فاحشاً جعل المدمنين ينصرفون عنها إلى المخدرات السوداء (الحشيش والأفيون). وفى أواخر الستينات وأوائل السبعينات بدأت ظاهرة إساءة استعمال المواد المؤثرة على الحالة النفسية أو الأقراص المخدرة التى تحدث آثاراً مشابهة لتلك التى تحدثها المخدرات الطبيعية، وقد ساعد على انتشار هذه المواد رخص أسعارها وسهولة الحصول عليها من الصيدليات وأكشاك السجائر والباعة الجائلين إذ أن استعمال أغلب هذه الأقراص لم تكن تجرمه القوانين واللوائح، ولذلك صدر قرار وزارة الصحة رقم ٣٠١ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم تداول الأقراص. وقد تمكنت إدارة مكافحة من ضبط ٢٥٠ طن من أقراص الموتولون المخدرة (٦ مليون قرص)، وقد تم أيضاً فى هذا العام (١٩٧٦) ضبط ٦٩ س، ٨٧٩ ج، ٣٨٤٦ ك من المواد المؤثرة على الحالة النفسية. (١)

وفى نفس العام أيضاً تم ضبط ١٨٠٠٠ شجيرة خشخاش مقابل

(١) الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ١٩٨٢، التقرير السنوي. القاهرة: هيئة المطابع الأميرية. ص ١٥ - ١٩.

١٢٥٠٠ شجيرة قنب هندی. وفى سنة ١٩٧٧ تم ضبط ثلاثة ملايين شجيرة خشخاش مقابل ٢٩٠٠٠ شجيرة قنب هندی.

وفى سنة ١٩٧٨ بلغت نسبة المضبوطات من الأفيون ٨٩ س، ٦٣١ ج، ٣٨٨ ك وأمكن أيضاً ضبط حوالى خمسة ملايين ونصف شجيرة أفيون، ٣١٩ ر شجيرة قنب هندی. وكذلك تمكنت قوات المكافحة من ضبط ٩٠ س، ٥٣٠ ج، ٢٢٣ ر ك من المواد المؤثرة على النفس فى نفس السنة (١٩٧٨).

وقد بلغ أيضاً عدد شجيرات الخشخاش المضبوطة فى سنة ١٩٧٩ أكثر من مليونين من شجيرات الخشخاش و ٣٠٠ ألف شجرة. وهذا العدد يقل عن شجيرات الخشخاش التى تم طيها قبل ذلك. أما أشجار القنب فقد زادت وأصبح عددها ٥٦٠ ألف شجرة بزيادة قدرها ١٦٨٪ عن العام السابق. ولا زال الحشيش هو المخدر المفضل لدى أغلبية المتعاطين وقد وصل حجم المضبوط منه سنة ١٩٨١ حوالى ٢٠ ألف كجم حسب آخر احصاء رسمى، وهى كمية تزيد عن الكمية التى ضبطت قبل ذلك بحوالى ٢٠٠ كيلو (القي كيلو).^(١)

وبعد الحشيش تأتى المواد المؤثرة على الحالة النفسية وتمثل المركز الثانى فى قائمة المخدرات، وقد بلغت جملة المضبوطات منها حوالى ١٦٤ ألف كيلو جرام أو ما يزيد على ذلك. ثم يحتل الأفيون المركز الثالث بين المخدرات وبلغت الكمية المضبوطة منه ١٠٣٠ كيلو جرام. وحيث أنه لم توجد احصائيات رسمية عن عدد مدمنى المخدرات فى مصر ولا فى أي دولة أخرى، نظراً لكثرة عددهم وعدم التمكن من ضبطهم، إلا أننا يمكننا التعرف على حجم المشكلة من حجم الجهود المبذولة فى مكافحة تهريب المخدرات وضبط الأوكار الخاصة بالتعاطى، والكميات الرهيبة

(١) سامى أسعد فرج ١٩٧٩، مشكلة المخدرات في مصر. القاهرة: مجلة الأمن العام، ص

التي ضبطتها مكتب مكافحة المخدرات سواء كانت تهرب إلينا من الخارج أو كانت مزروعة في نفس الأقليم ، كذلك المبالغ الضخمة المنفقة على حملات المكافحة وضبط المدمنين وعلاجهم ورعاية أسرهم وإنشاء وحدات صحية لرعايتهم . وبين جدول رقم (١) النفقات التي تحملتها جمهورية مصر العربية خلال عام ١٩٧٩ ، وهذا يعكس مدى إنتشار الظاهرة وخطورتها :

جدول رقم (١)

المبلغ المنصرف بالجنيه المصري	الهيئة
١٥٠٠.٠٠٠	نفقات أجهزة المكافحة التابعة لوزارة الداخلية
١٢٦٠.٠٠٠	نفقات أجهزة المكافحة التابعة لوزارة الدفاع
٦.٠٠٠	نفقات أجهزة المكافحة التابعة لوزارة المالية
٨.٠٠٠	نفقات أجهزة المكافحة التابعة لوزارة الصحة
١٥.٠٠٠	نفقات تحليل عينات المخدرات
٩٥.٠٠٠	نفقات التحقيقات والمحاكمات
١٠.٠٠٠	نفقات علاج وتأهيل المدمنين
٥.٠٠٠	نفقات الإجراءات الوقائية
١٤٠.٠٠٠.٠٠٠	أثمان المخدرات المستهلكة
١٤٢٨٢٩.٠٠٠	المجموع الكلى

وإذا نظرنا الى المجموع الكلى للهيئات المختلفة لما أنفقته فى سبيل مكافحة تهريب المخدرات لوجدنا أنه يمثل جزءاً كبيراً من اقتصاديات مصر، فهو يمثل نصف قيمة الصادرات السلعية المصرية باستثناء البترول، إذ أن كل صادراتنا الزراعية والصناعية وغيرها تصل الى ١٥٠٠ مليون جنيه، أى أن نصف المبلغ يخرج مرة أخرى مهرباً، وهو يزيد

عن مجموع ما نتحصل عليه من ضرائب على الايراد العام وعلى النشاط الاقتصادي الفردى. ومن المدهش أن متوسط دخل الفرد فى مصر لا يتجاوز ٥٠٠ دولار سنوياً ومع ذلك فإن متوسط ما ينفقه الفرد على المكيفات يبلغ أكثر مما ينفقه على المسكن والغذاء وخصوصاً بين أصحاب الدخل المحدود، إذ أن أسعار هذه العقاقير باهظة وتكلف الفرد أكثر من ١٠-٥ جنيهات متوسط يومى للجرعة الواحدة وهذا يفوق بكثير دخله العادى. مما يدفع الأفراد المدمنين دائماً إلى السرقة للحصول على المخدر. (١)

وبين جدول رقم (٢) أسعار المواد الطبيعية والتخليقية فى عام ١٩٩٧، ومقارنتها بعام ١٩٨٢:

جدول رقم (٢)

المادة المخدرة	أسعار ١٩٧٧	أسعار ١٩٨٢
أولاً - المخدرات الطبيعية:		
- الخشيش (الأقنة)	٦٠٠ - ١٠٠٠ ج (الجيد)	٣٧٠٠ - ٤٧٠٠ ج (الجيد)
- الأفيون (الأقنة)	٢٥٠ - ٣٠٠ ج (الشعبى)	٢٥٠٠ - ٣٠٠٠ ج (الشعبى)
	١٨٠٠ - ٣٠٠٠ ج	١١٢ ألف جنيه وكان متوسط سعره قد وصل إلى ١٣٠ ألف ج.
ثانياً - العقاقير التخليقية:		
- الموتيرون (القرص)	٢٥ قرشاً	٧٥ قرشاً
- الريتالين (القرص)	١٠ قروش	٣ جنيهات للقرص
- المانتركس (القرص)	٢٥ قرشاً	٧٥ قرشاً
- اللورين (القرص)	١٠ قروش	٥٠ قرشاً
- كودايين فوسفات (دجم)	٥ جنيهات	٨ جنيهات
- كودايين بيور (أجم)	٥ جنيهات	١٠ جنيهات للجرام
- ماكستون فورث (٣٨١)	٥ جنيهات	٦٠ - ٧٥ جنيهات للسم

(١) الادارة العامة لمكافحة المخدرات ١٩٨٣، التقرير السنوى. القاهرة: هيئة المطابع الأميرية. ص ٤٣ - ٤٥.

وبين جدول رقم (٣) عدد المدمنين الذين دخلوا المستشفيات للعلاج من إدمان المخدرات .

جدول رقم (٣)

الجهة	عدد الباقين تحت العلاج	عدد الذين تم علاجهم	عدد المتقدمين للعلاج
الصحة النفسية بالخانكة	١١	٦٤	٧٥
الصحة النفسية بالعباسية	١٥	١٥٠	١٦٥
	٢٦	٢١٤	٢٤٠

وهناك ٢٠٢ مدمن مسجلين بسجلات الجمعية المركزية لمنع المسكرات ومكافحة المخدرات القاهرة. وسنعرض فيما يلي جداول توضح احصائيات باجمالى ما ضبط من مخدرات فى جمهورية مصر العربية عام ١٩٨١ :

الكميات			عدد المتهمين	عدد القضايا
ك	ج	س	٨١٩٣	٧١٩٧
٦٩٠٣٦	٩١٦	٩٩		

وستعرض الباحثة بعد ذلك لجداول تبين جملة المخدرات المضبوطة بمعرفة أجهزة مكافحة المخدرات المختلفة فى جمهورية مصر العربية عام ١٩٨١. (١)

(١) الادارة العامة لمكافحة المخدرات ١٩٨٣، التقرير السنوي، القاهرة: هيئة المطابع الأميرية، ص ٤٦ - ٧.

جدول رقم (٤)

المادة المخدرة	عدد القفص	عدد المتهمين	الكمية		
			س	ج	ك
حنش	١٨٤	٥٥٣٤	٧٧	٦٥١	٦٨٦٧١
أفيون	٣٨٨	٤ ٣	٢٢	٢٦٥	٣٦٥
زراعات (حنش)	٤٣٨	٥٨٧	٢٥	٧٧١	٦٤
زراعة خشخاش	٦٦٥	٥٣٨			
مواد مؤثرة على الحالة النفسية	٩٩٧	١٠٨٦	٤١	٣٧١	٢٠٧
إجمالي	٧٣٢٨	٨١٤٨			

١ - الإدمان : Addiction

إدمان المخدرات أو الكحوليات. ويقصد به التعاطي المتكرر لمادة نفسية، أو مواد نفسية لدرجة أن المتعاطي (ويقال المدمن) يكشف عن انشغال شديد بالتعاطي، كما يكشف عن عجز أو رفض للانقطاع، أو لتعديل تعاطيه؛ وكثيراً ما تظهر عليه أعراض الانسحاب إذا ما أنقطع عن التعاطي. وتصبح حياة المدمن تحت سيطرة التعاطي إلى درجة تصل إلى استبعاد أي نشاط آخر. ومن أهم أبعاد الإدمان ما يأتي:

(أ) ميل إلى زيادة جرعة المادة المتعاطاة وهو ما يعرف بالتحمل.

(ب) وإعتماد له مظاهر فيزيولوجية واضحة.

(ج) حالة تسمم عابرة أو مزمنة.

(د) رغبة قهريّة قد ترغم المدمن على محاولة الحصول على المادة النفسية المطلوبة بأيّة وسيلة.

(هـ) تأثير مدمر على الفرد والمجتمع.

وقد استمرت المحاولات منذ العشرينات المبكرة وحتى أوائل الستينيات لإقرار التمييز بين الإدمان والتعود Habituation باعتبار أن التعود صورة من التكيف النفسى أقل شدة من الإدمان. ولكن في أوائل الستينيات أوصت هيئة الصحة العالمية بإسقاط المصطلحين: الإدمان، والتعود، على أن يحل محلها معاً مصطلح جديد هو الاعتماد.

٢ - اللهفة : Craving

رغبة قوية فى الحصول على آثار مخدر أو مشروب كحولى، ولللهفة بعض الخصائص الوسواسية، فهى لا تفتأ تراود فكر المدمن، وتكون غالباً مصحوبة بمشاعر سيئة.

٣ - الاعتماد : Dependence

حالة نفسية، وأحياناً تكون عضوية كذلك، تنتج عن التفاعل بين كائن حى ومادة نفسية: وتتسم هذه الحالة بصدور استجابات أو سلوكيات تحتوى دائماً على عنصر الرغبة القاهرة فى أن يتعاطى الكائن مادة نفسية معينة على أساس مستمر أو دورى (أى من حين لآخر) وذلك لكى يخبر الكائن آثارها النفسية، وأحياناً لكى يتحاشى المتاعب المترتبة على افتقادها. وقد يصحبها تحمل أو لا يصحبها. كما أن الشخص قد يعتمد على مادة واحدة أو أكثر. وتستخدم أحياناً عبارة «زملة أعراض الاعتماد» باعتبارها واحدة من فئات التشخيص السيكياترى (أى الطب النفسى) لمجموعة من الاضطرابات المصاحبة لتعاطى المواد النفسية، وقد ورد ذكرها فى التصنيف الصادر عن هيئة الصحة العالمية للاضطرابات النفسية والسلوكية، المعروف باسم ICD - 10 (WHO Dictionary 1988; Eddy et al. 1965).

٤ - الاعتماد النفسى : Psychic Depenence

موقف يوجد فيه شعور بالرضا مع دافع نفسى يتطلب التعاطى المستمر

أو الدوري لمادة نفسية بعينها لأستثارة المتعة أو لتحاشي المتاعب. وتعتبر هذه الحالة النفسية هي أقوى العوامل التي ينطوي عليها التسمم المزمن بالمواد النفسية. وفي بعض هذه المواد تكون هذه الحالة هي العامل الأوحد الذي ينطوي عليه الموقف.

٥ - الاعتماد العضوي : Physical Dependence

حالة تكيفية عضوية تكشف عن نفسها بظهور اضطرابات عضوية شديدة في حالة انقطاع وجود مادة نفسية معينة أو في حالة معاكسة تأثيرها نتيجة لتناول الشخص أو الكائن عقارا مضاداً Antagonist. وتتكون الاضطرابات المشار إليها (وتسمى أعراض الانسحاب) من مجموعة من الأعراض Symptoms^(١) والعلامات Signs^(٢) ذات الطبيعة العضوية والنفسية التي تختص بها كل فئة من المواد النفسية دون غيرها. ويمكن التخلص من هذه الأعراض والعلامات بعودة الشخص أو الكائن إلى تناول المادة النفسية ذاتها أو مادة أخرى ذات تأثير فارماكولوجي مماثل داخل الفئة نفسها التي تنتمي إليها المادة النفسية الأصلية. ويعتبر الاعتماد العضوي عاملاً قوياً في دعم الاعتماد النفسي وتأثيره في الاستمرار في تعاطي المادة النفسية أو في الانتكاس إلى تعاطيها بعد محاولات الانسحاب.

٦ - إمكانية الاعتماد (أو الإمكانية الاعتمادية) :

Dependence Potential

الخصائص التي تتوافر في أية مادة نفسية، بناء على ما لها من تأثير فارماكولوجي على عدد من الوظائف النفسية أو العضوية، ويمقتضاها يرتفع احتمال الاعتماد على هذه المادة. وتحدد الإمكانية الاعتمادية

(١) الجوانب الذاتية من الاضطراب.

(٢) الجوانب الموضوعية من الاضطراب.

للمادة بناءً على خصائصها الفارماكولوجية التي يمكن قياسها بإجراءات محددة على الحيوان والإنسان.

٧ - احتمالات الاعتماد : Dependence Liability

احتمال أن تحدث مادة نفسية اعتماداً لدى الحيوان والإنسان . وعند تقدير احتمالات الاعتماد لأية مادة نفسية نأخذ في اعتبارنا الإمكانية الاعتمادية لهذه المادة مضافاً إليها عدد من العوامل غير الفارماكولوجية في الفرد والمجتمع مما يساعد على الاعتماد ، مثل الثمن الذي يتكلفه الفرد، ومدى توافر هذه المادة، والعادات الاجتماعية السائدة.

٨ - المواد المحدث للاعتماد: Dependence Producing Drugs

مواد تتوافر فيها القدرة على التفاعل مع الكائن الحي فتحدث حالة اعتماد نفسي أو عضوي أو كليهما معاً. وقد تتناول هذه المادة النفسية في سياق طبي أو غير طبي دون أن يترتب على ذلك بالضرورة حدوث الاعتماد. ولكن بمجرد نشوء حالة اعتماد فسوف تختلف خصائصها باختلاف فئة المادة النفسية المعنية. فبعض المواد بما في ذلك المادة الموجودة في القهوة والشاي. كفيلة بأن تحدث اعتماداً بمعنى عام أو متسع جداً. ومثل هذه الحالة ليست ضارة بالضرورة. ولكن هناك فئات أخرى من المواد، التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي تأثيراً منشطاً ومرتبطة، أو تحدث اضطرابات في الإدراك، أو في المزاج، أو في التفكير، أو في الحركة، ويُعرف عن هذه المواد عموماً أنها إذا استخدمت في سياق بعينه فإنها تكون كفيلة بإحداث مشكلات ذات طبيعة فردية وعامة في آن معاً. هذه الفئات من المواد من شأنها أن تحدث أضراراً كبيرة من الاعتماد وفيما يلي حصر بفئات هذه المواد:

■ فئة الكحوليات: وتشمل جميع المشروبات الكحولية.

■ فئة الأمفيتامينات: مثل الأمفيتامين، والدكسامفيتامين، والميتامفيتامين والميثايلفيتايديت، والفينميترازين.

■ فئة الباربيتورات: مثل الباربيتورات (خاصة ذات التأثير قصير المدى ومتوسط المدى)، ومواد أخرى ذات تأثير مهدئ مثل الكلورديازيبوكسايد (وهو المعروف بالبيريوم)، والديازيبام (وهو الفاليوم)، والميبروباميت (ويعرف باسم ميلتاون) والميتاكالون.

■ فئة القنبيات: مثل مستحضرات القنب، بما في ذلك الماريوانا (كما هو معروف في الغرب)، والبانج والجانجا والكاراس (كما هو معروف في الهند) والكيف (كما هو معروف في الشمال الأفريقي)، والحشيش (كما هو معروف في مصر).

■ فئة الكوكايين: وتشمل الكوكايين، وأوراق الكوكا، والكراك.

■ فئة المهلوسات (أي محدثات الهلاوس)^(١): مثل الليسيرجايد (المعروف باسم LSD)، والميسكالين، والمبايلوسيبين.

■ فئة القات.

■ فئة الأنفينيات (أو المورفينيات): مثل الأفيون، والمورفين، والهيريون، والكوداين، وبعض العقاقير المخلقة ذات الآثار الشبيهة بآثار المورفين الميثادون والبيثيدين

■ فئة المواد الطيارة (الاستنشاقية): مثل الأميتون، والجازولين، وبعض المواد المستخدمة في التخدير مثل الإثير، والكلوروفورم.

■ فئة الطباقي (النيكوتين).

■ فئة البن والشاي (الكفاين).

٩ - التكيف العصبي : Neuroadaptation

مجموع التغييرات العصبية المصاحبة لكل من التحمل وظهور أعراض

(١) الهلاوس جمع هلوسة، وهلوسة إدراك حسي لا يقابله منه حسي ملام، والهلوسة قد تكون بصرية أو سمعية أو ذوقية أو لمسية. (Goodwin 1989)

الانسحاب. وفي بعض الحالات تكون هذه التغيرات مزعجة جداً كما في حالة الأفيونيات. ومن الممكن أن ينشأ «التكيف العصبي» دون أن نلاحظ معه أي مظاهر معرفية أو سلوكية. مثال ذلك أن بعض مرضى الجراحات ممن يعطون مواد أفيونية لتخفيف الألم Intoxication هؤلاء يمكن أن تظهر عليهم أعراض الانسحاب دون أن يصحب ذلك أية رغبة لديهم لمواصلة تعاطي المواد الأفيونية.

١٠ - تسمم : Intoxication

حالة تعقب تعاطي إحدى المواد النفسية وتنطوي على اضطرابات في مستوى الشعور، والتعرف، والإدراك، والوجدان أو السلوك بوجه عام، وربما شملت كذلك وظائف واستجابات سيكوفيزيولوجية. وترتبط هذه الاضطرابات ارتباطاً مباشراً بالآثار الفارماكولوجية الحادة للمادة النفسية المتعاطاة، ثم تتلاشى بمرور الوقت ويبرأ الشخص منها تماماً، إلا إذا كانت بعض الأنسجة قد أصيبت أو ظهرت مضاعفات أخرى. يحدث هذا أحياناً على أثر شرب الكحوليات (فتحدث حينئذ عن تسمم كحولي)، كما يحدث عقب تعاطي أية مادة نفسية. وتتجمع مظاهر التسمم بالتدريج. ويتأثر التعبير السلوكي عنها بالتوقعات الشخصية والحضارية الشائعة (في رقعة حضارية معينة) حول الآثار التي يمكن أن تترتب على تعاطي مادة نفسية بعينها. وتتوقف طبيعة المضاعفات التي تنتج عن التسمم على طبيعة المادة المتعاطاة وأسلوب التعاطي.

١١ - تحمل : Tolerance

تغير عضوي (فيزيولوجي) يتجه نحو زيادة جرعة مادة محدثة للإدمان بهدف الحصول على نفس الأثر الذي أمكن تحصيله من قبل بجرعة أقل. ويمكن أن يحدث التحمل بفعل عوامل فيزيولوجية أو عوامل نفسية اجتماعية. وقد يكون التحمل عضوياً، أو سلوكياً، والتحمل العضوي

(الفيزيولوجي) عبارة عن تغير في الخلايا المستقبلية بحيث يتضاءل أثر جرعة المادة المتعاطاة حتى مع بقاء هذه الخلايا معرضة لنفس تركيز المادة. ويقصد بالتحمل السلوكي تغير في تأثير المادة المتعاطاة ينجم عن تغير في بعض قيود البيئة. ويشار بالتحمل العكسي Reverse Tolerance إلى تغير يصحبه زيادة الاستجابة لنفس الجرعة من المادة المتعاطاة.

■ تحمل متعدي : Cross - Tolerance

يشار بالتحمل المتعدي إلى انتقال أثر التحمل من المادة المتعاطاة أصلاً إلى مواد نفسية أخرى من الفئة نفسها أو من فئة قريبة.

مثال ذلك أن التحمل الذي ينشأ مع تعاطي الهيروين يمتد أثره ليشمل المورفين والعكس. كما أن التحمل الذي ينشأ مع شرب الكحوليات لا يلبث أن يصبح تحملاً متعدياً نحو فئة الباربيتورات.

١٢ - انسحاب : Withdrawal

مجموعه من الأعراض تختلف في بعض مفرداتها وفي شدتها تحدث للفرد على أثر الانقطاع المفاجئ عن تعاطي مادة نفسية معينة، أو تخفيف جرعتها، بشرط أن يكون تعاطي هذه المادة قد تكرر كثيراً واستمر هذا التكرار لفترات طويلة أو بجرعات كبيرة.

وقد تأتي هذه الأعراض مصحوبة بعلامات على الاضطراب الفيزيولوجي. وتعتبر حالة الانسحاب دليلاً على أنه كانت هناك حالة اعتماد. كما أن حالة الانسحاب تستخدم للتعريف السيكوفارماكولوجي الضيق بمعنى الاعتماد. ويتوقف منشأ الانسحاب ودوامه على نوع المادة المتعاطاة وجرعتها قبل الانقطاع أو قبل تخفيض هذه الجرعة مباشرة. ويمكن القول إن مظاهر الانسحاب عكس مظاهر التسمم الحاد.

ويحتوي تصنيف الاضطرابات النفسية والسلوكية ICD 10، الصادر

عن هيئة الصحة العالمية (تحت مادة «حالة انسحاب») على تنبيهه إلى أن كثيراً من أعراض الانسحاب يمكن أن تنشأ نتيجة لاضطرابات سيكياترية لا علاقة لها بتعاطي المواد النفسية، مثل القلق، والحالات الاكتئابية وهو ما يستوجب حرصاً خاصاً من القائم على التشخيص أو العلاج.

١٣ - تعاطي المواد النفسية : Drug abuse

يشيع بين كثير من الكتاب العرب أن يستخدموا في هذا الصدد تعبير «سوء استعمال المخدرات»، وهذه العبارة ترجمة حرفية للكلمة الإنجليزية Abuse ومع ذلك فاللغة العربية تغنيننا عن ذلك. فقد ورد في «لسان العرب» لابن منظور ما نصه: «والتعاطي تناول ما لا يحق ولا يجوز تناوله». وبناء على ذلك نقول تناول فلان الدواء، ولكنه تعاطى المخدر. ويشار بالمصطلح إلى التناول المتكرر لمادة نفسية بحيث تؤدي آثارها إلى الإضرار بمتعاطيها، أو ينجم الضرر عن النتائج الاجتماعية أو الاقتصادية المترتبة على التعاطي.

ولا يستتبع التعاطي بالضرورة نشوء الاعتماد أو التحمل.

١٤ - تعاطٍ تجريبي (أو استكشافي) :

Experimental use or abuse

عملية تعاطي المواد النفسية، في أول عهد المتعاطي بها، وهو بعد في مرحلة تجريبيها لاستكشاف أحواله معها، حتى يرتب على ذلك الاستمرار في تعاطيها، أو الانقطاع عن التعاطي .

١٥ - تعاطٍ متقطع (أو بالمناسبة) : Occasional use

عملية تعاطي المواد النفسية كلما حانت مناسبة اجتماعية تدعو إلى ذلك، من هذا القبيل المناسبات الاجتماعية السعيدة، كالحفلات والأفراح، وتختلف هذه العملية في ارتفاعها باختلاف البيئات الحضارية العريضة،

كما تختلف باختلاف الشريحة الاجتماعية التي ينتمى إليها المتعاطى. ويشير التعاطى المتقطع إلى مرحلة متقدمة (عن مرحلة التعاطى التجريبي) فى ارتباط التعاطى بالتعاطى.

١٦ - التعاطى المنتظم : Regular use

عملية التعاطى المتواصل لمادة نفسية بعينها على فترات منتظمة، يجرى توقيتها بحسب إيقاع داخلى (سيكوفيزيولوجى) لا على حسب مناسبات خارجية (اجتماعية). وتعتبر هذه العملية مرحلة متقدمة (عن مرحلة التعاطى بالمناسبة) فى تعلق التعاطى بالتعاطى.

١٧ - التعاطى المتعدد للمواد النفسية : Multiple drug use

يشار بهذا المصطلح إلى تعاطى المتعاطى عدداً من المواد النفسية، بدلاً من الاكتصار على مادة واحدة. وقد يتعاطى هذه المواد المتعددة معاً فى وقت واحد، وقد تكون الإشارة إلى انتقاله من مادة إلى مادة أخرى عبر فترة زمنية محددة.

١٨ - مادة نفسية : Psychoactive drug

أي مادة إذا تناولها الإنسان أو الحيوان أثرت فى نشاط المراكز العصبية العليا، أو ما اصطلحنا على أن نسميه (فى حالة الإنسان) بالعمليات النفسية. وقد يكون تأثير هذه المادة فى اتجاه التنشيط -Stimulation، وقد يكون فى اتجاه التخميم Sedation، وقد يكون فى اتجاه إحداث بعض الهالوس Hallucinogenic. ويستخدم أيضاً بالمعنى نفسه مصطلح إنجليزي آخر غير المصطلح الوارد فى صدر هذه الفقرة وهو Psychotropic substance.

ويفضل بعض الكتاب الإنجليز والأمريكيين تخصص المصطلح الأخير للمواد النفسية الدوائية أى التى تصنع أصلاً لتكون بمنزلة أدوية

للاضطرابات النفسية على أن يعامل المصطلح الأول كاسم لفئة عامة تشمل الأدوية وغير الأدوية من المواد التي تؤثر في العمليات النفسية.

١٩ - مخدر : Narcotic

يشار بهذا المصطلح إلى معان متعددة ومتداخلة بدرجة تدخل الغموض والإبهام أحياناً على المقصود منه في هذا النص أو ذاك. لذلك يتحرج كثير من أهل الاختصاص الآن في استخدامه إلا في أضيق الحدود. ويكون ذلك فقط عند الإشارة إلى مجموعة المواد النفسية المحرمة قانوناً والواردة على سبيل الحصر في الاتفاقية الدولية المعروفة باسم «الاتفاقية الوحيدة بشأن الجواهر المخدرة، لسنة ١٩٦١» (*). أما عن هذه المواد فهي القنب ومشتقاته، والأفيون ومشتقاته، وشجرة الكوكا ومشتقاتها. وعلى أية حال فقد أسقط هذا المصطلح من نظام تصنيف الاضطرابات النفسية الصادر عن هيئة الصحة العالمية في أحدث مراجعاته، وهو المعروف باسم ICD 10، بينما استخدم مصطلح «المواد النفسية».

٢٠ - الاعتماد المتعدي : Cross - dependence

هذا مصطلح فارما كولوجي يستخدم للإشارة إلى إمكانية أن تحل مادة نفسية محل مادة نفسية أخرى محدثة للاعتماد، ويكون ذلك بأن تمنع هذه المادة الجديدة ظهور الأعراض الانسحابية التي تترتب على التوقف عن تعاطي المادة السابقة عليها. مثال ذلك أنه إذا نشأ الاعتماد لدى شخص على أحد الملطفات من فئة البنزوديازيبين وتوقف عن تعاطية فإنه يكون على استعداد عالٍ لظهور الاعتماد لديه على أي ملطف آخر من الفئة نفسها.

(*) "Single Convention on Narcotic Drugs. 1961, New York: U. N. 1961".

٢١ - الجرعة الزائدة : Overdose

ينطوى هذا المصطلح على إقرار بوجود جرعة مقننة Standardized Dose، وهي الجرعة التي اعتاد المتعاطي المستمر (سواء كان الاستمرار منتظماً أو متقطعاً) أن يتعاطاها من أية مادة نفسية للحصول على النشوة الخاصة بهذه المادة. فإذا زادت الجرعة عن ذلك (للسبب ما) في إحدى مرات التعاطي فإنها تحدث آثاراً معاكسة حادة Acute Adverse Effects، وتكون هذه الآثار عضوية أو نفسية. وتكون هذه الآثار غالباً مؤقتة ثم تزول تلقائياً، لكنها قد تحتاج إلى قدر من الرعاية الطبية.

الفصل الثاني

الدراسة النظرية

■ تعريف المخدرات

■ نبذة تاريخية عن المخدرات

■ آثار المخدرات

■ الواجهة السيكلولوجية للإدمان

■ النظرية السلوكية للإدمان على المخدرات

■ نظرية التحليل النفسي للإدمان على المخدرات

■ الواجهة الاجتماعية للإدمان على المخدرات

■ سمات المدمنين الاجتماعية

■ دوافع التعاطي

المخدرات :

تعريفاتها :

قبل أن نتكلم ونخوض فى موضوع المخدرات لابد وأن نعرف أولاً ما هى المخدرات أو المادة المخدرة.. وبالرجوع إلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨، والقوانين الخاصة بالمادة المخدرة نجد أنها تحدد المواد الآتية كجواهر مخدرة:

١ - الأفيون الخام، والأفيون الطبي ومستحضراتهما التى تكون نسبة المورفين فيها ٠.٢ ر فما فوق.

٢ - المورفين، والكودايين والديوانين وأشباه القلوبات الأخرى للأفيون وجميع أملاح هذه الجواهر ومشتقاتها (وضمنها الأدوية المسماة بمضادات الأفيون) المحتوية على ٠.١ ر من الهيروين أو نسبة ٠.٢ ر من المورفين أو الديوانين أو ٠.٨ ر من الكودايين أو أى نسبة تزيد على ذلك.

٣ - الكوكا وأوراقها وثمارها ومسحوقها.

٤ - الكوكايين وأملاحه والنوفاكين ومشتقاتهما وكل المستحضرات المشتملة على واحد فى الألف (٠.١ ر) فما فوق من الكوكايين أو النوفاكين.

٥ - الأبيجونين.

٦ - القنب الهندي وجميع مستحضراته ومشتقاته تحت أى اسم تعرض به فى التجارة.

وكذلك كل مستحضر أقرباذينى يحتوي على جوهر من الجواهر المذكورة بنسبة تساوي النسبة السابق ذكرها أو تزيد عليها أى اثنين فى الألف (٠.٢ ر) من المورفين أو الديوانين وثمانية فى الألف (٠.٨ ر) من الكودايين

وواحد في الألف من الكوكايين^{١١} ، والموهاكيين أو الهيروين^{١٢} .

وبذلك نجد أن التعريف القانوني لمصاحب قد وصفها بأنها مجموعة المواد التي تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو رعايتها أو صنعها إلا لأغراض حددتها القانون ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك، فالمدخن هو كل مادة تعير وظيفة أو أكثر من وظائف الكائن الحي عند تعاطيها وتؤثر على الفرد بطرق متعددة وتغير من نفسيته، انفعالاته، وعواطفه أو تتلف المجتمع^(١٣) .

— وقد عرفت منظمة الصحة العالمية W.H.O العقار المسبب للإدمان بأنه عقار ذو قابلية للتفاعل مع الكائن الحي، بحيث يؤدي ذلك التفاعل إلى الاعتماد النفسي أو العضوي أو لكليهما وقد تستعمل هذه العقاقير لأغراض طبية دونما تؤدي إلى حدوث هذا التفاعل بالضرورة، وخواص حالة الاعتماد على العقار تختلف حسب نوع العقار المستعمل، فهناك من العقاقير ما يسبب التبعية الشديدة للجهاز العصبي أو الهبوط أو اختلال الإدراك، والانفعال والتفكير والسلوك والوظائف الحركية. بحيث تؤدي تحت ظروف معينة من التعاطي إلى المشاكل التي تضر بحالة الفرد والمجتمع الصحية^(١٤) .

— وقد صنفت منظمة الصحة العالمية W.H.O هذه المجموعة التي يعينها التعريف على النحو التالي:

١ - النمط الكحولي: الباريتيوركي Barbiturati ويشمل الخمر، الباريتيورات والمهدئات مثل الكورال Coral والباريتيورات Barbitu-

(١١) حسن فتح الباب ١٩٦٧ المخدرات سلاح الاستعمار والرجعية. القاهرة: دار الكاتب العربي، ص ٧.

(12) Norback J., 1980. The Alcohol and Drug Abuse-Yearbook Directory. New York: Vannorstrand. P 443

(13) World Health Organization 1977. The Use of Cannabis. Technical Report. No 478. Geneva W.H.O P 478.

rates والماندركس Mandrex والليبريوم Librum والفاليوم Valum والمبرومات Mexbromates والسيكوباربيتال Sychoarbital والميثالكون Methcalone and Glotomide والجلوتوميد

٢- النمط الأمفيتاميني: الأمفيتامين Amphetamine، ديكسامفيتامين Dexamphetamine، ميتامفيتامين Metamphetamine، ريتالين Retaline، تيمنترازين Tementrizine، والميثيل فينيدات Methel Phendets والفينترازين Phentrazine.

٣ - النمط القباني: الحشيش Hasish أو الماريجوانا Marijuana.

٤ - النمط الكوكاييني: الكوكايين Cocaine وأوراق نبات الكوكا Coca Sativa.

٥ - النمط الهلوسي: الـ LSD (Lesergicacid Dythelamide) والميسكالين Myscalin والزايوسايبين Zaylosaybeen.

٦- النمط الأفيوني: الأفيون، المورفين Morphine، الهيرون والكوداين Codine والميثادون Methadone والبثيدين Bethedin.

٧- النمط القاتل: نبات القات.

٨ - نمط المذيبات المتطايرة: التولوين، الاسيتون، رابع كلوريد الكربون^(١).

وسوف نهتم بدراسة المخدرات المسببة للإدمان. وقد صنفت هذه المخدرات وفق آثارها وما تجلبه للفرد:

١ - المخدرات المسببة للإدمان: Drug Addicting والمسماة بالمخدرات الخطيرة وهي تقيت الألم النفسي وتخلص المدمن من الكدر وليست كلها

(1) World Health Organization, 1967, Services for the prevention and Treatment of Dependence on Alcohol and Other Drugs, Techn. R. Ser. No. 363, Geneva: W.H.O

منومة تخدر الأنا فينعزل الفرد عن المثير الداخلى والخارجى وينسحب إلى حالة من الصفاء أو الهدوء النرجسى وهى أنواع أهمها: الأفيون ومشتقاته وتشمل المورفين وصبغ الأفيون وصبغ الأفيون الكافوري والديلوديد والهيريون والكوكايين. وتشمل أيضاً المخدرات المركبة كالبشيريون هيدروكليد، ميريريدين هيدروكلوريد، والميثادون هيدروكليد. وكذلك تضم الكوكايين والحشيش.

٣- مخدرات معودة: Drug dependence Producing المخدرات المعودة، وتشمل المخدرات مسببة الإدمان بالإضافة إلى المهدئات والمنومات والمنشطات، وتشمل المنومات البارابيتيورات والبروميدي والبارالدهايد والكورال هيدرات والكحول، وتشمل المنشطات الأمفيتامين سولفات (البتزدين)، والديكسامفيتامين سولفات (الديكسورين) والفينيميترين هيدروكلوريد (بريلودين) والأفيدرين، كذلك المهدئات والمنومات غير البارابيتريية مثل الميثيلبنتيونول والميبرومات والجلوتيميد، وكذلك الكلورفورم والايثير.

٤- مخدرات محدثة للذهان Drug Psychotogenic Hallucinogens أو المخدرات المنتجة لهيئات بصرية أطلق عليها ليفين اسم Phantas-tica وهى الكوكايين والحشيش والميسكالين وعقاقير الهلوسة LSD والبسيلوسيبين وكلها عقاقير تحدث تغيرات فى الانتباه والانفعال والادراك الحسى وتخلق أوهاماً وهلوسات وخاصة الهلوسات البصرية التى قد تكون ملونة أو أحادية اللون وقد تأخذ أشكالاً فسيكسائية محتواها انسانى أو طبيعى (١).

٥- بداية استخدام المخدرات :

عرف الانسان الأول طريق عيشه. طريق الجهد والألم والعرق، وتعقدت

(١) عبد النعم الحفنى، ١٩٧٨: موسوعة علم النفس والتحليل النفسى. القاهرة: مكتبة

مدبولى. ص ٢٤ - ٢٤٣.

الحياة بعد تكاثره وانتشاره، وما نشأ عنهما من زيادة الاحتياجات وزيادة الاضطرابات النفسية والاجتماعية، وبدأ يدرك أهمية سد حاجاته إلى الراحة بعد العمل المتواصل والكفاح الشاق^(١) وتشبعت آماله وكثرت آلامه، ولم تعد اللحظات التي يختلسها ليريح جسده المكثود تفي بما ينشده من تسرية عن نفسه^(٢) فبدأ يبحث عن جديد يخفف آلامه ويمنحه المزيد من الراحة والبهجة معاً، وانحرف به البحث إلى بعض النباتات والحشائش^(٣) التي كان يستخدم سيقانها وأليافها في صناعة الحبال، وغيرها^(٤) الوجد في ثمارها وأوراقها السلوي والراحة اللتين ينشدهما^(٥) فينبذ انفجار الحضارة وهزوغها استخدمت المخدرات كوسيلة لتحديث تغيرات في حالات الوعي والشعور، والحالات الطبيعية مثل النوم، البهجة، الرضا، التوتر، السعادة واليقظة والتنبيه يمكن للمخدرات أن تحدث تغيرات عميقة فيها وتضيف لها أبعاداً جديدة^(٦) فالمخدر يمنع الفرد طريق واحد فقط، ويشتمل هذا الطريق في تغير حالة الفرد العقلية الذاتية إلى حالة تتفق مع رغباته^(٧) والطبيعة البشرية ترمي دائماً وأبداً إلى الوصول إلى اللذة وتجنب كل ما يؤدي للألم، والمخدرات دائماً هي تلك الأداة التي كانت توفق بين اللذة والألم^(٨).

أولاً - الأفيون :

■ نبذة تاريخية عنه :

إن استعمال المخدرات أو إساءة استخدامها كوسيلة لتغيير الحالة الشعورية فكرة قديمة، بل هي أقدم من الزراعة. فقد ظهر في لوحة سومرية سنة ٤٠٠٠ قبل الميلاد وصف لنبات الأفيون أطلقوا عليه اسم (نبات السعادة). وفي سنة ٣٣٠٠ قبل الميلاد جاء في لوحة سومرية أخرى وصف حصاد الأفيون. وقد استعمل قدماء المصريين الأفيون كما جاء في بردية

(1) Belknad J.K. , 1978, Drugs and Human Behaviour , In: Joltzman , W.H. , (ed) Introductory Psychology in Depth- developmental Topics; New York: Harper,s College Press, P. 258.

أبهر سنة ١٥٠٠ قبل الميلاد حيث أشاروا إلى دواء يمنع الأطفال من الإقراط في البكاء، ويشير هوميروس في الأوديسا إلى استعمال الأفيون لإزالة الكرب والضييق. وكان تمثال النوم عند الاغريق (هيبنوس) ونفس الاله عند الرومان (سومنوس) مزيناً بنبات الخشخاش، وفي أساطير الرومان كان سومنوس يسكب عصيراً من وعاء في عيني النائم، وقد استعمل جالينوس الطبيب الاغريقي الأفيون بكثرة لعلاج الصداع والدوخة والمغص والحمى والجزام وأمراض أخرى كثيرة، ويشير جالينوس إلى أن الأفيون كان يمزج بالسكر ويباع في الشوارع للناس لاستخدامه من أجل الترفيه. ويشير المؤرخون إلى أن الامبراطور الروماني ماركوس أوريليوس كان مدمناً على الأفيون وعانى من أعراض الامتناع.

وقد استعمل العرب الأفيون ووصفه البيروني في كتابه سنة ١٠٠٠ بعد الميلاد، كما وصف أعراض الإدمان عليه، وقد برع ابن سينا في استخدامه في العلاج.

وقد ذكر الأفيون ضمن الأقراص الطبية للأشوريين في القرن السابع قبل الميلاد وتكرر ذكره ٤٢ مرة ضمن ١١٥ عقاراً طبياً جميعها من أصل نباتي. وكذلك عرف الأفيون كدواء في أوروبا في عصر المسيح، وكان الطبيب الأوروبي باراسلوس قد استخدمه في العلاج سنة ١٧٠١، وفي القرن الثامن عشر قال الطبيب الانجليزي المشهور توماس سيدنهام «أن علاج الأمراض مستحيل بدون الأفيون»، وكان يستخدم على شكل سائل مركب سماه لاندوم Landom وقد بدأ الاكلينيكيون الأوروبيون باستعمال اللاندوم طبياً بنفس الصورة الطبية المنتشرة حالياً^(١):

وهكذا يبدو لنا أن استعمال الأفيون قد بدأ منذ العصور الأولى لوجود الانسان وقد انتشر استخدامه أكثر يتزايد حاجات الانسان وانتشار

(١) الأمم المتحدة ١٩٧٦، مكافحة اساءة استعمال المخدرات. نيويورك: جنيف. ص ٢٦٨، ٢٦٠.

الحروب حيث سئم الناس حياة الجهد والعمل فى أيام الحروب المفزعة، فلبجأوا إلى المخدرات ملتجئين الراحة والخمول وعدم التفكير فى سوء حالتهم ففعلوا المخدرات غذاءً لنفوسهم ودواءً لأمراضهم وأكسیر لحياتهم، وزاد انتشار استعمال الأفيون إلى أن أصبح اساعة استعماله خطراً اجتماعياً واقتصادياً رهيباً يهدد معظم الدول وبخاصة الدول النامية.

تعريف الأفيون :

يذهب معظم الباحثين إلى أن كلمة أفيون مشتقة أساساً من كلمة -Opi-um اليونانية ومعناها العصارة. وقد عنى الكثيرون بتحليل هذه العصارة، فوجدوا من خواصها وهى طازجة أنها مادة لزجة راتنجية مطاطة خفيفة اللون، تصبح بعد فترة صلبة ذات لون بنى يميل إلى السواد، طعمها حريف مغلث ورائحتها قوية منومة، أما تركيبها الكيميائي فيعرف بأنه يحتوي على أربع عشرة مادة: منها القلوبات وغير القلوبات والأحماض العضوية وأملاح الزيوت، ويتم الحصول على الأفيون من الثمار غير الناضجة لشجرة الخشخاش المعروفة باسم *Paversonniferum* أي زهرة النوم وطريقة الحصول عليه تتلخص فى إحداث خدوش فى الثمار غير الناضجة فيخرج منها السائل الأبيض الذي يتحول بعد ذلك إلى مادة بنية مطاطة هي الأفيون^(١).

الآثار الخاصة بالأفيون :

قررت الدراسات أن آثار الجرعة الواحدة ١٠ ملجم للأفيونات تسبب أعراض المنع، وتسبب الخمول وتسكن القلق، وقد قرر بعض المفحوصين أنهم يشعرون بتثبيش عقلى وتلدرة فى الإثارات، وعدم زيادة فى الرغبات الجنسية، بالرغم من القوة الجنسية التى يجلبها المخدر عن طريق إطالة مدة الجماع. ويشعر المفحوص بضيق فى التنفس وانخفاض درجة

(1) World Health Organization 1978, Expert Committee on Drug Dependence. Techn. R. Ser. No. 618. Geneva: W.H.O. PP. 7-9.

حرارة الجسم، واكتئاب، وتنتهى هذه الحالة بعد ٦:٤ ساعات، أما فى حالات الإدمان فإن الآثار تكون أكثر قوة وتكراراً فيزداد الخمول والقلق والضيق فى التنفس والدوار وانخفاض حرارة الجسم، ويظهر الهزال بمعدلات سريعة، والتشنج اللاإرادي للمعضلات، والامساك الحاد ويقل افراز هرمون قشرة الغدة النخامية Atch وتنتهى الاهتمامات الجنسية ويصبح الذكور ضعافاً جنسياً وينتهى الطمث عند النساء^(١).

وقد وصف بريشر Brecher الآثار المباشرة لتعاطى الأفيون لأول مرة من خلال ملاحظاته الاكلينيكية بأنها شعور بالاسترخاء والراحة والنشوة مع شعور بالدوار قليل ورغبة شديدة فى النوم، وهبوط فى جميع العمليات الفسيولوجية نتيجة للهبوط العام فى الجهاز العصبى المركزى، واحتقان أوعية المخ الدموية، وضعف شديد فى الاحساس بالألم، وبطء فى حركة المعدة والأمعاء مع تقلص شديد فى عضلاتها ينتج عنه فقدان للشهية والامساك. ويحدث انخفاض شديد فى الرغبة الجنسية، وإدمان الأفيون يؤدي إلى حالة من الاعتماد الجسمى تسبب أعراضاً جسمية شديدة فى حالة الامتناع عن تعاطيه، منها الشعور بالقلق والتوتر والخوف والانقباض وحدة فى المزاج، ونوبات متكررة من التشاؤم مع اتساع حدقة العين وزيادة فى افراز الدموع من العين والمخاط من الأنف، وتستمر هذه الإفرازات حتى فى حالة نوم الفرد، ويتضح العرق الغزير مع إسهال شديد وقىء وفقدان للشهية وارتفاع فى درجة حرارة الجسم مصحوب بشعور بالبرودة.

وقد خدد بريشر Brecher الآثار الدائمة لإدمان الأفيون على شخصية المدمن بالآتى:

١ - التوتر الشديد والعصابية والحساسية الزائدة لأي مؤثر مهما كان صغيراً.

(1) Mehr J., 1983 Abnormal Psychology, New York: Winston and Haltrinehart. PP 240 - 241.

٢ - عدم القدرة على التكيف مع متطلبات الحياة، وعدم التوافق مع أفراد المجتمع.

٣ - عدم الاكتراث بمشاعر الآخرين والانحلال الخلقي.

٤ - ضعف الانتاج وعدم القدرة على العمل.

٥ - يصبح المدمن غير عابىء بما يدور حوله من أمور وتسيطر عليه اللامبالاة.

فالأفيون يغير من أخلاق الشخص وعاداته وسلوكه الشخصى من سبىء إلى أسوأ، ويضطرب جهازه الهضمى وسرعان ما يفقد ارادته ويصير سريع التأثر قريب الغضب، ثم تتدهور أخلاقه لتؤدي به إلى الجنون، ويعانى المدمن عند الامتناع عن المخدر من آلام المنع المفزعة سواء كانت جسمية أو نفسية وقد ينتهى إدمان الأفيون بصاحبه إلى الجنون^(١).

وقد أوضح هل وهرتزن وجلسر Hill, Haertzen and Glaser أن مدمنى الأفيون يتصفون بشخصيات سيكوباتية، وأن المراهقين المدمنين للأفيون يتفق أدائهم لاختبار M.M.D.I. (اختبار الشخصية المتعدد الأوجه) مع أداء الأحداث والمنحرفين غير المدمنين، ويزيد عنهم فى مقياس السيكوباتية، وأن هؤلاء المدمنين لا يشاركون فى الأنشطة اليومية لمجتمعهم ويتصفون بالقلق والكبت والاكتئاب، كما أنهم غير قادرين على حل مشاكلهم اليومية^(٢).

طرق تعاطى الأفيون :

طرق تعاطى الأفيون متفددة ومنها :

(1) Kimble G. A., and Others, 1980, Principles of General Psychology, New York: John Wiley. PP 114 - 115.

(2) Hill, Haertzen and Glasser, 1972, Psychological Aspects in Drug Addiction, In: David L. Sills (ed) International Encyclopedia of The Social Sciences, (Vol 3 and 4) New York: The Free Press. PP 98 - 100.

- ١ - التدخين بمفرده.
- ٢ - يدخن فى السيجارة أو الجوزة.
- ٣ - الاستحلاب تحت اللسان.
- ٤ - يبتلع مباشرة مع قليل من الماء، ثم يشرب بعده فنجان من القهوة.
- ٥ - يوضع فى بعض المشروبات الساخنة أثناء إعدادها (كالشاي أو القهوة)^(١).

وسوء الاستعمال الأكثر شيوعاً للأفيونات يشتمل على الأفيون نفسه ويحتوي على ١٠٪ مورفين Morphine وبعض مشتقاته مثل الكوداين Coadaine وديثيلمورفين Diacetylmorphine والهيريون Heroin، وديدروفورفين Dedrofarphie والديلوديد Delodead والديدروهيديروكسودرين Dedro Hy-droksodine والايكودال Ecodale وعدد كبير من المحاليل المركبة مثل الميردين Mepridine والبيثيدين Pethedine والديمورال Demoral والدولانتين Dolantine والكتيتوبيميديون Qitobimidon والميثادون Methadon والدولفين Dolophine والأميدون Amedone والديسكتوموميد Dexitomomide^(٢).

أهم مشتقات الأفيون :

(أ) المورفين : Morphine

هو أقوى مكونات الأفيون فعالية، وتبلغ نسبة المورفين نحو ١٠٪ فى المتوسط فى الأفيون. ويصنع المورفين من الأفيون أو يستخرج مباشرة من قش الخشخاش (ثمار الخشخاش المجففة مع الأجزاء العليا لسيقانه بعد حصده). والمورفين قلوي كريستالى أبيض وبعد أقوى مانع للألم عرفه

(1) Fith E. and Awine 1980, Durg Problem in The Sociocultural Context, A Basis for Polices and Programme Planning, New York: Geneva. P 200.

(2) Zhukovski and Azilevskayi 1975, Opium Popy. Newdelhi: Amerind Publishing Co. PVT, LTD. PP21.

الانسان ولا يوجد ألم يعجز عن انتهائه. وتقاس قوة أي عقار صناعي مانع للألم إلى قوة المورفين، ويؤثر المورفين بصورة رئيسية على الجهاز العصبي المركزي وعلى الأحشاء، وقد استخدم لعدة قرون لعلاج الاسهال من قبل أن يستخدم لازالة الألم. وينتج المورفين عادة تأثيرات مخدرة تحتوي على عدم الاحساس بالألم والحمول، والتغيرات فى المزاج^(١).

وإذا أعطى المورفين لشخص لديه بعض الآلام فإن الألم يختفى، وإذا أعطى المورفين لشخص ليس عنده آلام فإنه قد يشعر ببعض الأحاسيس غير السارة مثل الاحساس بالقلق أو الرعب دائماً، ويصاحب ذلك شعور بالتشيان والقيء. وتتكون تأثيرات المورفين العقلية من الحمول وعدم القدرة على التركيز، ولذلك فإن المورفين يسبب البلادة وتقليل فى النشاط الفسيولوجى العام للفرد، ويقلل حدة الابصار، ويصعب التفكير المنظم، ويبدأ الاعتماد الفسيولوجى على المورفين فى الظهور مبكراً^(٢). والتأثير الأساسي للمورفين هو زيادة التأثير الكفى (المانع) لقشرة المنع على مراكز الاحساس بالثلاموس، ومن ثم يقلل الشعور بالألم ويتنبه الجهاز الباراسيمبثاوي بالمورفين مما يؤدي إلى ضيق حدقتى العين وبطء النبض، وزيادة اللعاب، ويميل لإدمان المورفين بعض الشخصيات المميزة مثل القساميين ومضطربى الشخصية، وتظهر على الفرد سريعاً علامات الإدمان فنجده ضعيف البنية واهن الجسم، فاقد الشهية، ضيق فى حدقتى العين، ولديه اختلجات فى الأطراف، وضعف جنسى واضح، ثم تبدأ الأعراض العقلية فى هيئة تدهور خلقى، واضمحلال اجتماعى.^(٣)

وتهدف معظم الدراسات التجريبية إلى شرح أثر المورفين على الانسان

(1) World Health Organization 1973, Expert Committee on Dependence, Tech. R. Ser. No. 516. Geneva: W.H.O.

(2) Oakely S., Ray, M., 1974, Durg Society and Human Behaviour, Santi Louis: The C. V. Mosby Company. P:100.

(3) Okasha A., 1977, Clinical Psychiatry, Cairo: Egyptian Book Organization. P 417.

وبخاصة آثاره التخديرية أو المسكنة. وقد بين هل Hill أن المورفين يرفع قدرة تقدير الألم، إذ أنه يزيد عنده الاحساس بالألم، وقياس زمن الرجوع للمثيرات البصرية لدى مدمني المورفين، وجد أن المورفين يزيد زمن الرجوع البصري بصورة ذات دلالة عالية.

وقد لخص كل من ويكس وكولينز Weeks and Collins بحوثهم التي أجروها على مجموعة من الفئران، فوجدوا أن الفئران قد تعلمت طريقة الحقن الذاتي للمخدر، ذلك بأنهم كانوا يحقنون أنفسهم بالمخدر عندما يشعرون بالألم الانقطاع عن المخدر، كما أنها كانت تزيد حجم الجرعة عندما يقل حجمها عن النسبة التي اعتادوا عليها، أو يكرروا الحقنة أكثر من مرة، وعندما توقف اعطاء حقنة المورفين فإن الفئران قد فقدت حوالى ١٥ - ٢٠٪ من أوزانها وكانت هناك زيادة واضحة فى استثارته. وفى دراسة أخرى على الانسان وجدوا أن للمورفين أثر على الجهاز العصبى ويحدث نقص فى القوي العقلية العامة، ويثير الخيال، ويقلل الاستجابة للأحداث الخارجية، وينسب الفرد هوميه، ويسبب النعاس. وعند التوقف عن المخدر يصبح الفرد بليداً، متأرقاً، غير قادر على تركيز أفكاره وتنحل أخلاقياته، ويحدث عنده زيادة فى الهلوسات والانعكاسات، وتحدث هذه الانعكاسات من انتقال فعل المخدر المهبط للجبل الشوكى^(١).

ويصاب من يتعاطى المورفين بالهياج العصبى، والاكتئاب وانحراف المزاج. ومن آثاره أيضاً الغشيان والقيء وانكماش بؤرة العين وازدياد قوة انعكاسات النخاع الشوكى والتشنجات وتقلص عضلات المعدة والأمعاء، وتقلص القنوات المرارية والشعب الهوائية ويسبب المورفين الاعتماد النفسى والعضوي بعد فترة تتراوح من ٤:٣٦ ساعة^(٢).

(1) Teasdal J. D., 1973, Durg Dependence, In: Eysenck (ed) Hahdbook of Abnormal Psychology, London, Pittman Medical. P 104.

(٢) سعد جلال ١٩٦٨، اسس علم النفس الجنائي. القاهرة: دار المعارف. ص ٣٨٩.

وبالنسبة لأثر المورفين على الناحية الجنسية فقد وجد شيفرز Shefres فى بحثه أن النشاط الجنسي عند القردة المدمنة على المورفين يضعف، ثم ينشط عند منع المخدر. ووجد تميري وويلين Temery Welline أن الحرمان من المخدر عند الرجال يؤدي إلى استمرار الانتصاب وتكرار القذف، بينما يحدث للنساء لذة جنسية تلقائية. وبين سبراج Sprag إن المورفين يعمل كمنبه جنسى فى ذكور الشيمبانزي اذ بعد تناول الجرعة يحدث لها انتصاب جنسى، وتمارس العادة السرية أو تندفع للأداء الجنسي مع الاناث. ثم تأخذ الرغبة الجنسية والقدرة على اتيان العملية الجنسية فى الضعف تدريجياً حتى يحين موعد الجرعة التالية^(١).

فغالباً ما يسبب المورفين زيادة فى النشاط الجنسي باطالة مدة الجماع وسرعان ما تتلاشى هذه الزيادة وينتاب الفرد السرعة فى القذف ويسبب الإدمان المستمر على المورفين فقد الرغبة الجنسية ثم الضعف الجنسي.

طرق تعاطى المورفين :

١ - غالباً ما يؤخذ بالحقن تحت الجلد.

٢ - يؤخذ على هيئة أقراص بها نسب مختلفة من المورفين^(٢).

(ب) الهيروين : Heroin

واسمه العلمى هو دياسميل المورفين أو الديامورفين Dehystilmorphine وقد اكتشفه هنريس دريسر العالم الألمانى سنة ١٨٨٩ ، وكان يبحث عن قاتل للأگم له قوة المورفين وغير قابل للإدمان.

والهيروين عبارة عن بودرة بيضاء لا رائحة لها متبلورة، مرة المذاق تذوب فى الماء. وقد سميت هذه البودرة بالهيروين مشتقة من الكلمة

(١) سعد جلال ١٩٦٨، اسس علم النفس الجنائى. القاهرة: دار المعارف. ص ٣٩١.

(2) Fith E. and Awine 1980, Durg Problem in the Sociocultural Context, A Basis for Polices and Programme Planning, New York: Geneva. P 21.

الألمانية Heroisch بمعنى بطولى، ولم يكتشف الأطباء أن الهيروين أسرع وأقوى في إدمانه من المورفين إلا بعد اثنتى عشر سنة من استعماله، فإن أربعة ملايين جرعات من الهيروين تساوي في تأثيرها عشرة من المورفين. كما أن الجرعة المتوسطة للمدمن عادة ما تساوي أربعة من المليون من وزن الجسم إلا أن تأثيرها فوق الاحتمال وعند تعاطي الهيروين فإن الجسم يحوله إلى مورفين، والمورفين هو المسئول عن التأثيرات الفارماكولوجية للهيروين^(١).

ويقرر جاف Gaff أنه عند اختبار جماعة من المدمنين على التمييز بين المورفين والهيروين في حالة حقنها تحت الجلد، فإنهم لم يستطيعوا التمييز بين الاثنين، ولكنهم تمكنوا من التمييز في حالة الحقن بالوريد. وعلى الرغم من قوة الهيروين إلا أنه لا يحدث انتشاء للمدمنين أكثر مما يحدثه المورفين. ويتصف مدمنو الهيروين أنهم يعانون من عجز نفسى أو شخصى، فمدمنى الهيروين يتصفون بالاخباط، مصابين بالبارانويا، اتكاليين، متمردين، يهربون من الواقع، سيكوباتيين، عدوانيين، ومعظم هذه النتائج مستمدة من الملاحظات الاكلينيكية^(٢).

والهيروين غير مسموح باستخدامه حالياً طيباً في الولايات المتحدة الأمريكية وخمسين دولة أخرى إلا أن في فرنسا وإيطاليا وإنجلترا يستخدمونه في هذه الأغراض، وعندما تعاطى الهيروين فإن له ارجاعات شديدة وهى تتكون من الأخيلة والاحساس بالقوة والسعادة والميل إلى النوم، كما أنه يقلل من الرغبة الجنسية. وقد تؤدي الآلام الناتجة من منع المخدر إلى ارتكاب الجرائم كالسرقة والكذب أو العنف وأعمال القوة.

ويعتبر مدمنى الهيروين باضطرابات في الشخصية مع سلوك سيكوباتى

(1) World Health Organization 1975, Expert Committee on Drug Dependence, Techn R. Ser. No. 560. Geneva: W.H.O.

(2) Marlatt G. A., Rose F., 1980, Addictive Disorders, In: Alan S. Bellack and Michel Herscovitch (eds.), New Perspectives in Abnormal Psychology, New York, University Press. P 315.

وتدهور اجتماعى وأخلاقى مع فشل مستمر فى العمل^(١).

وينتشر استخدام الهيرويين بين المراهقين والشباب الذين يتعاطونه من باب التجريب أو التسلية أو مجاراة الرفاق. والهيرويين من المخدرات التى تسبب الإدمان بسرعة إذ يؤدي تعاطيه المنتظم لمدة أسبوع واحد فقط إلى الإدمان. ومن علامات الإدمان المميزة، التحمل أو الحاجة لزيادة الجرعة بصورة مطردة، والرغبة الملحة فى الحصول على العقار بأي وسيلة، وفقدان الشهية، الهزال، والضعف الجنسى، واضطراب الدورة الشهرية عند الإناث، وتقيح الجلد، وتسمم الدم، والتهاب الكبد أو غشاء القلب المبطن، والاصابة بالزهري والأمراض المعدية^(٢).

ويصاب مدمنو الهيرويين بالتسمم والوفاة نتيجة جرعة زائدة بطريق الخطأ أو لمحاولة الانتحار ممن يشعرون من الحياة أو لتسممهم بالشوائب السامة التى يخلطها التجار بالهيرويين. وتسبب هذه المزيجات هبوط التنفس أساساً، ثم فشل الدورة الدموية، وتبدو على المتسمم علامات النعاس أو الغيبوبة ونُطء التنفس وانكماش بؤرة العين. وتشير معظم الدراسات إلى انتشار الهيرويين بين الشباب ومعتلى الشخصية. ويبدأ الإدمان بالسعى وراء النشوة أو تخفيف الألم. ويستمر بعض الأشخاص فى التعاطى لسبب أو أكثر، ثم بعد ذلك يندفع المدمن فى التعاطى لتجنب أعراض الامتناع المزعجة^(٣).

وفى دراسة لتشيزك Shesek أعطى المخدر فى الوريد لـ ٤٢ من مدمنى الهيرويين، فقرروا جميعاً حيث تشابهت احساساتهم بالآتى: احساس

(1) Anslinger H. J., and W. F., Tampking, 1966, The Murders, New York: Avonbooks Dinision. P 79.

(2) Fort P. J., 1980, Heroin Addiction Among Young Men, New York: Geneva. P 77.

(3) Rathod H.N., 1968, Prevelance and Early Detection of Heroin Abuse. New York: Geneva. PP 549 - 551.

بالهلوسات مع تباطؤ في ادراك الزمن، وتركزت معظم الاحساسات الجسمية في المعدة، وتركزت الخيالات حول الأم، وخفت حدة الدوافع الجنسية والعدوانية ويضعف الدافع الجنسي^(١).

(ج) الكوكايين : Cocaine

شجرة الكوكايين شجيرة ذات أوراق دائمة حمراء. والكوكايين هو أهم مادة قلوية لورق الكوكا. وقد عرف الكوكايين عن طريق هنود الأنكا منذ ٥٠٠ سنة قبل الميلاد. وتقول الأساطير الهندية إنه إذا استطاع رجل يعاني سكرات الموت أن يستطعم مذاق أوراق الكوكا، وذلك بضغطها بين شفتيه، فإن روحه تدخل الجنة. وفي أمريكا الجنوبية يحمل الهنود الحمر أوراق الكوكا عندما يتقابلون كعادة من عادات التحية والاحترام. ويعتبر الكوكايين من أهم المخدرات البيضاء وأخطرها أثراً على الفرد. وتشير التقديرات المبدئية أن ١٠ ملايين أمريكي يتعاطون الكوكايين بانتظام، كما يتعاطاه وحوالي ٢٠٪ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم من ١٨ - ٢٥ وذلك في سنة ١٩٧٩.

وعرفت أوروبا الكوكايين في منتصف القرن التاسع عشر حين قدم الصيدلي الفرنسي أنجلومارياني أوراق الكوكا للجمهور سنة ١٨٥٦، وبعد ذلك أصبح الكوكايين يباع في الصيدليات بدون روشتات طبية، على شكل نقط للأنف ودواء للزكام، لأنه كان يخفف من انسداد الأنف. وساد انتشار واسع للكوكايين مما دفع التشريع سنة ١٩٠٦ في الولايات المتحدة الأمريكية بمنع صرف هذا العقار إلا في روشتة طبية. وعرفت مصر الكوكايين أثناء الحرب العالمية الثانية، وزاد انتشاره في هذه الفترة نتيجة للاستعمار الذي أحضره معه من الغرب. وبالرغم من التشريعات الدولية

(1) Rathod H.N., 1968, Prevalance and Early Detection of Heroin Abuse. New York: Geneva. P 553.

التي وضعت لمحاربة الكوكايين إلا أنه قد ساد فى بلدان كثيرة وأصبح انتشاره خطراً شديداً^(١).

آثار الكوكايين :

الكوكايين منبه قوي للجهاز العصبى المركزي، ويتجلى أثره المنشط فى حالة الإدمان فى حالة تهيج شديدة، وطلاقة اللسان، وقلة الشعور بالتعب، ويشير شعوراً بالسرور وقوة عضلية كبيرة. وتلى حالة التهيج مرحلة انهيار، وإذا زادت كمية الكوكايين فإنها تثير حالة ذعر ومخاوف وهذيان وتخيلات (دليل مميز للجنون الهذائى) تثير فى بعض الحالات تصرفات عدائية ضد المجتمع^(٢).

وينشط الكوكايين الجهاز العصبى الليمبثاوي فيسبب اتساع حدقة العين، شحوب الوجه، سرعة ضربات القلب، ومناعة ضد التعب ودقة فى الأفكار واتخاذ القرارات، وإثارة الرغبة الجنسية، وينتشر استخدامه بين الشخصيات السيكوباتية، ويسبب إدمانه ذهان كوكاييني يتميز بما يلى:

١ - هذيان تحت الجلد مع تقلبات مزاجية، أرق، كثرة الحركة، هلوسات سمعية، خداعات أثناء النوم.

٢ - هلوسات حسية: وتميز هذه الهلوسات ذهان الكوكايين حيث يشعر المريض بمسير حشرات مثل الديدان أو النمل أو البق على جلد يديه مع الاحساس بوجود أجسام غريبة تحت الجلد.

ويتميز المدمن بوجود قرح على أغشية الأنف الداخلية، ويؤدي الإدمان إلى انهيار الحالة العقلية^(٣).

(1) Department of Health and Education and Welfare 1977, Cocaine-Washington, Research Minography No. 13.

(2) Marlatt G.A., Rose F., 1980, Addictive Disorders, In: Alan S. Bellack and Bellack and Michell Hereson (eds.), New Perspectives in Abnormal Psychology, New York, University Press. 319.

(3) Okasha A., 1977, Clinical Psychiatry, Cairo: Egyptian Book Organization. P. 419.

وتختلف آثار الكوكايين فى بداية التعاطى عن الإدمان، ففى بداية التعاطى يشير كل القدرات العقلية، ويجعل لدى الفرد قوة جسدية. وقد قرر أحد المتعاطين أنه يستمر بدون نوم لمدة ٧٢ ساعة مستمرة عندما يكون تحت تأثير المخدر، ولكنه ينهار بعدها ويحتاج إلى كمية أكبر من المخدر لكى تساعده على النعاس. وينتج من الإدمان التعب الجسمى وضعف مستوي الذكاء فى كل اختبارات الذكاء، وعدم القدرة على تحمل المسئولية والافتقار إلى الحيوية والمبادأة واختلال التوازن النفسى، ويبدو المدمنون مهذو الأعين، ويفرزون الدموع باستمرار والعطس والتشأوب، والقىء والاسهال الذي يكون ممزوجاً بالدم، ونقص فى الوزن، ونسيان وانهاك وتشوش عقلى، واندفاع فى النبض وأرق وتشنجات فى العضلات الطرفية، ويكون الجلد جافاً وشاحباً ومصفراً، وتنتاب المدمن آثار سيئة فيفكر فى الانتحار ويتنابه الجنون^(١).

طرق التعاطى :

الطريقة المتكررة هى شم العقار^(٢).

(د) الكودايين : Codaine

وهذا العقار ليس فى خطورة المورفين، وهو يستخدم طبياً للتقليل من الاحساس بالألم، كما أنه يدخل فى معظم أدوية الكحة، ويؤدي تعاطيه المتكرر إلى الإدمان ويسبب ادمانه اعتماد جسمى ونفسى عليه.

ثانياً - الحشيش :

■ نبذة تاريخية عنه :

من المخدرات التى لها شهرة واسعة وانتشاراً كبيراً فى الشرق والغرب

(1) Mule S. J., and Brill H., 1974, Chemical and Biological Aspects of Heroin Dependence Ohio: CRC Press. P 142.

(2) Fith E. and Awine, 1980, Drug Problem in the Sociocultural Context, A Basis for Polices and Programme Planning, New York: Geneva. P 20.

الحشيش Hasish أو الماريجوانا Marijuana. وقد وردت أول إشارة عن الحشيش في كتاب صيدلة ألفه الامبراطور الصينى شنج يانج Sheng Yeng سنة ٢٧٣٧ قبل الميلاد، وسمى كتابه (المحررين الآثام) وكان له فى رايه فوائد طبية متعددة. وكلمة كانابيس Canabis يونانية الأصل، وتعنى الضوضاء ولعلها اشارة إلى الأصوات المركبة التى يحدثها المتعاطون. وقد أطلقت كلمة حشاشين فى الأصل على طائفة من الاسماعيلية عاشت مع زعيمها حسن بن صباح فى قلعة الموت بين أواخر القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى عشر فى الجبال فى شمال إيران، ويقال إنه كان يحث مرزبيه على تعاطى مزيج من الحشيش والداتورة، والأفيون، ثم يتركهم بصحبة الفتيات فى بستان جميل، ثم يوحى لهم وهم تحت تأثير المخدر أنهم يرون الجنة ومتاعها وسوف يدخلونها إذا نفذوا أوامره، ثم يأمرهم باغتيال خصومه^(١).

وقد عرف المصريون القدماء الحشيش، كما عرفه الآشوريين والفرس والهنود والصينيون. وقد وصفه هوميروس فى الأوديسا باسم (نبيتى) وكذلك ذكره المؤرخ اليونانى بلىنى، والطبيب الرومانى جالينوس، وابن البيطار وهو أول طبيب وصف التخدير الذى يسببه الحشيش الذى كان يزرع فى بساتين مصر وذلك قبل القرن الثالث عشر الميلادى، وانتشر الحشيش فى مصر واليونان وتركيا فى القرن الخامس عشر الميلادى.

ورويت أجاديث شتى عن أول من عرفه ومنها رواية المقرئى وقد جاء فيها: «كان شيخ للفقراء يدعى حيدر كثير الرياضة قليل الطعام، نشأ بخرسان، واتخذ زاوية بأحد جبالها ومعه جماعة من الفقراء، وأقام أكثر من عشر سنين لا يدخل عليه إلا رجل واحد منهم، ثم خرج إلى البرية فى يوم شديد الحر، وعاد وقد علا وجهه نشاط وسرور فأذن لأصحابه بالدخول

(١) الأمم المتحدة (١٩٧٦): مكافحة اساءة استعمال المخدرات. نيويورك: جنيف. ص ٢١

عليه فسألوه عن هذا الحال الذي صار إليه ، فقال خطر بهالى الخروج إلى الصحراء ، فخرجت ، فوجدت كل شىء من النباتات ساكناً لا يتحرك لعدم وجود الريح ومررت بنبات مورق قرأته يميل بلطف ويتحرك كالشمل النشوان ، فجعلت أقطف منه أوراقاً وأكلتها فحدث عندي من الارتياح ما ترون . فأكلوا من أوراقها فحدث عندهم من السرور والطرب ما عجزوا عن كتمانهم فأمرهم الشيخ حيدر بكتمان سره إلا عن الفقراء وبعد موته شاع أمر هذا الحشيش فى خراسان وفارس ولم يكن أهل العراق يعرفونه حتى ورد عليهم ملوك سيف البحر المجاور لبلاد فارس أيام المستنصر بالله سنة ٦٢٨ هجرية ، فحملوه أصحابها معهم فاشتهر فى العراق ووصل خبره إلى الشام والروم فاستعملوه^(١).

وقد عرفت القبائل الجرمانية القديمة نبات القنب سنة ٥٠٠ ق.م. وقد اكتشفت بذور الحشيش فى مقابرهم بالقرب من برلين ، وفى أوائل القرن السادس عشر أشار الأديب الفرنسى «رابليه» إلى خواص النبات المخدرة ، وفى نفس هذا القرن أدخل الأسبان الحشيش فى شيلي ، وفى البرازيل أحضر العبيد معهم الحشيش حين استخدمهم المستعمرون لزراعة أراضيهم ، ثم قام الهولنديون بإدخاله فى جنوب أفريقيا ، وينسب المؤرخون بداية اهتمام الأوروبيين العلمى بالحشيش إلى ملاحظات العلماء الذين رافقوا حملة نابليون على مصر ، إذ قال أحدهم سنة ١٨٠٣ «أن الحشيش هو مادة النيبينثية المخدرة التى وردت فى أوديسا هوميروس» . وقد قام الطبيب الفرنسى «مورودي تور» الذى كان يعمل طبيباً نفسياً فى إحدى المستشفيات لعلاج الأمراض العقلية بإجراء أول دراسة علمية حول الحشيش كعلاج للمرض العقلى سنة ١٨٤٠ ، ثم كتب عنه كتاباً وتعاطاه شخصياً فوصف الهلوسات والخدج والسعادة التى شعر بها^(٢).

(١) حسن فتح الباب ١٩٦٧ ، المخدرات سلاح الاستعمار والرجعية . القاهرة : درا الكاتب

العربي ص ٥ - ٥٢ .

(٢) المرجع السابق ص ٤٩ - ٥١ .

تعريف المخدر :

منذ أربعة أو خمسة آلاف سنة، ومنتجات نبات القنب -Cannabis Sata- via يستعملها ملايين البشر كمخدر، ويندر أن توجد منطقة من مناطق العالم لا يمكن فيها زراعة القنب الهندي، فهذا النبات قد يصل في ارتفاعه إلى مدي يتراوح بين ٣٠ سم، ستة أمتار تبعاً لطبيعة التربة والمناخ وطريقة الزراعة. ونبات القنب أو المادة الخام المستخرجة منه والمستحضرات التي تصنع منه بأساليب حرفية تطلق عليها مئات الأسماء المختلفة، وتتركز المكونات المخدرة لراتنج القنب (الذي يعرف باسم الحشيش) في الأطراف المزهرة لأنثى النبات بنوع خاص، وكان راتنج القنب أكثر أشكاله فعالية حتى سنوات قليلة ماضية، حين ظهر منتج جديد للقنب في الأسواق المحظورة هو القنب السائل المركز ويحتوي على ٦٠٪ من الـ THC (رابع هيدروكانابينول) وهو أشد خطراً من سائر أشكال القنب. وقد توصل الكيميائيون إلى استخراج أربعة مركبات من النباتات هي: الكانابينولات، ويوجد الكانابينول في صمغ القنب، ثم اللادان السميكتان ٩ (Δ 9) و ٨ (Δ 8) وتتراهدروكانابينول وأيضاً يحتوي الحشيش على مادة تشبه الأتروبين الذي يسبب جفاف الزور.

والحشيش له منتجات تحوي (الماريجوانا - زيت الحشيش - الزيت الأحمر) ويكمن النشاط النفسي في الـ THC الذي يوجد بكثرة في الأجزاء الغليظة من النبات^(١).

آثار الحشيش :

يؤدي الحشيش إلى اختلال الاحجام والاشكال والمرئيات والمسافات ويزيد الزمن ببطء شديد بالنسبة للمدمن، ثم يشعر أن الزمن قد توقف وتختل الذاكرة بالنسبة للأحداث القريبة، وكذلك الانتباه والتركيز، فيبدأ

(1) Mehr J., 1983, Abnormal Psychology, New York· Winston and Harlitrinehart. P P 249 - 251.

المتعاطى فى الخيال والتخيل ويخطىء فى تفسير ما يدركه بحواسه، وتنتابه الهلوسات البصرية والسمعية. وقد تحدث هذه الآثار بصورة غير متتالية (متقطعة) فيمر المتعاطى بدورات متتالية من الهلوسة واختلال الحواس واضطراب الانفعال ليعود إلى حالته الطبيعية بعد فترة، ثم يضطرب بعد ذلك. ومن آثاره على الجسم قدد الأوعية الدموية الذي يؤدي إلى احمرار العين، فقد القدرة على التوازن الحركى، انخفاض ضغط الدم، سرعة ضربات القلب التى قد تؤدي إلى هبوط القلب عند المصابين بأمراض القلب^(١).

وقد وجد جروزيرج Grozberg من دراسته لـ ٣٦٠ جندي فى الجيش الأمريكى كانوا يتعاطون الماريجوانا، فقد وجد أنهم يعانون من اضطرابات عقلية ظاهرة، ويشكون من ضعف الذاكرة، وعدم القدرة على التركيز، والتبلد، الكسل والاصابة بحالات البارانونيا، واضطرابات الجهاز التنفسى. ويؤكد الباحث أن الحشيش يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وتهيج الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة والسرطان الشعابى. ويؤدي الإدمان على الحشيش إلى انخفاض هورمون التستوسترون (هرمون الذكورة) فى الدم مما يؤدي إلى تضخم الثديين وتأنث الجسم والضعف الجنسى وذلك بعد فترة ليست بقصيرة من الاستعمال المتتالى للعقار^(٢).

وفى إحدى الدراسات التى قام بها كل من جونز وبوشمان وبينوفيتز وبوشمان. Bochman, Jones, Benoivitz & Boch على مجموعة من الذكور المتطوعين، حيث أعطوا للمفحوصين جرعة من الـ THC (وهى المادة النشطة

(1) Mehr J., 1983, Abnormal Psychology, New York: Winston and Harlirinehart. P P 249 - 251.

(2) Robert C., Kolondy 1975, Research Issues in the study of Marijuana and Male Reporductive Physiology in Human In: Jared R. Tinlenberg (ed), Marijuana and Health Hazards - Metho - dological Issues in Current Research - London: Academic Press (INC.,). PP. 71 - 73.

فى الحشيش والتى تسبب الاعتماد النفسى) وذلك كل أربع ساعات لمدة تتراوح من ١٠ - ٢٠ يوماً وكانوا يزدون نسبة الـ THC فى كل جرعة إلى أن وصل إلى متوسط مساو لمتوسط ٣ سجناء من الحشيش. وعندما منع هؤلاء المفحوصون فجأة من تناول الـ THC قرروا الخبرات التالية: عدم الثبات الحركى، عدم الهدوء والراحة، انخفاض فى الشهية، اضطراب فى النوم بصورة ملحوظة، غثيان وقىء، قىء + اسهال وفقدان فى الوزن. وقد أكد ابرمسون وكوهايين Abramson & Choen إن تعاطى الحشيش يسبب تلف فى الرئة وفقدان التوازن الحركى وكذلك قلة افراز الهرمون الجنسى^(١).

وقد بين تايجن الماهى Tighani El Mahi إن إدمان الحشيش أو ما يسميه التسمم بالحشيش من سماته: اضطراب الحس الزمنى، واضطرابات فى ادراك المسافات، فريما تبدوا أكبر أو أصغر من حجمها الحقيقى، والأشياء الثابتة ربما تبدو متحركة، والأشياء العمودية ربما تدرك كمنحنيات، كما أنه توجد اضطرابات فى عمليات التفكير، والمزاج. ويناقض تايجن الماهى وجهة نظر المتعاطين من أن الحشيش يساعد على زيادة القدرة الجنسية أو الفاعلية ويتضح ذلك فى طول مدة الجماع، فيقول إن اضطراب الزمن والادراك الوقتى لدى المدمن يجعله يتخيل إنه استمر فى عملية الجماع لساعات طويلة، وما هى الا دقائق أو ثوان معدودة، وهذه الاطالة ما هى إلا وهم يجمله اضطراب الادراك الزمنى. وإن الاستمرار فى التعاطى يؤدي فى النهاية إلى الضعف الجنسى نتيجة لقلة افراز هرمون الذكورة (عند الرجال) ووقف الطمث عند النساء^(٢).

ويسبب الحشيش زيادة القدرة الحركية مع اضطراب القدرة على تعرف

(1) Jualith G., 1982, Abnormal Psychology Concepts. Issues, Trends, New York: Macmillan Publishing Co., INC. P 426.

(2) Mahi T., 1958, Durg Addiction-Cannabis India (Hashish), Kartoum: Faculty of Medicine. 3 - 7.

الزمان والمكان، وانعدام الاحساس بمرور الزمن وإن زادت الجرعة سببت ارهاقاً واختلاطاً عقلياً مع ظهور علامات ذهانية وهذيان تحت حاد، وهلاوسات بصرية وسمعية مع الاحساس بالرعب واختلال الأنسية. وعادة ما يشغف متعاطي الحشيش بالسكريات مما يبدو أن للحشيش خاصية انقاص السكر فى الدم، كما إنه مدر للبول. وأن الانتظام على استخدام الماريجوانا قد ينقص هرمون الذكورة بنسبة ٣٠٪ مما يؤدي إلى اصابة المدمن بالضعف الجنسي^(١).

وقد أجمعت الدراسات المصرية التى قام بها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ودراسة سعد زغلول المغربى، ودراسة سويف عن استخدام الحشيش فى مصر أن آثار تعاطي الحشيش كالآتى: أن الحشيش يحدث اضطراباً فى الادراك بحيث تطول المسافات وتختلف الأحجام، وتهتز حدود الأشياء، وتبدو الألوان أكثر نصوصاً، ويمر الوقت ببطء، ويقل الانتاج أثناء التعاطي وعند الرغبة فى تناول المخدر، وتضطرب الذاكرة والانتباه والتركيز، ويختل الادراك البصري والسمعى مع ميل إلى تضخيم المدركات. وأن اضطراب الإدراك السمعى أكثر شيوعاً من اضطراب الإدراك البصري، واضطراب التفكير المتمركز فى تدفق الأفكار وتفكك الفكر وعدم ترابطه وبطء التفكير وصعوبته^(٢).

طرق تعاطي الحشيش :

من الصعب حصر طرق تعاطي الحشيش، حيث تختلف طريقة التعاطي باختلاف المكان والزمان والأفراد الذين يتعاطونه، ولكن سنحاول توضيح هذه الطرق كما أوضحتها الكتابات والبحوث السابقة وكما لاحظتها الباحثة:

١ - التدخين بلفه فى سيجارة.

(1) Okasha A., 1977, Clinical Psychiatry, Cairo: Egyptian Book Organization. P. 417.

(2) Souief M. I., and Others. 1980, The Egyptian Study of Chronic Cannabis Consumption. Cairo: National Center for Social & Criminological Research. PP 17 - 28.

٢ - الجوزة أو البرطمان.

٣ - أكل المخدر بمفرده أو مع مواد سكرية.

٤ - حرق المخدر واستنشاق البخار المتصاعد.

٥ - اضافة المخدر لسائل أثناء اعداده كالشاي والقهوة.

ثالثاً - عقاقير الهلوسة (مثيرات الهلوسة) :

■ نبذة تاريخية :

أدي تطور علم الكيمياء إلى اكتشاف العديد والعديد من العقاقير ذات التأثير التخديري على الفرد ، منها ما هو مشتق من مخدرات طبيعية ، ومنها ما هو مركب من بعض المواد الكيميائية. وقد فاق عدد العقاقير المخدرة المصنعة أضعاف عدد المخدرات الطبيعية ، وأن حجم المدمنين لهذه المواد يفوق حجم المدمنين لأنواع المخدرات الطبيعية. وتعطي الحضارات العريقة أمثلة عديدة عن استعمال المواد الباعثة للذهيان ، ولم يقتصر تعبير (عقاقير مهلوسة أو مواد باعثة للذهيان) على حامض LSD (الليسيرجيك ديثيتلاميد) إلا حديثاً ، ومادة STP و DMT وغيرها من المواد الحديثة. وال LSD يستخرج من فطر الأرجوت Ergot ، وقد اكتشفه الكيميائي هوتمان Hovman الذي وصف الدوخة والهلوسة اللتين شعر بهما نتيجة لتعاطيه هذا العقار ، وسجل هذا العقار طبيياً سنة ١٩٤٣ ، وهو مركب نصف صناعي يجري تحضيره من (حامض الليسيرجيك)^(١).

آثارها :

يسبب تعاطي هذه المواد LSD تبديلاً في المزاج ، وخلل في الاحساس بالزمن وإدراكه ، واضطراب الإدراك الحسي ، والسمعي ، ويتناب متعاقباً مجموعة من الانفعالات يسهل ملاحقتها مثل : أشعور بالفرح والفرح

(1) Smith D. E., 1967. LSD - an Historical Perspective, New York: Journal of Psychedic Drugs. PP 3 - 7.

وشمولية الرؤية، ويخيل للمدمن وهو تحت تأثير هذا العقار أن هناك من يسعى لإيذائه وسجنه والسيطرة على قواه العقلية ويشير هذا العقار الهلوسات في دقائق معدودة وبكميات صغيرة (25 - 50 ug). ويسبب هذا العقار أيضاً ارتفاع ضغط الدم وسرعة النبض والغثيان والقيء، ورعشة اليدين والأرق، ويشعر المريض بهلوسات بصرية ملونة وتتغير المرئيات لتصغر أو تكبر، أو تقترب وتتخذ أشكالاً غريبة. وتختلط الحواس فتصدر الموسيقى مثلاً من لوحة يراها أمامه، وتتخذ الأصوات صوراً معينة ويبدو المتعاطى في حالة هيام وحلم. وقد يصاب المدمن بالاكتئاب الذي يدفعه إلى الانتحار ويصاب أيضاً بالخلط الحاد، والهذيان والمعتقدات الوهمية الباطلة الاضطهادية والتي قد تستمر حتى بعد الامتناع عن المخدر.

ويسبب هذا العقار الاعتماد النفسي فقط ولا يؤدي إلى اعتماد جسدى وقد يؤدي إلى الإصابة بالفصام بين ذوي الاستعداد للإصابة بهذا المرض^(١).

وقد ظهرت كثير من الدراسات قام كرلت Craletti بجمعها من ٢١٤ مرجع وقد اوضحت هذه الكتابات ملخصات دراسية سلون ودوست Sloe-na and Doust كما اوضحت أن LSD يحدث اضطرابات في التركيز والذاكرة. وقد بين لندت Landis حدوث بعض الخلل في الأداء الحركي وقد أيدته في ذلك كلوسن Clousen وأوضح أبرمسون وآخرون Abramson et al أنه إذا زادت جرعة الـ LSD فإنها تؤدي إلى ظهور علامات العصبية، والاضطراب في الإدراك، واختلال في التركيز والانتباه، وعدم القدرة على إدراك العلاقات المكانية، واختلال الأداء الحركي، وتدهور في الأداء العقلي، أظهره اختبار ثوستون للذكاء، واختلال في زمن الرجوع للمثيرات السمعية

(1) Smith D.E., Rose A. J., 1971, LSD-Its Use Abuse- and Suggested Treatment, New York: Journal of Psychedelic Drugs. PP 17 - 23.

والبصرية، وقد اتضح من الدراسة أن الـ LSD يؤدي إلى اختلال الأداء على اختبارات قياس الاسترجاع^(١).

الميسكالين :

وهو أحد القلويات Alkaloids التي عزلها لوين ١٨٨٨ Lewine. ويعتبر الميسكالين العنصر الفعال البسيط (لصبار المكسيك) والاسم العلمي له هو لوفو فوريا ويليامس Lophophorus cactus وكان يتعاطى كدواء، وهو أقل نشاطاً من عقار LSD ولكن يتشابه معه فيما يحدثه من اضطرابات في الشخصية تشابه أعراضهما أعراض مرض الفصام^(٢).

ويوجد العديد من الدراسات عن آثار الميسكالين تعتمد على الوصف الشخصي للمستطوعين، ماير - كروس Mayer Cross أوضح حدوث اختلال في الإدراك البصري وهلوسات بصرية، فقد يري الشخص الأشياء مهتزة، ويلاحظ وجود أشياء تتحرك في الظلام، أو عندما يغمض عينيه. كما يلاحظ عليه القلق، وعدم الوعي، ويشبه الشخص متعاطي الميسكالين في صفاته شخصية مريض الفصام. كما أنه يمكن أن يحدث له أعراض الذهان وزيادة الاكتئاب، وفقد الابصار والهلوسة^(٣).

البيسلوسيين والبيسلوسين :

وهما المادتان النشطتان لمادتي الهلوسة بيسيلوسيب مكسيكانا وهما نوعان من العقاقير المقدسة لدي هنود المكسيك. وهناك الكثير من هذه المواد التي تسبب الهلوسات وتشترك جميعها في نفس الآثار وخاصة

(1) Trouton, D., and Eysenck H. J., 1961, The Effects of Drug on Behaviour, In: Eysenck H. J., (ed), Handbook of Abnormal Psychology, New York: Basic Book. P 679.

(2) Teasdal J. D., 1973, Drug Dependence. In: Eysenck (ed) Handbook of Abnormal Psychology, London, Pittman Medical. P 254.

(3) Trouton, D., and Eysenck H. J., 1961, The Effects of Drug on Behaviour, In: Eysenck H. J., (ed), Handbook of Abnormal Psychology, New York: Basic Book. P 679.

فيما يتعلق بالهذات واخذعات البتربة والسمنية واخلال المركات، ومنها مادة DET، DMT وهما اختصار للديمتلترتيامين ولدتيلترتيامين. ومادة STP (ديمتو كسيميتا مفيتامين) وهى مركب اصطناعى يشبه الميسكالين من الناحية الكيمائية وتدوم آثاره المهلوسة مدة اطول من مادة الـ LSD^(١).

المنبهات : Stimulants

أهم المنبهات هى الأمفيتامينات ويشمل التعبير «أمفيتامين» Amphetamine جميع الامينات الصناعية التى تشبه من عدة اعتبارات الادريثالين وهو الهرمون الذى يفرزه الجسم البشرى، وقد تبين من الدراسات أن الامفيتامينات تساعد على زيادة انتاج الاثارة الطبيعية فى الجسم Catecholamines وهى المواد التى تزيد من ضربات القلب وترفع معدل التنفس، والامفيتامينات تسبب فقد الشهية، وتنبيه الجهاز العصبى المركزى، والامفيتامين والديكسامفيتامين هى المواد الأكثر شيوعاً من هذا النوع. وهناك مواد أخرى كالفينيميترازين والميتيلفينيدات، ولهما آثار فارماكولوجية قريبة جداً من المواد السابقة. وقد اصطنعت هذه المخدرات فى مطلع القرن العشرين واستعملت لأغراض علاجية فى السنوات الثلاثين، وتؤخذ فى العلاج على هيئة أقراص.

والاستعمال الأكثر سوء لهذه الامفيتامينات هو حقن كميات كبيرة Speed فى الاوردة. وتتسم آثارها بنزعات عدوانية وتهجمية وذهان هذيانى ولا يستطيع المدمنون القيام بأعمالهم نظراً للنبعية الجسمية للعقل، وقد بين الخبراء أن هذه المواد أصبحت متداولة بدرجة كبيرة وخاصة فى السنوات الماضية. انتهى البحث الذى أجراه Robinson وتلاميذه أوضح أن ٢٥٪ من طلاب المدارس الثانوية يستخدمون الامفيتامين مرة

(1) Yolles S. F., 1968. Statement on LSD-Marijuana and Other Dangerous Drugs - Washington, United Press International, P 16

أو مرتين على الأقل وأن هؤلاء الذين يتعاطون هذ المواد كانوا في الأصل متعاطين للماربجوانا^(١).

ويعتبر الإدمان على الامفيتامين غاية في الخطورة فالشخص الذي يدمن يصبح ذهانياً للأمفيتامين. وغالباً ما يظهر مدمنو الامفيتامينات أعراض البارانونيا فيحسون أن الجميع يتكلمون عنهم، ويحاولون الاستماع إلى أحاديثهم، ويخططون ضدهم ويتحولون إلى أشخاص عدوانيين، ويمكن أن يقتلوا في محاولتهم للدفاع عن أنفسهم ضد هؤلاء الاعداء الوهميين، كما يصاب المدمنين بضمور المخ Croves, Frebac. ويشعر مدمن الامفيتامينات بالنشاط والمرح وكثرة الحركة ويشعر بأنه مفرط الثقة بنفسه على الرغم من أخطائه، وقد يصاب بالقلق، ويعانى ضعف الشهية ونقصان الوزن، وتقلب المزاج والضعف الجنسي ويعانى من هلوسات سمعية ومعتقدات اضطهادية وهمية باطلة، ويشعر بالشك والخوف، ويقوم بالابتعاد عن الناس^(٢).

المسكنات : Sedatives

غالباً ما يتم تصنيف هذه المواد تحت قائمتين واسعتين الأولى تتمثل في المنومات وتنقسم إلى منومات مشتقة من حامض الباربيتوريك Barbituratic Amine ومنومات غير مشتقة من حامض الباربيتوريك، وتمثل في الفينوباربيتال Phenobarbital. والثانية تتمثل في غير المنومات مثل Methaqualone and Aptimit، وقد وجد أنها تساعد على ضبط حالات الصرع، كما أنه يخفف من حالات القلق وتساعد على جلب النوم والتغلب على الأرق، وتهبط المنومات وظائف المخ مثل الحصر، فتضعف القدرة على المهارات الحركية، ويشعر المتعاطى بالنشوة في البداية ثم النعاس والخمول وضعف الابصار والخطأ في تقدير زمن الرجوع

(1) Mule S. J., and Brill H., 1974, Chemical and Biological Aspects of Heroin Dependence Ohio: CRC Press. PP 149 - 151.

(2) Jualith G., 1982, Abnormal Psychology Concepts Issues, Trends, New York: Macmillan Publishing Co.. INC. P. 421.

السمعى، واختلال الحكم على الأمور، واختلال فى ادراك الزمن (ير الزمن بسرعة)، كما أنها تخفض ضغط الدم وتضعف الجهاز التنفسى وتسبب الامساك والافراط فى استخدامها يسبب ظهور أعراض الحمل خلال ١٤ يوماً من استعمالها، فتتخفف عدد ساعات النوم وتظهر علامات التسمم الخفيفة وعند الوصول إلى المرحلة القصوى يمكن أن تهدد هذه الاعراض الحياة تماماً (Cooper et al) (١).

المهدئات : Tranquillizers

وهى نوع من المسكنات ولكنها أقل فى حدتها من السابقة وهى تنتمى إلى Benzodiazepines وتباع باسم الفاليوم والليبريوم، وقد يصفها الأطباء لعلاج المشكلات العصبية. وقد يعتاد الناس على هذه العقاقير كما يعتادون على المخدرات القوية بنفس الدرجة، فهم يتعاطون المهدئات لشعورهم بالاكنتاب وبصورة تدريجية يتكون لديهم الاحتمال ويجدون أنفسهم فى النهاية يتناولون كميات اكبر وأكبر، ويعانون من أعراض الامتناع الشديدة إذا حاولوا منع المخدر.

وبالتالى يمكن لنا أن نقوم بتصنيف المخدرات ذات التأثير النفسى الفعال وذلك طبقاً لمطابقتها بمخدرات أخرى، فالمخدر المطابق لغيره يتم وضعه فى فئة واحدة والغير مطابق يوضع فى فئات مختلفة ومن التصنيفات المعترف بها فى هذه الفترة ما يلى:

١ - فئة العقاقير المهدئة المنومة Sedative Hyponotic ، وهى أكثر الأنواع التى تجلب الرغبة فى النوم ولها تأثير فعال على الجهاز العصبى المركزى وهى تتضمن:

(أ) الكحوليات.

(ب) الاقراص المنومة

(1) Norback J., 1980, The Alcohol and Drug Abuse - Yearbook Directory. New York: Vannorstrand. P 450.

(ج) العقاقير المضادة للقلق (أي التي لا تؤدي إلى القلق) وينتج عن تناولها فقدان التوازن الحركي وزيادة في التوتر والقلق وتلف الوظائف المعرفية وفقدان الاحساس والغيبوبة.

٢ - المنبهات Stimulations

٣ - المهدئات Sedatives

٤ - مضادات الاكتئاب Anti - Depression

٥ - عقاقير الهلوسة Hallucinogens

٦ - الأفيون ومشتقاته Opiate

٧ - الحشيش Hashish^(١).

الوجهة السيكلولوجية للإدمان :

Psychological Aspect to Addiction.

١ - النظرية السلوكية لإدمان المخدرات :

Behavioural Theory of Drugs Dependence.

هناك الكثير من الأبحاث الخاصة بالنظرية السلوكية لإدمان المخدرات ولكن السلوكيين فضلوا استخدام مفهوم طبيعي يتمثل في (خفض التوتر) ينسبون إليه إدمان المخدرات، فالأفراد يتعاطون المخدرات ليخففوا من مشاعر الألم، الغضب، الضيق، وخاصة القلق. فإذا كانت المخدرات تساعد على خفض كل هذه الأنواع من المشاعر فإن الأفراد الذين يتعاطونها يحصلون على جانب كبير من التعزيز الإيجابي Positive Reinforcement، وبالتالي فهم يميلون إلى تعاطي المخدرات مرات ومرات عديدة ومتتالية.

(1) Belknad J. K., 1978, Drugs and Human Behaviour. In: Joltzman, W. H., (ed) Introductory Psychology in Depth-developmental Topics; New York: Harper's College Press PP 258 - 260.

وقد توصل كزبل ١٩٧٥ Coppel أنه لا يوجد سند واحد لنموذج سوء استخدام المخدر لخفض التوتر، وأوضح Coppel مجموعة من الدراسات تبين أن تعاطي المخدرات لا تؤدي إلى خفض التوتر منها دراسات ميفلد وآلوان 67 Mayfield & Allen، ماكينم وهيلووميندلسون، Menamee, Hello, Mendelson 68، مينكر Menaker، ميندلسون ولادو وسلومن Mendel-son، نثام، تيلر، لونسطين وآخرون، Natham 64، وليامز Williams 66، Tuler، Lawenstein et al 70.

وقد أجريت دراسة لتوضيح المشكلة المتعلقة بأخذ المخدر أو سوء استخدامه لخفض التوتر، فقد أجري كل من Palwy, Schuenman & Gralsen تجريبهم على المتطوعين، وقد أوضحوا أن حدوث الألم يجعل الأفراد يشعرون بالقلق أو التوتر، وفي هذه الدراسات كان الألم يتمثل في أن يتلقى المفحوصون صدمات كهربائية مؤلمة قبل تعاطي المخدر، وبعد الصدمة يسمح للمفحوصين بتعاطي المخدر. وقد تم مقارنة المتطوعين بمجموعة أخرى ضابطة (سمح لهم بشرب المخدر) دون تعريفهم أنهم سيتلقون صدمة كهربائية وقد أوضحت رولي Rolwy وزملائها أنهم كانوا في حالة من الدهشة عندما وجدوا أن مستوي القلق كان مرتفع بعد شرب المخدر، ويرجع ذلك إلى أن المخدر كان منبع للتوتر في حد ذاته لمعظم الأفراد. وقد اعزى هؤلاء الباحثون ومجموعة أخرى منهم «بلوم وريتشارد» Blum & Richard 79، وجيسر Jessar 77، بروشت، بركاش، فلنجستد وآخرون 73 Braucht, Brakach, Fullingstad et al.

أن سوء استخدام المخدر يرجع إلى:

- ١ - طبيعة المخدرات وآثارها السيكولوجية وطريقة الحصول عليها واستعمالها.
- ٢ - العوامل الوراثية.
- ٣ - شخصية المدمن.

٤ - العوامل السيكودينامية (الضغط، الصراع، الحاجات، الدوافع... الخ)^(١).

١ - طبيعة المخدرات :

لكل مادة كيميائية تركيبها الخاص الذي يسمح لها بالمرور في الجسم ويتغير أثناء مرورها صورة العقار الأصلية حيث تصل إلى الجهاز العصبي ويتم التفاعل بين العقار والمستقبلات ويحدث التأثير على الجسم والمخ. ويرتبط المدمن بالعقار نظراً لما يحدثه له من آثار مفرحة وخفض للقلق والتوتر أي نتيجة للتعزيز الإيجابي الذي يجعله بعيد استخدام المخدر للحصول على نفس التعزيزات وقد يضطر إلى زيادة الجرعة للوصول إلى الأثر الأول، وكذلك تؤثر طريقة استخدام المخدر في حدوث الإدمان إذ تزداد فعاليته وسرعة وصوله إلى المخ حسب طريقة الاستعمال، ويعتبر الحقن في الوريد من أسرع الوسائل للوصول إلى الإدمان يليه التعاطي عن طريق الفم، كما يساعد سهولة الحصول على المخدر وتوافره في حدوث الإدمان^(٢).

٢ - العوامل الوراثية :

وقد اتبع منهج أو أكثر من هذه المناهج لإيضاح علاقة الوراثة بالإدمان:

١ - دراسات على الحيوانات.

٢ - دراسة نسبة حدوث الإدمان في أبناء من أسر المدمنين.

٣ - دراسة التوائم.

وبالنسبة للمنهج الأول، فقد تمكن من ملاحظة أن الفئران الذين تعلم أبائهم إدمان المخدرات كانت تدمن أيضاً هذه المواد بدون تدريب كما أوضحت دراسة ولكر Walker⁷³.

(1) Jualith G., 1982, Abnormal Psychology Concepts Issues, Trends, New York: Macmillan Publishing Co., INC. P. 434 - 435.

(2) Wilker A., 1962, Opiates Addiction - A Psychological and Neurophysiological Aspects in Relation to Clinical Problem. Washington. P.150.

وبالنسبة للمنهج الثانى: فقد وجد ولكر Walker أن من العوامل الرئيسية المرتبطة بتعاطى العقاقير بين الطلبة، سوء استخدام الوالدين للعقاقير، فهناك ارتباط بين إسراف الأب فى تعاطى المهدئات وتعاطى الأبناء لنفس العقاقير. وأن نسبة حدوث الإدمان لأبناء من آباء يتعاطون المخدرات تتراوح بين ١٣: ١٧ أمثال نسبة حدوث ذلك من أبناء من آباء لا يتعاطون المخدرات. والأرجح فى ذلك أن الأبناء يقلدون سلوك تعاطى المخدرات الذي يشاهدونه فى آبائهم^(١).

✱ - شخصية المدمن :

فقد توصل ونك Winick إلى وجود بعض السمات تظهر على شخصية الأفراد الذين يدمنون المخدرات وتوصل إلى ذلك باستخدام أسلوب التحليل النفسى والاختبارات النفسية ودراسة شخصيات مجموعة من الأطفال على مدار السنين ثم مقارنة من يدمن منهم عند البلوغ بغير المدمنين منهم.

وقد صنف الشخصية الإدمانية إلى :-

- (أ) غير الناضج؛ وهو العاجز عن إقامة علاقات هادفة مع أشخاص آخرين، ولا يستطيع الاعتماد على نفسه والاستقلال عن أبويه.
- (ب) المتفانى فى ذاته؛ وهو الذي لا يستطيع أن يؤجل إشباع رغباته ويريد إشباعها فى التو والحال.
- (ج) الضعيف جنسياً؛ وهو الذي يعانى شذوذ أو ضعف جنسى وبخاصة الجنسية المثلية.

(د) المضطهد لذاته؛ وهو الذي يعانى القلق عند التعبير عن غضبه ولذلك يلجأ إلى الخمر أو المخدرات لتخفيف القلق حتى يعبر عن غضبه بطريقة عنيفة فى بعض الأحيان.

{1} Walker and Kenon, 1980, Aspects of Alcohol and Drug Dependence, London: Pittman Medical. PP 270 - 272.

(د) الشخصية الاكتئابية: وهي شخصية قلقة ومتوترة يلجأ للمخدر لتسكين قلقه ويؤدي تكرار تعاطيه للإدمان.)

وفي الدراسات التي طبقت فيها الاختبارات النفسية أوضحت أن الشخصية الإدمانية تنسم بالاكئابية والفصامية والسيكوباتية^(١).

ونجد أن السلوكيين يحاولون تفسير سلوك الإدمان من خلال نظرية التعلم، ويروا أن إدمان الخمر أو العقاقير هو سلوك متعلم، فالشخص الذي يعاني القلق يتعاطى خمراً أو مخدراً فيشعر بالهدوء والراحة، ويعتبر هذا الاحساس بمثابة تعزيز إيجابي لتناول المخدر في مرات لاحقة، وبتكرار التعاطي يتعلم الشخص تناول العقار لتخفيف آثار المنع التي تحدث من انقطاعه عن المخدر. ويستمر الانسان في تعاطيه للمخدر رغم ما يعلمه وما لها من آثار مزعجة ولكنه لا يشعر بهذه الآثار السلبية لأنها لا تحدث في التو عند تعاطي المخدر، وتظهر بعد فترات تتراوح في الطول، والمعروف في التعلم أنه كلما كان الفاصل الزمني بين سلوك ونتيجته طويلاً، ضعف تعزيز هذا السلوك سواء كان تعزيز سلبى أو إيجابى. ويرتبط الشعور السار أو التعزيز الإيجابى الذي يحصل عليه المدمن من تعاطيه المخدر بأشياء وأشخاص موجودين في البيئة وتصبح بمثابة مشيرات شرطية تحث الانسان على التعاطي، ف رؤية مكان التعاطي أو الشلة أو المخدر أو رائحة المخدر... الخ من المتغيرات التي تدفع المدمن الممتنع إلى الشعور بالرغبة الملحة والعودة إلى تعاطي المخدر^(٢).

ويتفق ليند سميث 1968 Linde Smith في أن الإدمان سلوك مثل أنواع السلوك الأخرى، فهو متعلم من خلال الاشراف، وهو مشابه في كثير لنفس الطريق الذي يسيل لعاب كلاب بافلوف من صوت الجرس، وقرر أن

(1) Winick C., 1974. A Sociological Aspect of Drug Dependence. Ohio: CRC Press PP 22 - 27

(2) Wikler A., 1970. A Dynamic of Drug Dependence Implications of A Conditioning Theory for Research and Treatment. New York: Arch Gen Psychiat. P 611

المثير هنا مرتبط بالانسحاب، مثل الناس، أو الأماكن خلال خبرات الانسحاب (المنع). ويؤكد أن هناك بعض الدلائل على أن الاشراف أو التعلم جزء أساسي يمكن أن يتدخل في الاعتماد الجسمي وأثار المنع المتزامنة (أي التي تحدث في وقت واحد). وقد ميز «سميث» ١٩٦٨ بين إدمان المخدرات واعتيادها، فالإدمان سلوك متعلم أساساً من خلال التعزيز السلبي الناتج من أعراض المنع، وأيضاً التعزيز الإيجابي الناتج من الأثر المريح للمخدر الذي يرتبط بإحكام مع الاعتقاد على استخدام المخدر، فالسلوك يمكن أن يتعلم من اقتران الاستجابة مع تعزيز موجب مكافأة، أو آثار مبهضة (تعزيز سالب). فإدمان المخدرات مرتبط بخبرات الأفراد عن غياب المخدر وآلام المنع والتعرف عليها، فلو تحقق المدمن من أن قلقه وضيقه وتوتره ناتج من غياب المخدر، واستطاع الحصول على جرعة من المخدر وتغلب على هذه المشاعر لازداد حباً للمخدر، وعاد للإدمان مرة أخرى بعد فترة منع ويحدث الانتكاس^(١).

ويحدث الإدمان وفقاً للسلوكين نتيجة لارتباط تعاطي المخدر بتعزيزات إيجابية متمثلة فيما يحدث من آثار مبهجة، وانهاؤه لحالات متفاوتة من الضيق والبأس والقلق، يكون القضاء عليها بمثابة (مكافأة)، وكذلك وجود مثيرات شرطية تدفع لتعاطي المخدر، تثير في التعاطي الرغبة في المخدر مثل البيئة وما ينتمي إليها من أشياء خاصة بالمخدرات، كذلك حدوث آلام منع عند مقاطعة المخدر وزوال هذه الآلام بتعاطي الجرعة من المخدر.

وبذلك يكون الإدمان سلوك يتعلمه الإنسان من البيئة المحيطة به مع أن هذه النظرية بالشكل الحالي لا توضح لماذا التعاطي من البداية، ولماذا تعاطت هذه المجموعة دون غيرها من الأفراد، وما هي الدوافع لتعاطي المخدر، وهل مجرد وجود المخدر يكون دافع لتعاطيه وإدمانه، أم أن هناك

(1) Marlatt G.A., Rose F., 1980, Addictive Disorders, In: Alan S. Bellack and Michel Hersen (eds.), New Perspective in Abnormal Psychology. New York, University Press. PP 318 - 319

عوامل أخرى موجودة وكامنة فى شخصية المدمن وأيضاً يمتنحه تميزه عن غيره من الاشخاص وتجعله مستعداً ومتقبلاً للإدمان فيقع فيه عندما ينتهياً له ذلك، أو قد تجعله يبحث هو عن المخدر ليسد به ما يشعره من عجز، وكيف حدثت الحيرة الأولى للتعاطى، فإذا كان الإدمان ناتج عن تعزيزات ايجابية من اللذة الناتجة من التعاطى، والتعزيزات السلبية من آلام المنع، فما هو الدافع إلى أخذ المخدر فى المرة الأولى، لكى يشعر الفرد بكل هذه التعزيزات التى تكون بمثابة المحرك بعد ذلك للإدمان؟

نظرية التحليل النفسى لإدمان المخدرات :

Psychoanalysis Theory For Drug Dependence.

تري مدرسة التحليل النفسى أن سيكولوجية الإدمان تقوم على اساسين: الأول: صراعات نفسية وترجع إلى:

١- الحاجة إلى الاشباع الجتنسى الترجسى الذي يرجع أساساً إلى اضطراب علاقات الحب والاشباع العضوي وبخاصة فى المرحلة الفمية.

٢ - الحاجة إلى الأمن.

٣ - الحاجة إلى إثبات الذات وتأكيداها.

وتكرار التعاطى يعنى الفشل فى حل تلك الصراعات واشباع هذه الحاجات.

الثانى: الآثار الكيميائية للمخدر، وهو الذي يميز مدمنى المخدرات عن غيرهم، وبذلك فإن الأصل فى الإدمان وطبيعته يرجعان إلى التركيب النفسى للمريض الذي يحدث حالة الاستعداد، ومن ثم يأتى الدور الذي يلعبه آثار المخدر الكيميائية وخواصه.

وتكون الصورة العامة للمدمن والإدمان فى ضوء نظرية التحليل النفسى كالاتى:

١ - ينظر التحليل النفسى للإدمان على المخدرات، فى المستوى القهري

أي ذلك المستوى الذي يتعلق فيه المدمن بالمخدر تعلقاً قهرياً لا يستطيع فيه التخلي عن المخدر.

٢ - يفرق التحليل النفسي بين المدمنين على المخدرات وغيرهم ممن يدمنون على مواد أخرى، وإن كانت هي الأخيرة تشير إلى شئ من الاضطراب الذي لا يرقى إلى المرض أو الشذوذ.

٣ - إن مدمنى المخدرات تنطوي نفوسهم على اضطراب نفسى عميق، تشبه أعراضه أعراض المرض النفسى أو العقلى وأحياناً تكون أكثر حدة.

٤ - ينكر التحليل النفسى أن مدمنى المخدرات يندرجون تحت السيكونباتية فى اضطراب الشخصية، ويدللون على ذلك بأن السيكونباتى يلجأ إلى وسائل وطرائق خارجية فى تعامله مع صراعاته وحلها، فهو يعتمد إلى تغيير البيئة بما يتفق مع دوافعه اللاشعورية، كما أنه يصب عدوانه أيضاً على البيئة الخارجية وليس على نفسه، بينما المدمن فى حله لصراعاته اللاشعورية يستعمل عمليات لا شعورية أيضاً فى حل تلك الصراعات، ويصب عدوانه على ذاته لا على العالم الخارجى.

٥ - إن مظاهر الإدمان تتمثل فى الاشكال الآتية:

(أ) نوبات من المرح والانبساط، وهذا هو الشكل الاساسى للإدمان.

(ب) اضطراب جنسى أو نشاط جنسى مشوش أو غير ناضج.

(ج) مظاهر بارانويا وتحديث فى الحالات المتقدمة من الإدمان.

(د) تدهور عقلى.

(هـ) تدهور خلقى واجتماعى ومهنى.

٦ - يفسر التحليل النفسى ظاهرة إدمان المخدرات فى ضوء الاضطرابات التى تعترى المدمن فى طفولته المبكرة والتى لا تتجاوز السنوات الثلاث أو الأربع الأولى، وتري مدرسة التحليل النفسى أن ظاهرة الإدمان ترجع فى أساسها إلى اضطراب العلاقات الحبية فى الطفولة المبكرة بين المدمن ووالديه اضطراباً يتضمن ثنائية العاطفة أي الحب والكراهية للوالد فى

نفس الوقت، هذه العلاقة المزدوجة تسقط وتنقل على المخدر، ويصبح المخدر رمزاً لموضوع الحب الأصلي الذي كان يمثل الخطر والحب معاً^(١).

وقد أوضح د. زيور أن سلوك مدمن المخدرات أو متعاطيها ينتمى إلى مرحلة مجاورة لتلك المرحلة التى ينتمى إليها المريض بالهوس والاكتئاب أي المرحلة الفمية المتأخرة، وأن حالة النشوة التى يحققها التخدير، تتميز بانطلاق أخيلة هازلة، لما تحفل به من مفارقات مؤدية إلى قهقهة تفرغ قدراً كبيراً من التوتر، مما يؤدي إلى فرشة Euphoria من نوع فريد، ومرح الإدمان هذا بمثابة ميكانيزم دفاعي للتغلب على الاكتئاب والخلوص منه، وبذلك فهو هوس صناعي مقابل للهوس التلقائي فى ذهان الهوس والاكتئاب.

ويقول د. زيور أن الحالة العادية للمدمن تتميز بأنها ذات طابع اكتئابى وتتسم حالة الاكتئاب هذه - من زاوية العلاقة بالموضوع - بالادماج العدواني كموضوع لم يتم تميزه عن «أنا» المكتئب، ولما كان الأنا قليل التضج، فإن قاعدة تعامله مع الموضوع يسودها مبدأ الأخذ دون إعطاء بصورة غير واقعية تتسم بالنهم، وتوقع من الموضوع بأن يمنحه كل شىء فى كل وقت وبدون حساب، وهذا يؤدي بالضرورة إلى أن يحس بالاحباط، وبالتالي النقمة على الموضوع بالرغم من حبه إياه، وحاجته إليه.

ويتميز مرح الهوس باستخدام ميكانيزم الانكار على نطاق واسع، وغاية الانكار تفادي الهيبله والشعور بالعجز أو الحطة أو الملامة مما يخدش نرجسية الذات (اعتبار الذات وتقديرها لذاتها) على أن الانكار فى حالة المرح لا يكون إلا جزئياً، حيث نجد إلى جانب الرفض قبولاً، وهما موقفان يؤديان إلى إنقسام طفيف فى الذات وتتوقف النتيجة على أيهما تكون له الغلبة.

وثمة سمة شائعة فى مرح الهوس تتكون من إزدحام الافكار وسرعة

(١) سعد زغلول المغربي، ١٩٦٣، تعاطي الحشيش - دراسة نفسية اجتماعية - القاهرة: دار المعارف. ص ٤٠٧ - ٤٢١.

جربانها وتسمى (طيران الأفكار) وتشبه هذه الحالة حالة التخدير حيث تتعاقب الأخيلة وتزاحم وتفيض بالمفارقات.

وفيما يتعلق بظاهرة السبات لدى المدمنين فهي ترجع إلى حالة الاشباع الفمى فى الطفولة المبكرة، على ذلك فإن النوم العميق الهادىء الغفل يكرر نوم الرضيع الهادىء بعد شبعه ويستعيد اتحاد الأنا بالثدي. وفيما يختص بحالة النشوة أثناء التخدير، فيمكن القول بأنها سيادة الرغبات الثلاث للعشقية الفمية:

الرغبة فى الاستسلام للالتهاام، والرغبة فى النوم، كما أننا نجد أن الأنا الأعلى يحل محل الثدي، ولما كان الأنا الأعلى يتسم لا شعورياً بالخلود فإدماجه يحقق للذات الخلود أيضاً والاندماج فيه استسلام لكانن مطلق القدرة واسترخاء بين جوانحه وفناء فيه نوم سعيد لا نهائى. وهذا يسفر عن وحدة لا تفريق فيها بين الذات والموضوع وأن تقدير الذات يرتفع ارتفاعاً قد يصل إلى الجلال والسمو الفائق، وهذا يتضمن طبعاً كل انعدام باللحظة والعجز أو التوتر الناشئ من تأنيب الضمير كما يتضمن الاحساس بالخلود أو بالقدرة المطلقة على كل شىء، والمتغلبة على كل متاعب الحياة، ثم الشعور بأن الذات قد أصبحت مركز العالم، ويسود شعور المحبة الجارفة وتلاشى العداوة، ونتيجة لذلك نجد أن سمات الاكتئابية والانسحابية والانطوائية التى تتسم بها شخصية المتعاطى بدرجات متفاوتة تتحول إلى شىء آخر مختلف تماماً فتغدو الاكتئابية مرحاً دافقاً والانسحابية اقبالاً والانطوائية انبساطاً وهذه السمات الوجدانية لا تتحقق دائماً بأكملها بشكل دائم يهدد الصورة النموذجية لدى كل متعاط، فهناك فروق فردية ترجع إلى تكوينات نفسية أو مزاجية متباينة، وهذا يؤدي بدوره إلى اختلافات عديدة فى حالة التخدير^(١).

(١) مصطفى زبور، ١٩٦٢، تعاطي الحشيش مشكلة نفسية - من أعمال الحلقة الثانية لمناقشة الجريمة - القاهرة. المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنايئة. ص ص ٢٦ - ٣٨.

وبذلك نري أن مدرسة التحليل النفسى ترى أن المدمن أو المتعاطى يقبل كلاهما على المخدر طلباً للتوازن بينه وبين واقعه، توازن يكاد يختل ويتعثر فى الحفاظ عليه والابقاء عليه عند حد أدنى من الاستقرار، ويجد فى المخدر سنداً وعوناً له فى الحفاظ على هذا التوازن، فوظيفة المخدر إنه سند يمنح المدمن القدرة والقوة على مواجهة واقعه وذلك لما يحدثه فيه من تغير فى نشاط وظائفه النفسية وعملياته العقلية، تنعكس فى ادراكه للعالم وانفعاله به واستجابته له فالعقار من وجهة نظر التحليل النفسى هو وسيلة علاج ذاتى يلجأ إليها الشخص لاشباع حاجات طفليه لا شعورية، فنمو المدمن النفسى الجنسى مضطرب لتثبيت الطاقة الغريزية فى منطقة الفم وعندما يكبر تظهر على شخصيته صفات التثبيت ومنها: السلبية والاتكالية، وعدم القدرة على تحمل التوتر النفسى والألم والاحباط وكذلك فالمدمن شأنه شأن المتفعل يغير من نفسه بدلاً من أن يغير من واقعه ومن عالمه، وهذا التغير الذى يحدثه له المخدر يتيح له إعادة بناء عالمه، إعادة سحرية وهمية ولكنها الاعادة التى تمكنه من التكيف مع واقعه.

والمخدر يخدر شعور المدمن بالعجز وقلة الخيلة إزاء عالمه ويسلمه لشعور زائف مقابل ومناقض بالقدرة والكفاية، وهذا الشعور بالعجز فى مواجهة الواقع يرجع إلى:

١ - البناء النفسى الداخلى للمدمن من حيث هو بناء هش يفتقر إلى القوة والتماسك الداخلى والتكامل.

٢ - الواقع الخارجى من حيث ضاروته وقسوته وما يمثله من إحباط ومصاعب تعترض ظروف تحقيق إشباع المطالب الانسانية الأساسية.

الوجهة الاجتماعية للإدمان على المخدرات :

Sociological Aspect to Drug Addiction.

اهتم علماء النفس وعلماء الاجتماع بالأمراض الاجتماعية، والسلوك

المنحرف، ورأوا أن السلوك الاجتماعي في حد ذاته لا يمكن أن يقال إنه سلوك منحرف أو غير منحرف، سوى أو مرضي، ولكن الذي يصفه بهذه الصفة أو تلك هو تقييم المجتمع له في ضوء مدي إلتزامه أو خروجه عن المعايير الاجتماعية للسلوك. وقد يقع الانسان في الانحراف منحرفاً في تياره أو مختاراً له، أو رغم إرادته، أو نتيجة جهله وظروفه السيئة. ويعتبر المنحرف مريضاً اجتماعياً، والمرض الاجتماعي سلوك سالب غير بناء وهدام، ويعتبر مشكلة اجتماعية تهدد أمن الفرد والجماعة، ذلك لأن المنحرفين والجانحين وذوي السلوك المضاد للمجتمع يمثلون خطراً على حياة الآخرين، ويكثرون عنصر قلق واضطراب، قد يعرضون فيه حياة الآخرين للخطر، وهم في نفس الوقت خطراً على أنفسهم لأنهم نتيجة لانحرافهم يقاومهم المجتمع، مما يجعلهم عرضة لاضطرابات نفسية أقلها القلق، وهم يمثلون مشكلة اجتماعية اقتصادية خطيرة، فهم فاقد بشري بالنسبة لعملية البناء الاجتماعي الاقتصادي، وهم أيضاً معاول هدم في المجتمع^(١).

ويعتبر الإدمان على المخدرات من المشكلات الاجتماعية الخطيرة التي تؤثر على تقدم المجتمعات ورفقها، كما تؤثر على الحالة الصحية والنفسية للأشخاص المدمنين.

فقد حاول بعض الباحثين تفسير ظاهرة الإدمان تفسيراً اجتماعياً يقوم على عملية التعلم الاجتماعي، وكان من هذه المحاولات الدارسة التي قام بها بيكر (١٩٥٣) Picker على ٥٠ حالة من مدمنى الحشيش من مستويات مختلفة وذلك بالاعتماد على المقابلة ودراسة تاريخ الحالة. وركز بحثه على افتراض أن أي سلوك إنساني ما هو إلا نتيجة لتتابع الخبرات الاجتماعية والتي من خلالها يكتسب الفرد مفهوماً عن معنى السلوك، كما يكتسب مدركات وأحكام معينة عن المواقف التي تجعل

(١) ج. ب. جيلفورد، ١٩٥٦، ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية - إشراف يوسف مراد - القاهرة: دار المعارف. ص ٣٣٧.

النشاط ممكناً ومرغوباً فيه. واستناداً على هذا الافتراض لم يسعى «بيكر» لمعرفة الأسباب المؤدية للسلوك، فهو يرى أنها مجرد عملية تعلم ينشأ من خلالها الدافع إلى السلوك، ويكون تحقيق اللذة هو ذلك الدافع الذي يؤخذ من أجله المخدر. ويعتبر «بيكر» الأسباب المؤدية للسلوك نوعاً من السببية النسبية لتعاطي المخدر.

ويفسر «بيكر» سلوك التعاطي مبتدئاً بالشخص الذي يشعر برغبة في تعاطي المخدر أو تجربته بقوله «إن هذا الشخص يعرف أن غيره يتعاطون المخدر للوصول إلى حالة اللذة أو النشوة، ولا يعرف هذا الشخص ماهية هذه الحالة، ويدافع حب الاستطلاع للتعرف على هذه الخبرة التي لا يعرف نتيجتها، وبالأغصام في خطوات التجربة وتكوين الاتجاهات اللازمة التي تنشأ خلالها، يصبح رغباً في استعمال المخدر من أجل الحصول على اللذة».

وقد حدد «بيكر» خطوات التعلم الاجتماعي لتعاطي المخدر كالآتي:
أولاً - تعلم الطريقة الصحيحة للتعاطي التي تؤدي إلى آثار تخديرية فعلية :

ويوضح «بيكر» ذلك بأنه في التجربة الأولى لا يحصل المبتدئ عادة على اللذة المطلوبة، ويرجع ذلك إلى عدم صحة الطريقة التي تناول بها المخدر وعدم كفاية الكمية، مما يؤدي إلى استحالة الوصول لحالة التخدير المرغوبة. ويتعذر على المتعاطي المبتدئ أن يكون لديه مفهوم معين عن المخدر كموضوع يستعمل للوصول إلى اللذة، فيتوقف عن استعمال المخدر. فتكون الخطوة الأولى لكي يصبح متعاطياً هي تعلم الطرق الصحيحة للتعاطي حتى تحدث الآثار التخديرية، ومن ثم يتغير مفهومه عن المخدر، هذا التغير قد يحدث عن طريق التعلم المباشر أو غير المباشر وذلك بملاحظة وتقليد سلوك الآخرين.

ثانياً - التعرف على الآثار التخديرية وربطها باستعمال المخدر :

وتتضمن هذه الخطوة عاملين: الأول ظهور آثار التخدير، والثاني ربط هذه الآثار في ذهن المتعاطي بالمخدر. ولكن يستمر المتعاطي فإنه ليس من الضروري فقط أن يتعاطى الشخص المخدر للحصول على آثار معينة، وإنما يجب أن يتعلم إدراك تلك الآثار عندما تحدث، لأنه في هذه الحالة، يكتسب المخدر معنى ما عند المتعاطي كموضوع يمكن استخدامه من أجل الحصول على اللذة، وتكرار التجربة يزداد تقدير المتعاطي لآثار المخدر فيواصل تعلم الوصول إلى قمة النشوة. ونتيجة لذلك تنمو عنده مجموعة من الخبرات والتجارب الراسخة عن آثار المخدر تساعد في الوصول إلى قمة التخدير بشكل سهل مريح.

ثالثاً - تعلم الاستمتاع بآثار المخدر :

ويري «بيكر» أن هذه الخطوة ضرورية لاستمرار التعاطي إذ أن آثار التخدير لا تؤدي بالضرورة إلى الشعور بأنها لذیذة، وذلك لأن تذوق مثل هذه التجربة ما هو إلا عملية تعلم اجتماعية لا تختلف عن تجربة تذوق أي نوع من أنواع الأطعمة فقد يحدث للمتعاطي في أول الأمر أن يدرك آثار التخدير الجسمية إدراكاً مؤلماً مخيفاً أو غامضاً. هذه التجربة الأولى قد تكون دافع على توقف استمرار التعاطي ما لم يتعلم المبتدئ في تجارب أخرى إدراك هذه الآثار على أنها شيء لذیذ. ويرى «بيكر» أنه يحدث هذا من خلال التفاعل الاجتماعي مع المتعاطين الآخرين ذوي الخبرة الادمانية الطويلة، حيث يؤثر عليهم ويعلمونه أن يجد اللذة في التعاطي برغم التجربة الأولى المؤلمة، ويؤكدون له أن هذه الآثار المؤلمة الأولى ما هي إلا مسألة عادية يمر بها كل فرد، ويوجهون انتباهه إلى الجوانب اللذيذة المريحة من آثار المخدر. هذا التحول في معنى الخبرة قد اكتسبه الفرد من الآخرين، وبغير ذلك يتوقف تعاطي المخدر لأنه لا يحقق الحصول على اللذة. ويتوقف إعادة المعنى اللذيذ للمخدر على درجة مشاركة المتعاطي

مع غيره من المتعاطين، فإذا كانت هذه المشاركة قوية تغير الاتجاه المضاد نحو المخدر وتعيد إليه اتجاهه السابق.

علي هذا، لا يستطيع الفرد أن يواصل تعاطي المخدر من أجل اللذة ما لم يتعلم تحديد آثار المخدر كأشياء ممتعة، وما لم تصبح وتستمر هذه الآثار موضوعاً يدركه الشخص المتعاطي كشئاً مجلب للذة والمتعة.

ويؤكد «بيكر» أنه من خلال عمليات التعلم السابق ذكرها ينمو عند الفرد الاستعداد أو الدافع لاستعمال المخدر. هذا الاستعداد أو الدافع لم يكن موجوداً عندما بدأ الفرد التعاطي، وذلك لأن هذا الدافع يعتمد على مفاهيم ومعاني خاصة بالمخدر لا تنمو إلا من خلال التجارب والخبرات الفعلية للتعاطي.

ويشير «بيكر» إلى ما يتعلق إلى الحكم العام الاخلاقي على التعاطي ورأي المجتمع فيه بأنه لا يؤثر على سلوك المتعاطي إلا بقدر طفيف. ففي حالة عدم قبول المجتمع فإن ذلك قد يحد من استمرار التعاطي، ولكن التعاطي يظل قائماً نتيجة لمفهوم الفرد عن التعاطي، ولا يصبح السلوك مستحيلاً إلا إذا فقد الفرد القدرة على الاستمتاع بالحالة التخديرية ومن خلال الخبرات التي يتعرض لها⁽¹⁾.

ونرى أن «بيكر» في تفسير هذا، قد أغفل الكثير من العمليات الأساسية التي تفسر أي سلوك اجتماعي للإنسان ومن هذه العمليات:

■ دوافع السلوك.

■ الضغوط الدافعة للسلوك.

■ تاريخ حياة الفرد وخبراته السابقة التي تؤثر في اكتسابه لأي سلوك جديد.

(1) Becker, H.S., 1959, Becoming a Marijuana Users- A Psychological Approach - Morton: Mental Health and Mental Disorders. PP. 235 - 242.

■ إغفال بعض جوانب المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد ويتأثر به، ذلك أن الفرد نتاج للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يولد فيها، فليس هناك كائن بمعزل عن المجتمع الذي يوجد فيه، أو يستطيع أن يهرب من تأثيرات هذا المجتمع على تكوينه ونمو شخصيته وأفكاره وقدراته العقلية واتجاهاته وخصائصه الانفعالية وسلوكه، فالشخصية الانسانية تتشكل وفقاً لقوانين التطور الاجتماعي، لذلك فإنه يلزمنا لفهم شخصيات الافراد وما يأتونه من سلوك، تحليل انتمائهم الاجتماعي، وتحديد الظروف الاجتماعية الواقعية التي شكلت شخصياتهم وسلوكهم.

أويري روبرت مرتون Robert Merton أن تعاطي المخدرات هو استجابة انسحابية من جانب المتعاطي الذي يجد أن سبيل النجاح مغلقة أمامه كما أنه لا يستطيع إرتكاب أفعال إجرامية يحقق بها أهدافه لعجزه عن ذلك، ويفسر إرتفاع معدلات الإدمان على المخدرات على أنه انعكاس للموقف الذي يمجّد فيه المجتمع هدف النجاح الفردي، مثل تجميع الثروة والممتلكات، ولكنه في نفس الوقت لا يسمح لبعض الناس بتحقيق هذا الهدف، فيخالف هذا البعض معايير المجتمع وينحرف عما يرضيه. وقد تكون أوجه هذا الانحراف هو إدمان المخدرات^(١).

_____ ويفسر «دونالد تافت» Donald Tafft الانحراف الاجتماعي بما فيه إدمان المخدرات بقوله «إذا كانت ثقافة ما تتسم بالتعقيد المادي والدينامية، وتمجيد الشخص الذي ينجح في الصراع والتنافس، ولكنها تسد الطريق أمام الكثيرين لتحقيق هذا النجاح، فإن فشل هؤلاء يؤدي إلى ظهور أنماط سلوكية عدائية ضارة بمصالح المجتمع ككل، ولكنها تتلائم مع المثل العليا الأساسية في هذا المجتمع»^(٢).

(1) Merton R.K., 1968, Social Theory and Social Structure, New York: The Macmillan Company. PP 325 - 327.

(2) Donald Tafft D., 1957, Criminology, New York: The Macmillan Company. P 24.

فالإدمان على المخدرات شأنه شأن الأمراض الاجتماعية الأخرى التى يدفع إليها العديد من العوامل المتشابهة، فإلى جانب الاضطرابات الفسيولوجية التى قد تحدث فى مراحل النمو المختلفة، والعوامل العضوية مثل الأمراض والتسمم والاصابات والعاهات والعيوب والتشوهات الخلقية. وإلى جانب الأسباب النفسية مثل الصراع والاحباط والحرمان والعدوان وحيل الدفاع النفسى القاسية، والخبرات السيئة والصادمة، والعادات غير الصحية، وعدم النضج النفسى، فإلى جانب هذا كله تأتى الأسباب الاجتماعية التى تساعد على ظهور السلوك الشاذ، والاضطراب الكامن فى الشخصية. ومن هذه الاسباب:

البيئة الاجتماعية :

تؤثر عوامل البيئة والوسط الاجتماعى الذى يتحرك فيه الفرد فى تشكيل وغو شخصيته وتحديد حيل دفاعه النفسى عن طريق نوع التربية والضغوط والمطالب التى تسود فى البيئة الاجتماعية التى يعيش فيها وإذا فشل الفرد فى مقابلة هذه الضغوط وتلك المطالب، وخاصة إذا زاد ما بينها من تناقضات ساء توافقه الاجتماعى والنفسى، وأدى ذلك به إلى الانحراف. وتتحدد نسب الانحراف حسب البيئة الفقيرة أو الغنية والحضرية أو الريفية.

العوامل الحضارية والثقافية :

تمثل العوامل الحضارية والاتجاهات الثقافية عوامل هامة فى انتاج الانحراف، وبدل بعض الشواهد على أن بعض الأمراض النفسية تميل إلى الانتشار فى المجتمعات المتحضرة أكثر من المجتمعات البدائية.

اضطراب التنشئة الاجتماعية :

إن عملية التنشئة الاجتماعية هي العملية التى تحول الانسان من كائن (بيولوجى) إلى كائن اجتماعى وتكسبه صفة الانسانية. وأي عائق

يعوق عملية التنشئة هذه يصبح مصدراً للضغط والاضطراب النفسى،
فالتنشئة الاجتماعية غير السوية تخلق احباطات وتوترات لدى الفرد^(١).

ومن الضروري عند التفسير الاجتماعى لظاهرة إدمان المخدرات أن
نهتم بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمدمنين، وفيما يلى وصف
لسمات المتعاطين الاجتماعية كما أوضحتها البحوث والكتابات،

سمات المتعاطين الاجتماعية

١ - سن المدمنين :

تدل معظم الدراسات على أن إدمان المخدرات ينتشر بين الشباب أو من
تقل أعمارهم عن أربعين سنة، فيزداد التعاطى للماريجوانا فى الولايات
المتحدة بين صغار السن، وانتشار الامفيتامينات بين طلاب المدارس
الثانوية، وتقدر نسبة من يتعاطى المخدرات فيمن يقل سنهم عن ٢٥ سنة
إلى ٥٠٪ من نسبة هذه المجموعة.

وقد أوضحت نتائج الدراسات التى قام بها المركز القومى للبحوث
الاجتماعية والجنايية وسعد زغلول المغربى إلى أن انتشار تعاطى
المخدرات (الحشيش) يوجد فى فئة العمر التى تمتد من ٢٠ إلى ٤٠ عاماً
فما فوق.

وقد أوضحت الدراسة الحالية أن متوسط سن مدمنى المخدرات (٤١)
سنة على أن الإدمان عادة ما يبدأ فى سن مبكرة عن ذلك بكثير.

٢ - جنس المدمنين :

تنتشر العقاقير والمخدرات بين الذكور أكثر من الإناث، باستثناء مجموعة
الباربيتورات والامفيتامينات Barbiturates and Amphetamines التى
تنتشر أكثر بين الإناث متوسطات الأعمار لما لها من خاصية نقص الوزن،

(١) حامد عبد السلام زهران، ١٩٧٧، علم النفس الاجتماعى، القاهرة: عالم الكتب، ص
٣٣٩ - ٣٤٠

وقد أتضح من دراسة إيزيدور تشاين Isidor Chien التي نشرت بعنوان «الطريق إلى المخدرات: تعاطى المخدرات والجناح والسياسة العامة» والتي قام فيها بدراسة توزيع متعاطى الحشيش في مدينة نيويورك فوجد أن ٨٥٪ منهم من الذكور، وفي الهند أتضح من بحث كوبرا وكوبرا أن تعاطى المخدرات أكثر انتشاراً بين الذكور عنه بين الإناث، وتتفق الأبحاث المصرية لسعد المغربي، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناحية مع نتائج هذه الدراسات، وأن الإدمان ينتشر في مصر بين الذكور^(١).

فبالسلوك الانحرافى بما فيه إدمان المخدرات بين الجماعات المختلفة ناتج عن تأثير اختلاف تأثير الثقافة على كل من هذه الجماعات، فارتفاع الإدمان لدى الذكور عنه لدى الإناث، يرجع إلى الحماية النسبية التى لدى الإناث من التعرض للآزمات الانفعالية والاقتصادية والتنافس، ولاختلاف أدوارهن فى المجتمع عن الذكور، وحين تتساوى النساء فى التعرض لهذه الآزمات مع الرجال، تميل الانحرافات إلى الانتشار بينهن بالمثل.

الحالة المهنية والتعليمية للمدمنين :

تؤكد معظم الدراسات أن المدمنين عن لديهم مشكلات دراسية وقفت فى طريق تقدمهم الأكاديمى، وكذلك أثبتت نتائج أبحاث المركز القومى وسعد المغربي أن تعاطى الحشيش منتشر بين الأميين ونسبة قليلة ممن يعرفون القراءة والكتابة وذوي التعليم المنخفض أكثر من غيرها من الفئات كذلك أوضح فاروق عبد السلام (١٩٨٢) أن تعاطى الأفيون ينتشر بين الأميين^(٢).

كما ينتشر الإدمان وفقاً للدراسات السابقة فى معظم الفئات

(١) سمير نعم أحمد، ١٩٧١، خطر تعاطى المخدرات القائم في المنطقة العربية. القاهرة: المكتب الدولي العربى لشئون المخدرات. ص ٤٥ - ٤٩.
(٢) فاروق عبد السلام، ١٩٨١، بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية المتعلقة بالإدمان رسالة دكتوراه (غير منشورة) - كلية التربية - جامعة الأزهر. ص ٢٢٥.

الاجتماعية ولكن أكثر الفئات تعاطياً وانتشاراً في مصر هي فئة العمال والمهنيين والفلاحين.

ويوضح بيسكور Pescor في مقالة بعنوان التحليل الإحصائي لسجلات مدمنى المخدرات بالمستشفيات، من أن الإدمان منتشر بين الأطباء، والمرضى، الصيادلة، وارتفاع الإدمان في فئة المشتغلين بالأعمال المنزلية، والخدمات. ومعظم مدمنى الهيروين من الشباب العاطلين عن العمل، ونسبة من يعمل منهم ٢٦٪ وجميعهم من الطبقات الاجتماعية الدنيا^(١)

الحالة الأسرية:

تعتبر الأسر التي تفشل في توفير الحاجات الأساسية لأبنائها مثل: المحافظة على صحتهم، وظائفهم الحيرية، إكسابهم العادات الاجتماعية السليمة، وكيفية تكوين العلاقات مع الآخرين، وفرض الضوابط على دوافعهم الجنسية وإشباع حاجاتهم الانفعالية أسر معتلة، مما يؤدي إلى إنحراف أفرادها بصورة أو أخرى، وتكون إحدى صور الإنحراف هي تعاطي أو إدمان المخدرات. فقد تبين من الدراسات أن أسر المدمنون مضطربة في نواحي متعددة، فقد ثبت أن أبناء الأسر المفتتة أو المنهارة تدمن على المخدرات أكثر من غيرها عند الكبر. وكذلك الأسر التي تعتبر الأم فيها الشخصية الرئيسية، تؤثر على غو السمات التي تؤدي إلى الاستعداد للإدمان. فالملاحظ في معظم أسر المدمنين أن الأب غائب معظم الوقت ولا يمارس دور في الحياة الأسرية، والأم مملكة ومسيطر ومن صفات هذا النوع من الأمهات: الاضطراب الانفعالي، الشعور بالذنب العدوانية، السيطرة

(١) Pescor 1953 A Statistical Analysis of the Clinical Records of Hospitalized Durg Addicts Washington: Government Printing Office P 6

وقد أثبتت سمارت Smart 71 أن استعمال أحد الوالدين للمخدر يومياً يؤثر تأثيراً كبيراً على إستعداد الطفل لاستعمال المخدرات، وأتضح من دراسته أن ٦٠٪ من الأطفال يستعملون نفس المخدر الذي استعمله الأب أو الأم. ١

وقد أوضح ويلكر Walker أن هناك عاملين مرتبطين إرتباطاً جوهرياً بإدمان المخدرات عند الأطفال عند وصولهم إلى سن المراهقة وهما:

١ - صراعات خاصة بالرغبة في الاتكالية ويشمل :

■ تذبذب الأم بين العطف والحنان من جهة والنبذ من جهة أخرى.

■ تهرب الأم من الأزمات الأسرية ولجؤها إلى الخمر أو الانغماس في الجنس.

■ إنحراف سلوك الأم.

■ إهانة الأب للأم.

■ تنافر الوالدين.

■ سخط الأم وعدم تقبلها للأمومة.

٢ - عدم قدرة الطفل على إدراك دوره في المجتمع ويشمل عدة عوامل خاصة بهذا العجز وهي:

■ نبذ الوالدين للطفل.

■ تهرب الأب من المسؤولية.

■ إنعدام طموحات الأبوين فيما يتعلق بمستقبل الطفل.

■ إنعدام مراقبة الطفل والإشراف عليه.

■ ضعف الضوابط التي تفرضها الأم على سلوك الطفل^(١).

(1) Wikler A., 1970, 'A Dynamic of Drug Dependence Implications of A Conditioning Theory for Research and Treatment, New York: Arch Gen Psychiat. PP 612 - 615.

دوافع التعاطى :

يقصد بدوافع التعاطى تلك الدوافع الداخلية التى تعتمل فى نفس الفرد فتجعله يتعاطى المخدر ، سواء أكان هذا التعاطى بانتظام ، أم كان حسب المناسبات والظروف ، وقد حدد حسن الساعاتى هذه الدوافع فى مقاله عن « تعاطى الحشيش كمشكلة اجتماعية » بما يلى :

١ - تناسى الهموم واستجلاب السرور :

ويرى د. حسن الساعاتى أن دافع التعاطى بقصد تناسى الهموم واستجلاب السرور يعد من أهم الدوافع فى هذا المجال ، فيكون التعاطى فى هذه الحالة طريقة سهلة من طرق الهروب من الواقع المخيف المقلق المحزن.

٢ - تحصيل لذة جنسية كبرى :

ويأتى هذا الدافع فى المرتبة الثانية من الدوافع التى تؤدي إلى التعاطى ، وذلك بقصد الحصول على قدر من اللذة فى ممارسة العملية الجنسية. ويكثر التعاطى للمخدرات فى الأيام الأولى من الزواج ، حيث يصفه بعض المتعاطين لأصدقائهم كعلاج لسرعة القذف ، وربما يفسر ذلك كثرة تناوله فى أيام الزواج الأولى التى قد يتعرض فيها بعض الأزواج لهذه المشكلة التى كثيراً ما تحل من نفسها بعد زوال الشعور بحدثة الزواج ، وبالمران واكتساب الخبرة التى تزيد الثقة بالنفس.

٣ - استشعار روح الجماعة المرحية :

وبعد هذا الدافع عاملاً ثالثاً قوياً من العوامل التى تدفع على التعاطى. وهناك من يرون أن هذا العامل أقوى بكثير من العامل الجنسي ذاته .. ويتضح ذلك من مناقشة الكثير من يتعاطون المخدر ، حتى أنهم ليس من أن التعاطى يجمع أفراد الجماعة ، وينشأ عن تعاملهم مع بعض أثناء التعاطى جو ملىء بالفرح والبهجة والنشوة التى تجعلهم يضحكون

لأتفه الأمور ، ويتبادلون النكتة والتحية المتكررة. إلى جانب أيضاً أن جلسة التعاطى تجمع أفراداً من مهن وطبقات ومراكز ومستويات تعليمية مختلفة، فتشيع بينهم المساواة والاخاء إلى درجة بالغة، هذا فضلاً عما تتيحه للأفراد من التحرر من الضوابط الاجتماعية التى تفرض عليهم ألواناً معينة من السلوك.

٤ - دوافع أخرى خاصة :

ويقصد بذلك، الدوافع التى تجعل بعض الافراد من فئات معينة يتعاطون المخدر، مثل الفنانون بقصد إجادة الفن^(١) لأنه فى إعتقادهم يساعد على التفنن والابداع والإجادة وهناك من يتعاطى ليتعاطى على النوم ويعالج به حالة الأرق، وهناك من يتعاطون للتحرر من ملل أعمالهم الرتيبة، وهناك من يتعاطى بقصد تسكين ألم جسمى معين^(٢).

وبذلك نجد أن هناك مجموعة من الدوافع التى تعتمل فى نفس الفرد، وتهيبه لتكوين شخصية متعاطى أو مدمن المخدرات ونستطيع أن نوجز هذه العوامل الدافعة على هذا السلوك:

■ البيئة الاجتماعية التى يتحرك فيها الفرد والتى تؤثر فى تشكيل ونمو شخصيته، وما تنطوي عليه هذه البيئة من أساليب تربوية فاشلة فى تكوين شخصية ناضجة، مثل القسوة أو الأهمال والحرمان.

■ التفاوت الطبقي مع أوضاع تنطوي على الحرمان والتنافس غير المتكافئ.

■ إنعدام مبادئ السلوك السليم.

(١) حسن الساعاني، ١٩٦٣، تعاطى الحشيش كمشكلة اجتماعية - من أعمال الحلقة الثانية لمكافحة الجريمة - القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. ص ٥٨ - ٦١.

■ قيم ثقافية واجتماعية وأخلاقية ودينية غير مستقرة تؤدي إلى الحيرة والشك وعدم الثقة والانسحاب من المجتمع.

■ الحرمان المادي والفقر والجهل، والإقامة في بيئات منحطة Slum area أو متخلفة.

■ ضعف الضوابط الاجتماعية على السلوك المنحرف، مع وجود جماعات تؤيد هذا السلوك وتسهل القيام به، وينطوي هذا على سهولة الحصول على المخدر وتوافره، وتوافر أماكن التعاطي.

■ وجود قيم ومعايير حضرية وثقافية تؤدي إلى حدوث الصراع الطبقي، فبينما تساعد هذه القيم على تحقيق الثراء والتقدم في الطبقات العليا بأساليب مشروعة، إلا أنها تحول دون ذلك في الطبقات الدنيا، مما يؤدي إلى بذل الجهد من جانب الطبقات الدنيا لتحقيق النجاح بطرق غير مشروعة وحين يفشلون في ذلك يلجأون إلى الانسحابية من المجتمع باللجوء إلى إدمان المخدرات.

الفصل الثالث

الدراسات السابقة

أولاً - الدراسات العربية

ثانياً - الدراسات الأجنبية وتشمل على،

■ دراسات تناولت سمات المدمنين السيكلولوجية

■ دراسات تناولت سمات المدمنين الاجتماعية

تعرض فى هذا الفصل الدراسات والأبحاث السابقة فى مجال إدمان المخدرات ، سواء كانت هذه الدراسات عربية أو أجنبية. وهذه الدراسات ليست وفيرة خاصة الدراسات العربية ذلك أن الدراسات فى مجال الإدمان على المخدرات مازال البحث فيها قاصراً وخاصة من الناحية النفسية، وهذا كان من الدوافع الهامة فى تناول ظاهرة الإدمان على المخدرات بالبحث والدراسة وذلك فى محاولة لاستيضاح الرؤية، وتناول ظاهرة تعتبر من أخطر الظواهر التى تؤثر على الأفراد والمجتمع على السواء وتعوق تقدم المجتمعات.

وسوف نعرض بعض هذه الدراسات فى محاولة للوقوف على الجهود المبذولة فى دراسة هذه الظاهرة، والاستفادة من تلك الدراسات فى توضيح مشكلة الدراسة الحالية، وطريقة معالجتها، والوسائل والادوات التى استخدمتها. فضلاً عن الأفادة منها فى تفسير نتائج الدراسة الحالية.

أولاً - الدراسات العربية :

وستعرض فيما يلى لهذه الدراسات:

- ١- دراسة سعد زغلول المغربى (١٩٩٠).
- ٢- دراسة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجناائية (١٩٥٧:١٩٨٢).
- ٣- دراسة د. مصطفى زبور (١٩٦٣).
- ٤- دراسة د. حسن الساعاتى (١٩٦٣).
- ٥- دراسة سعد زغلول المغربى (١٩٦٦).
- ٦- دراسة سويف (١٩٧١).
- ٧- دراسة سويف (١٩٧٤).
- ٨- دراسة السكرتارية العامة للهيئة الدولية للشرطة الجنائية (١٩٧٠).

- ٩ - دراسة حنورة (١٩٧٦).
 - ١٠ - دراسة يحيى الرخاوي (١٩٧٠).
 - ١١ - دراسة محمد رشاد سيد كفاي (١٩٧٣).
 - ١٢ - دراسة د. فاروق عيد السلام (١٩٨٠).
 - ١٣ - دراسة محمد رمضان محمد (١٩٨٢).
 - ١٤ - دراسة سعد المغربي (١٩٦٠) :
- وموضوعها « تعاطى الحشيش دراسة نفسية اجتماعية ».

■ هدف الدراسة :

- وكانت أهداف الدراسة كما وضعها الباحث هي:
- هل الحشيش مشكلة عامة أم خاصة، هل هي ظاهرة فردية مرضية وغير طبيعية أم ظاهرة تخص مجموعة قليلة من الأفراد ؟
 - ما هي ضرورة التعرف على آثار تعاطى الحشيش الجسمية ؟
 - ما هي المظاهر الاكلينيكية المترتبة على تعاطى الحشيش ؟
 - ما هي السمات المميزة لتعاطى الحشيش ؟
 - ما هي علاقة الحشيش بالعلاقات الجنسية ؟

■ فروض الدراسة :

- وقد صاغ الباحث فروض الدراسة كالآتي:
- ١ - تعاطى الحشيش ظاهرة عامة منتشرة بين أغلب فئات الشعب وقطاعاته وبخاصة طبقاته العاملة (المهنية).
 - ٢ - تعاطى الحشيش لا يرتبط بالجريمة إرتباط العلة بالمعلول.
 - ٣ - الحشيش يؤدي إلى ضعف الإنتاج وتدهوره.

٤- الحشيش قد يثير الرغبة الجنسية ولكنه يؤدي إلى الضعف الجنسي في النهاية.

٥ - يتسم متعاطى الحشيش بالغفلة والبلادة.

٦ - أسباب ودوافع تعاطى الحشيش أسباب ناتجة عن ظروف الفرد الاجتماعية النابعة من البيئة التي يعيش فيها والمجال الذي يتحرك فيه.

■ عينة الدراسة :

قسم الباحث عينة بحثه إلى ثلاث مجموعات:

(أ) عينة المجتمع العام، وقد اختار أفرادها من القطاعات المهنية المختلفة اختياريًا عرضيًا، وكان الباحث يطبق أدواته على من يتطوع من القطاعات المهنية المختلفة بغض النظر عما إذا كان متعاطياً أو غير متعاط، وأمكنه كذلك التعرف على مجموعة ضابطة بمن لم يتعاطوا المخدر.

(ب) متعاطون خارج السجن.

(ج) متعاطون مسجونون، وقد تم اختيار هذه العينة عشوائياً وهم مجموعة من المتعاطين الذين تم ضبطهم بواسطة البوليس إما محرزين للمخدر أو في حالة تعاطى فعلاً.

■ المجموعة الضابطة :

٦٨ فرداً من القطاعات المهنية المختلفة، لم يسبق لهم التعاطى.

■ أدوات الدراسة :

١ - اختبار المينسوتا المتعدد الأوجه لقياس الشخصية. وقد قام الباحث بتطبيق هذا الاختبار على عينة من المتعاطين وقوامها ٤١ حالة من المتعاطين.

٢ - اختبار الرورشاخ طبق هذا الاختبار على عينة قوامها ٢٥ فرداً.

٣ - دراسة تاريخ الحالة، طبق هذا الأسلوب على عينة قوامها ٤١

فرداً وذلك للوصول إلى وصف للسمات الشخصية والظروف الاجتماعية للمتعاظم.

٤ - طبق اختبار شطب الحروف لكربلن لقياس التعب على ١٠ حالات قبل التعاطى وبعده.

٥ - اختبار المقاطع التى لا معنى لها لقياس التذكر المباشر على ١٠ حالات قبل التعاطى وبعده.

٦ - اختبار التأزر العضلى العصبى قبل التعاطى وبعده.

٧ - اختبار التركيز والانتباه على ١٠ حالات بعد التعاطى وقبله.

٨ - اختبار القابلية للاستهواء على ١٠ حالات بعد التعاطى وقبله.

٩ - ثم قام الباحث بمعاونة أحد أصدقائه من الأطباء لفحص ثلاث حالات من المتعاطين فحصاً طبياً من حيث قياس درجة الحرارة والنبض والضغط وسرعة التنفس وذلك قبل التعاطى وبعده بقصد التعرف على الآثار الجسمية المباشرة لتعاطى الحشيش.

نتائج البحث :

وقد استخلص الباحث من دراسته النتائج التالية:

١ - أن الأصل فى إدمان المخدرات عامة يرجع إلى التركيب النفسى المرضى الذى يحدث حالة من الاستعداد للإدمان.

٢ - أن الحياة والنظام الجنسى عند المدمنين على درجة كبيرة من الاضطراب وخاصة فيما يتعلق بالجنسية الطفلية وعقدة أوديب وضراعات الاستنماء وتنتهى هذه الحالة المضطربة عند المدمنين بهكوين ليبيدو، ويبدو فى شكل طاقة توترية شيقة لا شكل لها أى بدون سمات ثابتة أو أشكال معينة.

٣ - بالنسبة للحاجة إلى الاشباع وهى الأساس الأول فى اضطرابهم

فهى ترجع إلى الاشباع الفمى أو الجلىدى وهى مناطق إشباع جنسية كاملة فى المرحلة الفمية.

٤ - أما عن الحاجة إلى الشعور بالأمن واعتبار الذات فإنهما يرجعان أيضاً إلى اضطراب النمو فى المرحلة الفمية وما تتضمنه من إشباع الحاجة إلى الطعام والدفع والحب.

٥ - ويرى الباحث أن المخدر بالنسبة للمتعاطى هو البديل عن الاشباع الفمى المضطرب فى الطفولة الأولى المبكرة لأنه يعطى الشعور باللذة والمرح والراحة التى كان من المفروض أن يحصل عليها المتعاطى فى تلك المرحلة المبكرة، والمتعاطى بتعاطيه المخدر يقوم بعملية تكوص شديدة لتلك المرحلة الطفلية.

٦ - الجنسية الأولى فى بداية المرحلة الفمية عند متعاطى المخدرات فكانت دائماً غير مستقرة ومضطربة ومختلطة بين جميع أنواع الصراعات ورغبات ما قبل الجنسية.

٧ - وهناك عامل التقدير الشديد للذات والذي يتفق وجوده مع الاشباع الشبقى فى حالة المرح الزائد الناتج عن التخدير^(١).

٨ - دراسة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجناينة من سنة (١٩٥٧ - ١٩٨٢) :

موضوعها: «دراسة تعاطى الحشيش فى مصر (١٩٥٧-١٩٨٢)».

الهدف من الدراسة :

بدأت الهيئة العلمية لهذا البحث بتبيين ضرورة إجرائه ودواعى الحاجة إليه، حيث أتضح لها أن هذه الحاجة تشمل جانبيين، الأول هو جانب الحاجة القومية، والثانى هو جانب الحاجة العلمية.

(١) سعد زغلول المغربى، ١٩٦٣، تعاطى الحشيش - دراسة نفسية إجتماعية - القاهرة: دار المعارف.

فيما يختص بالحاجة القومية، فقد تبين للهيئة أن تعاطى الحشيش ظاهرة تبدو متفشية بين طبقات المجتمع المصري، ويعتبر جريمة لها أثرها الخطير على الأفراد والجماعات وأن الدلائل كثيرة على إنتشاره إنتشاراً واسعاً بين فئات هذا المجتمع وعلى أن المشرع يزداد إهتمامه بهذا الموضوع وتزداد مخاوفه من آثاره وانعكس ذلك فى إتجاه نحو تشديد العقوبة وإطراد هذا التشديد.

فضلاً عن ذلك كان هناك ما يشير (فى ذلك الوقت) إلى أن كمية الحشيش المضبوطة تصل إلى ما يزيد (١٤) مثلاً على كمية الأفيون، مما يستدل معه على أن مشكلة تعاطى الحشيش فى المجتمع المصري تفوق فى أهميتها مشكلة تعاطى المخدرات الأخرى، ومن ثم كانت ضرورة التصدي لدراساتها دراسة علمية دقيقة.

من ناحية أخرى كشف عن الحاجة العلمية لإجراء هذه الدراسة ما أشارت إليه بحوث كثيرة فى ذلك الوقت أيضاً من الحاجة الماسة على النطاق العالمى، إلى إجراء بحث علمى شامل فى موضوع تعاطى الحشيش: العوامل المؤدية إليه والآثار المترتبة عليه، ومن أن المعلومات الفارماكولوجية عن العنصر الفعّال فى الحشيش ضئيلة جداً، وما أشارت إليه بعض البحوث الأخرى من الحاجة الملحة لإجراء بحوث فى الآثار المزمنة (أو طويلة المدى) لتعاطى الحشيش، وما أوضحت من أن طبيعة تأثير الحشيش على الجهاز العصبى لا تزال مجهولة. من ذلك كله تبين للهيئة أن موضوع الحشيش لا يزال بحاجة إلى جهود الباحثين، فضلاً عن دلائل أخرى على هذه الحقيقة من أهمها التضارب بين الآراء والاستنتاجات الواردة فى عدد من المؤلفات حول الحشيش بعضها يهون من تأثيره والبعض الآخر يشير إلى الخطر البالغ المترتب على تعاطيه.

من ناحية أخرى كانت هناك الضألة النسبية لحجم البحوث التى عنيت بهذه المشكلة على النطاق العالمى (حوالى ست بحوث فى السنوات العشر

من ١٩٥٠ - ١٩٥٩) وفي هذه البحوث أيضاً من المآخذ المنهجية ما أدى إلى تضارب الآراء أو ضالة المعلومات الثابتة حول الكثير من جوانب هذا الموضوع ومن هذه المآخذ ضالة أحجام عينات المتعاطين موضوع الفحص، وعدم قيام معظم هذه البحوث، على استخدام عينات ضابطة، ثم إفتقارها جميعاً إلى عنصر التقنين لأدوات البحث وتهاونها في اتخاذ عدد من الاحتياطات المنهجية الأخرى في إجراءات البحث أو عدم النص عليه بوضوح فيما نشر عنه، أما خلاصة ذلك كله فتأكيد الحاجة الماسة أمام الهيئة إلى إجراء بحث علمي شامل في موضوع تعاطي الحشيش، وتحديد المطالب التي ينبغي أن يوفرها هذا البحث العلمي، سواء من ناحية منهجية أو من ناحية الموضوعات التي ينبغي للمهيشة أن تنظر فيها أو تكشف عن حقيقتها.

■ تحديد المشكلة :

بعد ذلك حددت هيئة البحث نطاق المشكلة موضوع اهتمامها، فقررت أن تقتصر بحثها على الحشيش دون غيره من المخدرات، وعلى التعاطي دون الأتجار أو التوزيع وعلى المتعاطين الذكور دون الإناث، وفي نطاق المدن والريف وفي الصحراء، وقد مكن ذلك هيئة البحث من بلورة هدفها الرئيسي من هذه الدراسة في أنه «الكشف عن العوامل المؤدية - بشكل مباشر أو غير مباشر- إلى تعاطي بعض الذكور المصريين للحشيش والآثار المترتبة على هذا التعاطي بالنسبة للفرد والمجتمع على السواء». وينطوي هذا الهدف الرئيسي على عدد من الأسئلة الهامة، كان على البحث محاولة الإجابة عنها وأمثلة لها:

■ ما يتصل بطبيعة الظروف الاجتماعية التي تحيط بالفرد عندما يبدأ تعاطي الحشيش والدوافع التي تدفعه لأن يستجيب لهذه الظروف بأن يتعاطي.

■ مرحلة العمر التي يبدأ عندها معظم المتعاطين.

■ أسباب استمرار البعض فى التعاطى حتى يصبح تعاطياً منتظماً، وانقطاع البعض الآخر عن التعاطى وقد لا يعود إلى هذه الخبرة إطلاقاً.

■ نوع التأثير المباشر الذى يقع على متعاطى الحشيش، والتغير الذى يمكن أن يحدثه فى حالته الوجدانية، ومزاجه العام، ونشاطه الحسى، ووظائفه العقلية العليا، وقدرته على حل المشكلات التى تعترض طريقه فى حياته اليومية.

■ معرفة ما إذا كانت هناك آثار دائمة أو مزمنة لتعاطى الحشيش، وما إذا كان ذلك ينتهى بمتعاطيه إلى الإدمان.

■ مدى تأثير الحشيش على انتاجية الشخص سواء كان عمله يدوياً أو فكرياً.

■ التحقق من صحة عدد من الأفكار الشائعة فى المجتمع عن الحشيش سواء من ناحية تأثيره على النشاط الجنسى، أو تنشيطه للقدرة على التفكير الابتكاري أو غير ذلك من الأفكار الشائعة.

■ معرفة ما إذا كانت آثار التعاطى (أيا كان نوعها أو اتجاهها) ترجع إلى التأثير الفارماكولوجى للحشيش أم إلى نوع من الابعاء الذاتى، نتيجة معتقدات اجتماعية سائدة.

كل ذلك كان يمثل عينة محدودة من عدد كبير من الأسئلة، كان على هيئة البحث تناولها ومحاولة الاجابة عليها اجابة علمية دقيقة.

خطوات البحث :

أولاً - القيام ببحث مسحى على عينة من المتعاطين تتألف من حوالى خمسة آلاف متعاط وتسمى هذه العينة بالعينة التجريبية.

ثانياً - القيام ببحث على عينة من غير المتعاطين، تسمى بالعينة الضابطة على أن تكون بالحجم الملائم وإن لم يكن مماثلاً لحجم العينة التجريبية.

ثالثاً - القيام بدراسة تجريبية متعمقة على عينة تتألف من حوالي خمسمائة متعاط ممن يقبلون متطوعين أن تجري عليهم هذه الدراسة.

رابعاً - دراسة تجريبية متعمقة على عينة ضابطة.

وواضح أن هناك اعتبارات منهجية أكاديمية في تحديد معالم هذه الخطة كما قررتها الهيئة في بدء اهتمامها بالمشكلة في نوفمبر ١٩٥٧، ومنها ترتيب الدراسة المسحية أولاً، ثم الدراسة المتعمقة بعد ذلك، وهو ما عكسه الطبيعة المنهجية في كل من الدراستين، وطبيعة الدور الذي تقوم به الدراسة المسحية في ترشيد الدراسة التجريبية... الخ. ولكن كانت هناك اعتبارات أخرى رؤي معها أن تبدأ الهيئة عملها بإعداد الأدوات التي سوف تستخدمها في جمع ملاحظاتها وبياناتها، وأن تمتحن هذه الأدوات لتعرف مدى صلاحيتها للقيام بمهمتها في ظل الظروف المحيطة بالبحث، ثم تبدأ الهيئة بعد ذلك بما يسمى بالدراسة الاستطلاعية للموضوع تجريبها الهيئة على نطاق ضيق للإسترشاد بها في التحقق من نقطتين:

الأولى: التأكد من سلامة الطريق الذي اختارته لمواجهة المشكلة، وما إذا كان ينبغي بالوصول إلى حقائق هامة تتعلق بموضوع البحث. فتتقدم لتنفيذ خطة الدراسة الأصلية وهي على درجة لا بأس بها من اليقين. أو أن بعض جوانب الخطة تتطلب الحذف أو التعديل فتجري هذا الحذف أو التعديل قبل التورط في الدراسة الأصلية الشاملة.

النقطة الثانية :

تعرف الهيئة على طبيعة العقبات التي سوف تصادفها أثناء جمعها لملاحظاتها وبياناتها وأثناء تحليلها لها، وكيف تستعد لملاقاتها. ألهم أنه أمام هذه الاعتبارات جميعاً، قررت هيئة البحث أن توجه عنايتها أولاً إلى الدراسات التمهيدية، مهتدئة بأعداد أداة البحث الرئيسية، وتمريب الأخصائيين على تطبيقها، ثم الاختبار التجريبي لميقتوي كفايتها في تحصيل معلومات يمكن الاعتماد عليها والثقة في صحتها.

وهنا يستحق الأمر وقفة متأنية، نتاح لنا فيها نظرة شاملة للمسار الفعلي الذي قطعه هذا البحث الكبير، وخطة سيره كما تحققت واقعياً، فنجد أنه قد مر بثلاث مراحل متميزة من العمل العلمي:

المرحلة الأولى :

وتمتد من نوفمبر ١٩٥٧ - إلى سبتمبر ١٩٦٠ وتضمنت توفر الهيئة على إعداد وتقنين الاستبيان، الأداة الرئيسية للبحث.

المرحلة الثانية :

وتمتد من سبتمبر ١٩٦٠ إلى سبتمبر ١٩٦٢ وفيها تم إجراء الدراسة الاستطلاعية على أربع عينات من المفحوصين:

١- مجموعة من المتعاطين للحشيش بالقاهرة، قوامها ٢٠٤ من المفحوصين.

٢ - مجموعة من غير المتعاطين بالقاهرة، قوامها ١١٥ شخصاً.

٣ - مجموعة من المتعاطين للحشيش ممن يقيمون بالمناطق شبه الحضرية والريفية بالصعيد، قوامها ٤٥ متعاطياً.

٤ - مجموعة من غير المتعاطين بنفس المناطق بصعيد مصر، قوامها ٤٠ شخصاً.

المرحلة الثالثة والأخيرة :

(وتمتد من يونيو ١٩٦٥ إلى نهاية ١٩٧٥) وفيها تم إعداد أدوات جديدة للبحث وأجريت الدراسة الرئيسية على مجموعة كبيرة من المتعاطين للحشيش (٨٥٠) متعاطياً وتقابلها مجموعة ضابطة من غير المتعاطين (٨٣٩ شخصاً) وجميعهم من الموجودين في السجون المصرية في فترة إجراء الدراسة.

ويحتاج الأمر إلى عرض موجز لما قامت به كل من هيتى البحث في كل مرحلة من المراحل الثلاث وما حققته كل منها في كل مرحلة من الاهداف.

المرحلة الأولى : اختيار واعداد الوسائل الملائمة للدراسة :

فى هذه المرحلة استقر رأي الهيئة على اختيار (الاستبار) أداة رئيسية للبحث بوصفه أكثر الوسائل ملائمة للبدء، حيث كان متوقعا أن تصل الهيئة من خلاله، وعبر عدد من التقارير اللفظية للمفحوصين، إلى وصف ما يمكن قياسه من آثار المخدر (سواء كانت مباشرة أو تراكت مع الزمن) على عدد من الوظائف النفسية، الهامة، بحيث تكون فى وضع يسمح لها بعد ذلك باستخدام مجموعة من الاختبارات النفسية الموضوعية المناسبة كنوع من أدوات إقامة الدليل أو البرهنة على صدق هذه التقارير اللفظية التى يتم الحصول عليها بواسطة الاستبار.

وقد مر تكوين الاستبار بعدد من الخطوات نجلها فيما يأتى:

(أ) تكوين الاستبار المبدئى غير المقنن:

(ب) تقنيته.

(ج) تدريب الباحثين الميدانيين (المستبرين) على تطبيقه.

(د) دراسة ثباته.

(هـ) دراسة صدقه.

وقد تم تكوين استمارة الاستبار شاملة للجوانب التالية:

١ - التقدير الشخصى للمفحوص فى مدى انتشار الحشيش بين القطاعات المختلفة فى المجتمع:

٢ - خبرة التعاطى للحشيش كما يعيشها المفحوص.

٣ - الحالة الجسمية والمظهر العام للمتعاطى:

٤ - العمليات العقلية والادراكية لدى المفحوص.

٥ - السمات الوجدانية والشخصية.

٦ - سلوك المتعاطى فى السياق الاجتماعى المحيط به (الأسرة، العمل والصداقة... الخ).

- ٧ - السلوك الجنسي للمتعاظم
- ٨ - صوره الذات لدى المتعاظم وعمل متصل بها من أبعاد
- ٩ - رأي المتعاظم فى التشديد المتزايد للعقوبة فى التشريعات القانونية والصادرة حول تعاظم المخدرات
- ١٠ - تأثير الحشيش على عدد من الوظائف البيولوجية، كالثهية للطعام والشراب والميل إلى النشاط بوجه عام.
- ١١ - الآثار التراكمية نتيجة للتعاظم طويل المدي للحشيش.
- ١٢ - نمط العلاقات داخل أسرة المتعاظم فى طفولته وصباه.
- ١٣ - تاريخ التعاظم فى العائلة.
- ١٤ - نمط العلاقات داخل الأسرة الزوجية للمتعاظم.
- ١٥ - ظروف عمل المتعاظم.
- ١٦ - الأنشطة الترويحية للمتعاظم فى أوقات الفراغ.
- ١٧ - وصف جلسة تعاظم الحشيش.
- ١٨ - البيانات الشخصية عن المتعاظم (وتشمل مستوى تعليمه وأفراد أسرته، حالته المدنية، مهنته، حالته الاقتصادية، ظروف سكنه، حالته الصحية العامة).
- ويلاحظ أن هذه الأجزاء بما تشمله من نقاط تفصيلية (حوالى ثمانين نقطة وردت فى التقرير الأول) والتي استقرت الهيئة على تضمينها استمارة الاستبصار، تحتوي على عدد من الأسئلة يزيد على ثلاثة أمثال هذه النقاط، وذلك لأسباب متعددة منها أن كثيراً من هذه النقاط عوملت على أنها رؤوس لموضوعات بلزء تقسيم مضمونها على عدد من الأسئلة ومنها أيضاً اضطرار الهيئة لتكرار عدد من الأسئلة كوسيلة للتأكد من سلامة الانجباء النفسى فى موقف الاستبصار، ومنها كذلك إضافة بعض

الأسئلة التى تتعلق بفئات خاصة من المجيبين ولا تنطبق على جميع أفراد العينة^(١).

الدراسة الاستطلاعية :

تقرر أن تبدأ هذه المرحلة فور الانتهاء من تكوين الاستبيان، وأن يتم فيها إجراء سلسلة من الدراسات الاستطلاعية تستهدف فى الأساس الوصول إلى معلومات تفيد التطبيق القريب، وتعين المسئولين عن انتهاج السياسة الملائمة لمواجهة مشكلة اجتماعية خطيرة كمشكلة تعاطى المخدرات، وقد أجريت هذه الدراسات (باستخدام الاستبيان فقط) على أربع مجموعات من المفحوصين:

الأولى: مجموعة تجريبية قوامها ٢٠٤ من متعاطى الحشيش الذكور، تتراوح أعمارهم بين أقل من ٢٠ إلى ٥٢ سنة، ممن يقيمون بشكل دائم بمدينة القاهرة لثلثهم من الاميين، والبقية تمثل مستويات تعليمية مختلفة بدءاً من الامام بالقراءة والكتابة إلى التعليم الجامعى.

الثانية: مجموعة ضابطة مقابلة للمجموعة الأولى تتكون من ١١٥ شخصاً من الذكور غير المتعاطين للحشيش أو أية مخدرات أخرى تتراوح أعمارهم بين أقل من ٢٠، وأكثر من ٥٠ سنة ويتفاوت مستوى تعليمهم بين الأمية الكاملة والتعليم الجامعى.

الثالثة: مجموعة تجريبية تشمل ٤٥ متعاطياً للحشيش ممن يقيمون فى المناطق شبه الحضرية والريفية بصعيد مصر، من نفس مدي العمر فى المجموعات السابقة تقريباً والمستويات التعليمية المشار إليها.

الرابعة: مجموعة ضابطة قوامها ٤٠ شخصاً من غير المتعاطين

(١) المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ١٩٦٠، تعاطى الحشيش فى الاقليم الجنوبي - التقرير الأول - القاهرة: منشورات المركز.

ومشابهة للمجموعة السابقة من حيث الإقامة فى المناطق شبه الحضرية والريفية بالصعيد، ومن حيث مدى العمر ومستويات التعليم المختلفة. أما ما كشفت عنه هذه الدراسات من نتائج فيشمل وفرة من المعلومات الهامة عن الظاهرة والجوانب المختلفة المرتبطة بها.

الدراسة الرئيسية :

بالنسبة لهذه الدراسة التى تمثل خاتمة المطاف فى هذا البحث الكبير، كان هناك فيما يختص بحجم العينة - اعتباران راعتهما هيئة البحث الجديدة:

الأول: أنه ينبغى أن يكون كبيراً بدرجة تسمح بفرصة التعميم السابق للحقائق التى يمكن بلوغها عن الظاهرة.

الاعتبار الثانى: أن يسمح (هذا الحجم الكبير للعينات) بالتقسيمات الضرورية التى تقتضيها التحليلات الاحصائية لأغراض إكتشاف الروابط والعلاقات الممكنة بين المتغيرات «النفسية - الاجتماعية» وبين بعض الجوانب المتصلة بتعاطى الحشيش.

بالإضافة إلى ذلك تحققت لهذه الدراسة ميزة رئيسية لم تتوفر لسابقتها، هى إدخال مجموعة من الاختبارات النفسية الادائية (فضلاً عن الاستبار) فى عمليات فحص عينات المتعاطين (ممن يمثّلون أفراد العينة التجريبية) وغير المتعاطين (أفراد العينة الضابطة) وكان وراء هذا القرار باستخدام هذه الاختبارات النفسية الموضوعية فى البحث اعتبار هام، يستند إلى أن التراث ملىء بالالوصاف الانطباعية عن الصور المرئية العديدة للسلوك النفسى والحركى، بالنسبة لمتعاطى الحشيش، ولذلك كان حرص الهيئة على إدخال هذه الاختبارات ضمن أدوات بحثها. لتحقيق عدد من الأغراض أهمها ما يأتى:

١ - أن تعد الهيئة معلومات كمية عن جوانب محددة من السلوك

النفسي احرى، سمح بعدد المقارنات بين الفئات المختلفة من المتعاضين للتحشيش، إلى جانب المقارنة، بين هؤلاء وبين غير المتعاطين.

٢ - استخدام نتائج هذه الاختبارات كمحك خارجي لصديق عدد من الاحكام الشائعة بشكل عام على أنها أوصاف دقيقة للسلوك الفعلى لمتعاطى الحشيش.

٣ - يمكن الهيئة من اكتشاف المجال حول مدى الاتفاق بين أداء المتعاطين على الاختبارات، وبين تقريرهم عن أنفسهم من جوانب السلوك المشابهة لما تقيسه الاختبارات النفسية الأدائية. من ناحية ثانية فقد روعيت من جانب الهيئة مجموعة من الاعتبارات فى اختيارها لهذه الاختبارات من أهمها:

١ - أن تغطى مدى عريضاً نسبياً من الوظائف النفسية، المعرفية والحركية وغيرها.

٢ - أن تكون قابلة للاستخدام فى الحضارات المختلفة دون تحيز الحضارة معينة، وذلك حتى يكون ممكناً عقد المقارنات فى المستقبل بين الباحثين المختلفين، وغير البيانات الحضارية المختلفة.

٣ - أن تكون إجراءات تقديمها من البساطة والوضوح بحيث يسهل فهمها وأداؤها بالنسبة لكل المفحوصين من المستويات التعليمية المختلفة.

٤ - أن تستغرق وقتاً قصيراً فى تقديمها من جانب الباحث، وفى أدائها من جانب المفحوص بدرجة تسمح باكمال ما هو مطلوب فى عملية الاختبار، والاستمرار أيضاً فى الوقت المقرر وفى نفس الجلسة.

٥ - يتم الاجراء فى حجرة خاصة قد تم تجهيزها فى السجون المصرية.

عينات المفحوصين فى الدراسة الرئيسية :

أجريت التطبيقات المختلفة للاستبيان والاختبارات الموضوعية على مجموعتين من المفحوصين داخل مختلف سجون القطر المصري، بالوجهين

البحري والقبلى، (المجموعة الأولى - العينة التجريبية) قوامها ٨٥٠ من الأفراد المحكوم عليهم فى جرائم تعاطى الحشيش، ممن قرروا أنهم كانوا يتعاطون الحشيش مرة واحدة على الأقل فى الشهر، طوال السنة السابقة على سجنهم مباشرة. أما المجموعة الثانية (العينة الضابطة) فتتكون من ٨٣٩ شخصاً من غير المتعاطين ممن قرروا أنه ليس لديهم أية خبرة فى تعاطى الحشيش أو أية مادة مخدرة أخرى، وتم اختيارهم فى هذا الموقف من كل المسجونين الذين يقضون مدة العقوبة لجرائم غير التعاطى أو الاتجار فى المخدرات، واستبعد منهم أيضاً المسجونون بجرائم السرقة البسيطة، لسبب أن عدداً كبيراً منهم - كما تشير سجلاتهم - يقضون مدداً بسيطة خارج السجن وسرعان ما يعودون إليه، وهذا الظرف بكل ما له من دلالات نفسية واجتماعية يمكن أن يتدخل بشكل خطير عند مقارنتهم بالمجموعة التجريبية.

ويكشف الجدول رقم (٥) مدى التكافؤ بين المجموعتين فى عدد من المتغيرات الهامة.

والواضح أن هناك بعض الفروق بين المجموعتين فى عدد من المتغيرات، لكن هذه الفروق يمكن أن تتلاشى عند إجراء التقسيمات الفرعية لكل من العينتين لعقد المقارنات الضرورية بينهما، وهذا ما تحقق بالفعل فى مرحلة التحليل للتناجح، والتصدي لتفسيرها بعد ذلك^(١).

(١) المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناحية ١٩٨٢، بحوث فى المخدرات من عام ١٩٥٧ - ١٩٨٠. القاهرة: منشورات المركز.

جدول رقم (٥)

يوضح التغيرات المختلفة لعينى البحث التجريبية والضابطة

المتغيرات	المجموعة التجريبية ن = ٨٥٠	المجموعة الضابطة ن = ٨٣٩
العمر: المدي	من ١٥ سنة إلى ما فوق ٥٠ بقليل	من ١٥ سنة إلى ما فوق ٥٠ بقليل
المتوسط	٣٩ (١٠.٥ سنة)	٣٣ (٩.٧٥ سنة)
التعليم: أمى	٦٠٪	٨٠.٥٤٪
يقرأ ويكتب ما قبل الثانوية العامة	٣٨.٣٩٪	٧٥.٢٨٪
ثانوية عامة	٧٢٪	٣٦.٥٪
مؤهل جامعى	-	٩.١٪
الحالة الاجتماعية: متزوج	٧٢٪	٥٨.٤٪
أعزب	٢١٪	٣٦.٩٪
مطلق	٦٪	٣.٦٪
أرمل	١٪	١.١٪
الريف والحضر: يقيمون بالحضر قبل السجن	٥٤٪	٥٤.١٪
يقيمون بالريف قبل السجن	٤٦٪	٤٥.٩٪
العمل: عاملون فى مهن تحتاج لمهارة	٢٥٪	٢٦٪
عاملون فى مهن لا تحتاج لمهارة	٧٥٪	٧٤٪

■ نتائج الدراسة :

وكانت من أهم النتائج التى توصلت إليها هيئة البحث فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ما يلى:

(أ) الاسباب التى تؤدى إلى تعاطى الحشيش :

● مجازاة الاصحاب.

● حب الاستطلاع.

● إظهار الرجولة.

● التقليد

● الحصول على متعة جنسية.

(ب) الاسباب التي تؤدي إلى إدمان الأفيون :

● تحمل مشاق العمل.

● القرفشة.

● اللذة الجنسية.

ك (ج) تزداد مرات التعاطى مع تزايد الظروف الاجتماعية السيئة.

(د) تزداد مرات التعاطى مع زيادة دخل الفرد.

(هـ) تزداد مرات التعاطى مع تزايد عدد ساعات العمل اليومي للمتعاظم.

(و) يزداد تعاطى الحشيش عند العمال أكثر منه عند أي طبقة أخرى.

(ز) يزداد تعاطى الحشيش مع زيادة المشكلات الأسرية بين والدي المتعاطى وكذلك مشكلاته مع أسرته الخاصة به هو (الزوجة والاولاد)^(١).

■ الآثار النفسية الاجتماعية المباشرة للتعاطى :

تقوم بيانات هذا الجزء على سؤال المتعاطين عن تأثير الحشيش على عدد من العمليات والنتائج الاجتماعية. وكان أسلوب البحث فى هذه النقطة هو سؤال المتعاطين عن حالة بعض العمليات فى ظروف أربعة:

● فى حالة الحرمان.

(١) المركز القومي للبحوث الاجتماعية، ١٩٦٤، نتائج المسح الاستطلاعي في مدينة القاهرة - التقرير الثاني - القاهرة: منشورات المركز.

● فى الحالة العادية.

● فى حالة التخدير.

● وبعد الافاقة من أثر التخدير.

وسنعرض لأهم النتائج فى هذا الصدد.

■ بالنسبة للوظائف الإدراكية فيمكن تلخيص النتائج فيما يلى :

إن إدراك الفترات الزمنية يختل فى اتجاه البطء وإدراك المسافة المكانية يختل فى اتجاه زيادة الطول وإدراك الاحجام يختل فى اتجاه التضخيم ويزداد الابهام بالنسبة لإدراك الخطوط. فالاختلال فى هذه الوظائف إذن وحيد الاتجاه غالباً. إما فيما يتعلق بإدراك الالوان ووضوح الأصوات وأرتفاعها فهذه الاختلالات جميعاً مؤقتة بحيث تزول فى اليوم التالى للتعاطى.

● اضطرابات فى التذكر.

● اضطرابات فى التفكير تتمثل فى سرعة التنقل من فكرة إلى أخرى أثناء التخدير Flights of Ideas ، وعدم التركيز وعدم القدرة على حل المشكلات، ووفرة وسرعة توارد الافكار دون اتجاه محدد.

■ الجوانب الوجدانية :

أوضحت الدراسة أن المتعاطين يتميزون بعدد من السمات الشخصية منها: ميل إلى التحكم والسيطرة واتجاه إلى التسرع والمعارضة ونفور من الاجتماع بالناس مع الشعور بالقلق.

أوضحت الدراسة أثر التعاطى على الانتاج بأنه غاية فى الخطورة ذلك أن المتعاطى يؤدي إلى ضعف إنتاجية الفرد حيث أن عملية الانتاج ترتبط بالعمليات الإدراكية والفكرية لدى الشخص وبذلك يمكن أن نفهم

أن اختلال كم الانتاج وكيف الانتاج من تأثير المخدر على هذه العمليات والوظائف^(١).

✍ - دراسة مصطفى زيور (١٩٦٣) :

موضوعها: «تعاطي الحشيش كمشكلة نفسية».

وهي دراسة نظرية من أعمال الحلقة الثانية لمكافحة الجريمة، ويقول الدكتور زيور أن المرحلة التي ينتمى إليها سلوك متعاطي المخدرات هي مرحلة مجاورة للمرحلة التي ينتمى إليها المرضى بذهان «الهوس والاكتئاب»^(٢) فحالة التخدير بالحشيش تختلف عن غيرها لما تتميز به من أنطلاق أخيلة هائلة لما تحفل به من مفارقات مؤدية إلى قهقهة خاصة تفرغ شحنات عظيمة من التوتر تفضي إلى «فرقة» من نوع فريد، والدليل على ذلك أن الكثير من مدمني الأفيون يتعاطون الحشيش أيضاً ويقولون أنهم يستشعرون «خرمان الحشيش» وهم في حالة من التخدير بالأفيون، ويصرون على اختلاف النوعين من الخمران، فهم يتناولون الأفيون أساساً، لاستبعاد آثار «خرمان» الأفيون المؤلمة جسدياً ونفسياً، وبالتالي لاستعادة النشاط والاندماج القدرة على احتمال المشقة، أما الحشيش فهم يتناولونه للحصول على تلك «الفرقة».

إن التخدير بالحشيش ينفرد بخفض السكر في الدم فيثير الجوع ولا سيما إلى المواد السكرية مما يعزز النكوص إلى العشقية القمية المميز لحالات التخدير ويقول الدكتور مصطفى زيور في دراسته أن المرح في الإدمان إنما هو ضرب من الهوس Hipomania الصناعي، وهذا يعني أن مرح الإدمان إنما هو ميكانيزم دفاعي للتغلب على الاكتئاب، والخلاص منه كما يحدث تلقائياً لدى بعض المرضى (بالهوس والاكتئاب). وتحديث

(١) المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ١٩٦٠، تعاطي الحشيش في التعليم الجنوبي - التقرير الأول - القاهرة: منشورات المركز.

الدكتور عن سيكولوجية المرح بوصفها محور سيكولوجية متعاطى الحشيش وأوضح أنه من خلال المقارنة بين الهوس والنوم أن الأساس الأول لليبيدي في كليهما هو العشقية الفمية والاتحاد بشدي الأم.

ويري الدكتور مصطفى زيور اتفاقاً مع بحث سعد زغلول المغرسى أن شخصية متعاطى الحشيش تميل إلى الانطوائية، والاكتئابية، الانسحابية بدرجات متفاوتة. أما أثناء التخدير فإن المتعاطى يحس مشاعر قوامها: إرتفاع تقدير الذات إرتفاعاً قد يصل إلى الجلال والسمو الفائق، وهذا يتضمن إنعدام كل شعور بالحطة أو العجز أو التوتر الناشئ عن تأنيب الضمير، كما يتضمن الاحساس بالخلود أو القدرة المطلقة على كل شيء والمتغلبة على كل متاعب الحياة الدنيا، ثم أن الشعور بأن الذات قد أصبحت مركز العالم، ولا تتحقق هذه السمات الوجدانية دائماً بأكملها بهذه الصورة لدى كل متعاطى للحشيش، لكن هناك فروقاً فردية ترجع إلى تكوينات نفسية أو مزاجية متباينة من شأنها أن تدخل على صورة التخدير السابقة اختلافات كثيرة، فقد تعتري بعض المتعاطين فترات من الهيلة واضطراب خطير مؤلم فى الشعور بوحدة الكيان، وتدخل صورة الجسم مما ينم عن اندلاع حال من انهيار وحدة الشخصية، أو قد تعتريهم فترات طويلة من الانقباض الاكتئابى مما يميز التكوين الاكتئابى المستفحل، أو قد تساورهم إشارات التشكك وأفكار التلميح مما يميز التكوين البارانوني. ومن الواضح أن هذه الاختلافات ترجع إلى أن ضرورياً من الذهان والعصاب الفادح كانت كامنة ولم يقو المخدر على إنكار بواعثها بل زادها وضوحاً^(١).

محر - دراسة حسن الساعاتى (١٩٦٣) :

موضوعها: «تعاطى الحشيش كمشكلة اجتماعية».

(١) مصطفى زيور، ١٩٦٣، تعاطى الحشيش مشكلة نفسية - من أعمال الحلقة الثانية لمناقشة الجريمة - القاهرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. ص ص ٢٦ - ٣٩ .

وقد تناولت هذه الدراسة ظاهرة تعاطي الحشيش في مصر من الناحيتين الاجتماعية والثقافية.

والمقصود بدوافع تعاطي الحشيش تلك الدوافع الداخلية التي تعتمل في نفس الفرد فتجعله يتعاطي الحشيش سواء كان التعاطي بانتظام أي بطريق الاعتياد، أم كان حسب المناسبات والظروف، وقد أوضح هذه الدوافع فيما يلي:

- تناسي الهموم واستجلاب السرور.

- تحصيل لذة جنسية كبرى.

- استشعار روح الجماعة المرحية.

- دوافع أخرى خاصة، ويقصد بهذه الدوافع الخاصة، تلك الدوافع التي تجعل بعض أفراد فئة معينة من الناس، كالفنانيين مثلاً يتعاطون الحشيش بقصد إيجاد الفن، وهناك من يتعاطي الحشيش ليتحايّل على النوم ويعالج به حالة أرق شديد، وهناك من يتعاطي ليتحرر من ملل عمله الرتيب الذي لا يحتاج إلى حذق كبير.

وأكد الدكتور حسن الساعاتي في بحثه أن متعاطو الحشيش يعتقدون أنه يذكى العقل ويعدل المزاج ويفيد الجسم ويرهف الاحساس، ومن لا يتعاطي محروم من كل ذلك من وجهة نظرهم، كذلك يري متعاطو الحشيش أنه غير محرم بالمقارنة بالخمر، وهذا إعتقاد خاطئ، لديهم يحللون به تعاطيهم للحشيش^(١).

— - دراسة سعد المغربي :

موضوعها: «سيكولوجية تعاطي المخدرات» (١٩٦٦).

(١) حسن الساعاتي، ١٩٦٣، تعاطي الحشيش كمشكلة اجتماعية - من أعمال الحلقة الثانية لكافحة الجريمة - القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ص ٥٦ - ٦٤.

وقد أقتصرت هذه الدراسة على إدمان الأفيون فقط دون غيره من المخدرات.

عينة الدراسة :

كانت عينة الدراسة كما ذكر الباحث كالآتي:

■ العينة قاصرة على مدمني الأفيون من المستويات الدنيا من السلم الاجتماعي للمجتمع، واقتصارها على هذه الطبقة أمر فرضته طبيعة ظاهرة تعاطي الأفيون نفسها فهو شائع في الطبقات الدنيا، نادراً جداً في الطبقات العليا.

■ وكانت هذه العينة التجريبية وعددهم ٢٥ حالة طبق على عشرة منهم الاختبارات كلها.

■ عينة ضابطة وتشمل ٦٥ حالة طبق على ١٠ منهم كل الاختبارات المستخدمة في البحث كما هو الحال في المجموعة التجريبية.

■ الوضع الطبقي للعينة فقد قرر الباحث أن ١٠٪ من حالات المدمنين في العينة التجريبية ينتمون إلى الطبقة الدنيا، وهي طبقة العمال والفلاحين، وكذلك غير المدمنين ينتمون إلى هذه الطبقة (أي العينة الضابطة).

■ المستوي التعليمي عند العينة تراوح بين الأمي والضعيف القراءة والكتابة، وكان أكثرهم تعليماً حاصل على شهادة متوسطة.

■ أما الوضع المهني فكانت العينة التجريبية كالآتي:

- صبي نجار، فلاح في الأرض، مزارع، صبي ترزي، صبي حلاق، بائع خضار، صبي لبان، صبي براد.

■ أما عن الوضع المهني للعينة الضابطة فكان كالآتي:

- صبي نجار، صبي يقال، صبي ميكانيكي، عامل يحمل خردوات، كاتب، يحمل صبي حلاق، بائع غازوزة، صبي نجار موبيليا، بائع خضار، طباح.

فروض الدراسة :

- ١ - إن إدمان المخدرات وبخاصة الأفيون هو عرض Symptom ونتيجة لاضطرابات عنيفة في الشخصية.
- ٢ - إن ظاهرة الإدمان عملية تكيفية وظيفية دينامية.
- ٣ - إن هناك استعداداً تكوينياً معيناً يبدأ في مراحل النمو النفسى المبكر يؤدي إلى القابلية للإدمان.
- ٤ - إن شخصية المدمن تتسم وتقوم على الخصائص الآتية:
 - (أ) ضعف الذات.
 - (ب) كف العدوان واضطراب التوحد والتعيين الذكري.
 - (ج) السلبية وانخفاض مستوي الطموح.
 - (د) التشاؤم وعدم الثقة بالسلطة والنظم الاجتماعية كموضوعات أو وسائل إشباع.

أدوات الدراسة :

وقد استخدم الباحث الادوات التالية:

- (أ) المقابلة الحرة التى أمدته بالتاريخ التطوري للحالة ونوع العلاقات الاسرية وبخاصة فى المراحل المبكرة للطفولة.
- (ب) إختبار الورشاخ.
- (ج) اختبار لمفهوم الذات والآخر (من وضع الباحث).
- (د) استبيان مستوي الطموح.
- (هـ) اختبار الاحباط المصور لروزنرفيج.
- (و) تحليل الاحلام.

نتائج الدراسة :

أيدت الدراسة الفروض التى وضعها الباحث وانتهى إلى:

- سيكولوجية المدمن تقوم على محور واحد وهو كف العدوان وأن هذا الكف ينسحب على بقية نواحي الشخصية من ضعف الذات، وانخفاض اعتبارها والسلبية، وانخفاض مستوى الطموح واضطراب التوحد، والتعيين الذكري، والتشاؤم وعدم الثقة بالسلطة والنظم الاجتماعية^(١).

٣- دراسة سويف (١٩٦٧) :

وموضوعها: «استخدام الحشيش فى مصر».

عينة الدراسة :

مجموعة تجريبية؛ وهى تضم جميع الذكور، الذين يتعاطون الحشيش والذين تم اعتقالهم فى سجون القاهرة فى الفترة ما بين يونيو ١٩٦٧- ومارس ١٩٦٨ وكانت تتراوح أعمارهم ما بين ١٥ إلى ما فوق ٥٠ سنة بمتوسط عمر قدره ٣٩ سنة. وكان عدد هذه العينة ٨٥٠ متعاطى للحشيش.

■ الحالة المدنية :

٧٢٪ منهم متزوجين، ٢١٪ عزاب، ٦٪ مطلقين، ١٪ أرامل.

■ الحالة التعليمية :

٦ فقط منهم استكملوا تعليمهم العالى.

■ الحالة المهنية :

٢٥٪ منهم عمال مهرة والباقيون يتمتعون بمهارة بدرجة متوسطة أو معتدلة.

(١) سعد زغلول المغربي، ١٩٦٦، سيكولوجية تعاطي المخدرات - رسالة دكتوراه (غير منشورة) كلية الآداب - جامعة عين شمس.

● بالنسبة للدخل :

٦٥٪ منهم يحصلون على ١٥ جنيهاً في الشهر.

■ المجموعة الضابطة :

تكونت من ٨٣٩ مفحوص من المسجونين الغير متعاطين للمخدر،
تراوحت أعمارهم ما بين ١٥ - ٥٠ سنة بمتوسط قدره ٣٣,٥ سنة.

الحالة الاجتماعية :

٥٤,٨٪ منهم كانوا متزوجين، ٣٦,٩٪ منهم عزاب، ٣,٦٪ مطلقيين،
١,٩٪ أرامل.

الحالة التعليمية :

٥٤,٨٪ منهم غير متعلمين، أما الباقين فكانوا على درجة من التعليم
لا بأس بها. ٤٤٪ من المفحوصين حصلوا على شهادات المدارس العليا، ٩٪
من المفحوصين حصلوا على شهادات جامعية.

الحالة المهنية :

٢٦٪ لديهم مقدرة عالية في المهارات أما الباقين فقد كانوا يتراوحون
بين المتوسط والعادي أو المبدئ.

● بالنسبة للدخل :

٥٠٪ منهم يحصلون على ١٥ دولار في الشهر.

■ أدوات الدراسة :

- المقابلة الشخصية للمجموعة التجريبية وتتضمن ٢٥٨ سؤال.
- المقابلة الشخصية للمجموعة الضابطة وتتضمن ١٤٧ سؤال.
- اختبارات موضوعية للمسافة والدقة والحركة والذاكرة المباشرة والتأزر
الحركي والتأزر البصري والتقدير للزمن والاطوال.

■ نتائج الدراسة :

أدلت معظم المجموعة أن سبب تعاطى الحشيش كالاتى:

- القدرة على مسايرة الجماعة.
- القدرة على التصرف كالرجال الحقيقيين.
- تقليد الآخرين.
- حب الاستطلاع.
- نسيان مشاكل الفرد الشخصية.
- القضاء على الأرق والاكئاب.
- دواء ضد الكسل.
- الحصول على المتعة الجنسية.
- وكذلك أكدت النتائج أن متعاطى الحشيش يميلون بدورهم إلى استخدام بعض المواد الفعالة التى لها أثر على الجهاز العصبى فهم يميلون إلى استخدام الكحوليات والقهوة.
- إن تعاطى الحشيش له أثره على الجهاز العصبى.
- إن التأثير المباشر للحشيش يحدث اضطراباً فى الإدراك بحيث تطول المسافات وتختلف الاجسام وتهتز حدود الاشياء وتبدو الالوان أكثر نعومة.
- يقل الانتاج أثناء تعاطى الحشيش وعند الرغبة فى تناوله.
- إن المدمنين شديدي الإدمان يمكن أن نطلق عليهم مرضى اجتماعيين.
- مدمتى الحشيش لديهم سوابق إجرامية تكثر عن المجموعة الضابطة.
- متعاطى الحشيش يطفىء التعلم بالمقارنة بغير المتعاطين^(١).

(1) Souief M.I., 1971, The Use of Cannabis (Hashish) In Egypt - A Behavioural Study - Bulletin on Narcotics, Vol XXIII No.4. PP 17 - 21.

- دراسة سوف (١٩٧٠) :

موضوعها «دراسة ايدلوجية الحشيش».

ويقصد بهذا التعبير مجموع الاعتقادات التى يرجع إنها توجه المتعاطين وتبرر لهم مواقفهم أو تصرفاتهم تجاه عدد من المسائل المتصلة بهذا المخدر.

فروض الدراسة :

- تفترض هذه الدراسة أن المربين والمعالجين والمشرعين، وكل أعضاء المؤسسات الاجتماعية المعنية بتعديل السلوك فى مجال الاعتماد على المخدرات فى حاجة إلى التعرف على الحقائق والمعلومات العلمية الدقيقة حول الآراء والقيم التى تحكم سلوك المتعاطين تجاه المسائل المتصلة بالمخدر، على أساس أن هذه المعلومات تساعد على التخطيط الأفضل لإجراءات أكثر فعالية.

نتائج الدراسة :

- إن المتعاطين للحشيش لا يرون أنفسهم بنفس الصورة التى يراها بها الأفراد غير المتعاطين، فيما يتصل بالقيم الدينية والميل إلى السلوك الإجرامى، حيث قرر معظم المجموعة التجريبية أن الحشيش غير محرم دينياً، وكذلك لا ترى نفس المجموعة أن هناك علاقة أساسية بين اعتياد تعاطى الحشيش وبين الميل إلى الجريمة وإرتكابها بالفعل.

- إن المتعاطين للحشيش يبدون أكثر حرصاً عن غير المتعاطين على إقصاء ابنائهم عن تعاطى المخدر.

- إن نسبة كبيرة من المتعاطين أوصت باتخاذ إجراءات مشددة ضد جلب الحشيش والاتجار غير المشروع فيه، كما رأت النسبة الغالبة منهم أن توفير التسهيلات الممكنة لتتقدم طوعية للعلاج يمثل خطوة فى الاتجاه

الصحيح لحل مشكلة تعاطى المخدرات^(١).

مخرج دراسة السكرتارية العامة للهيئة الدولية للشرطة الجنائية
(١٩٦٩) :

موضوعها: « تعاطى الشباب للمخدرات والمواد المؤثرة على النفس
والعقل ».

وقد حددت هذه الدراسة الشباب من بلغ من العمر أقل من ٢٥ سنة
وأوضحت هذه الدراسة الآتى:

■ أن هناك تزايد مستمر فى عدد الشباب الذي يستعمل أو يسعى
الاستعمال للمخدرات أو المواد المؤثرة على العقل والنفس.

■ إن الشباب يحصلون على المخدر بطريقتين من التجار المحترفون أو
المدمنون الآخرون..

■ إن المصادر المالية للشباب غالباً ما تكون من الأجر الشخصى أو
المصروف الذي يحصل عليه من الأسرة، أو من ممارسة بعض الأنشطة
الاجرامية.

وحددت هذه الدراسة الفئات التى ينتمى إليها الشباب المدمنين على
المخدرات من حيث طبقاتها الاجتماعية كالآتى:

■ الشباب الذي يتعاطى المخدرات فى الدولة الصناعية لا ينتمى إلى
طبقة اجتماعية معينة، لكنه ينتمى إلى مجموعات من الأفراد، لهم عرف
خاص فى المجتمع الحديث ينازعون من أجله.

■ يقتصر استعمال المواد المؤثرة على النفس والعقل فى هذه المجتمعات
الصناعية على شباب الطبقات الراقية.

(1) Souief M. L., 1973, Cannabis Ideology, A Study of Opinipn
and Beliefs Centering Around Cannabis Consumption. Bulletin on
Narcotic (XXX 4). Cairo: UCSCR. PP. 33 - 38.

■ بينما ينتشر التعاطي للمخدرات في الدول التي لا يوجد فيها إلا القليل من الصناعة على الطبقة الفقيرة، ويرجع هذا إلى ظروف الحياة الشاقة التي تجعلهم يلجأون إلى تعاطي المخدرات كنوع من الهروب. وقد حددت هذه الدراسة دوافع تعاطي الشباب للمخدرات كما أدلت به معظم الدول المشتركة في الدراسة كالآتي:

- ١ - الفضول (حب الاستطلاع) كما ذكرت معظم الدول المشتركة.
- ٢ - مساهمة التيار، فالشباب يريد مسايرة التيار (الموضة) دون التمييز بين الطيب والردىء منها.
- ٣ - الحصول على السعادة المحرمة.
- ٤ - الرمزية: فقد أشارت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن استعمال المخدرات كان يعتبر لدى بعض الشباب رمزاً للاعتراض على المجتمع الذي يعيشون فيه^(١).

- دراسة محمد السيد حنورة (١٩٧٣) :

موضوعها: «دراسة للاستخدام الغير طبي للمواد المنشطة نفسياً بين طلاب المدارس الثانوية الذكور في مصر». وهي دراسة انتشارية.

أهداف الدراسة :

- الهدف الرئيسى لهذه الدراسة هو وجود إجابة حتمية للأسئلة الآتية:
- كيف انتشر سوء استعمال المخدرات بين الذكور في المدارس الثانوية؟
 - ما هى المواد المؤثرة نفسياً الأكثر شيوعاً واستعمالاً؟
 - ما هى المتغيرات النفسية والاجتماعية المرتبطة مع استعمال هذه المواد؟

(١) السكرتارية العامة للهيئة الدولية للشرطة الجنائية، ١٩٧١، تعاطي الشباب للمخدرات والمواد المؤثرة على النفس والعقل. القاهرة: المكتب الدولي العربي لشنون المخدرات.

عينه الدراسة :

تكونت عينة الدراسة من حوالى ٦٠٠٠ ستة آلاف طالب اختيروا من حوالى ١٢٤ فصلاً دراسياً موزعين على ٢٤ مدرسة عملة جميع أنحاء مدينة القاهرة. وكان عمر هذه العينة يتراوح من ١٦:١٢ سنة.

أداة البحث :

■ وضع استخبار خاص لهذه الدراسة يتكون من ٨٦ سؤالاً وقد حسب ثبات وصدق الاستبيان وقد قام بتطبيق هذا الاستبيان عدداً من الباحثين المؤهلين.

نتائج الدراسة :

■ المخدرات الطبيعية أكثر انتشاراً فى حياة المفحوصين عن المخدرات التخليقية.

■ معظم المفحوصين تعرفوا على المخدرات عن طريق أصدقاءهم واتصالاتهم.

■ المفحوصون الكبار فى السن جربوا المخدرات التخليقية أكثر من صغار السن.

■ طلاب القسم الادبى أكثر تعرضاً للمخدرات عن زملائهم من القسم العلمى.

٣ - دراسة يحيى الرخاوي (١٩٧٠) :

موضوعها: «علاج المدمنين صحياً».

وقد أكد فيها أن متعاطى المخدرات يكون دافعه الاول للتعاطى الحصول على لحظات نشوة وهى حالة مزاجية عابرة قوامها الشعور بأن كل شئ على ما يرام^(١).

(١) يحيى الرخاوي ١٩٧١، الانسان وصحته النفسية. القاهرة: الانجلو المصرية.

١٢ - دراسة رشاد كفاقي (١٩٧٣) :

موضوعها: «سيكولوجية اشتهاء المخدر لدى متعاطي الحشيش».

هدف الدراسة :

حددت المشكلة في هذه الدراسة في مجال الاعتماد على المخدرات على إنها المتعاطى ذاته، وقد حددها الباحث على إنها المتعاطى في حال الخرم، بحيث يتمكن من إلقاء الضوء على سيكولوجية المتعاطين أثناء الخرم.

عينة الدراسة :

ضمت عينة الدراسة مجموعة من الأفراد ممن يتعاطون الحشيش أو السجائر على ألا تقل كمية السجائر بالنسبة للفرد الواحد عن ٢٠ سجارة يومياً. وكانت عينة البحث مكونة من ستة أفراد كالاتى:

حالة رقم (١) متعاطى حشيش، عامل، سواق، أعزب، السن ٣١ سنة، يقرأ ويكتب.

حالة رقم (٢) متعاطى حشيش، موظف، السن ٣٩ سنة، متزوج، تعليمه متوسط.

حالة رقم (٣) متعاطى حشيش، متعهد سجاير، تاجر جملة، متزوج، ٥٢ سنة.

حالة رقم (٤) متعاطى ليس له عمل ثابت، متزوج، السن ٣٠ سنة، يقرأ ويكتب.

حالة رقم (٥) مدخن ٤٧ سنة متزوج، يقرأ ويكتب.

حالة رقم (٦) مدخن ٢٥ سنة، أعزب، يقرأ ويكتب.

وقد قسم الباحث المتعاطين إلى حشاش ومدخن.

وقد تمت الدراسة بالنحو التالي :

- ١ - استبيان المفحوصين وذلك لالقاء الضوء على مجالات محددة.
 - ٢ - القيام بجلسات التداعى الحر للمفحوصين فى حال الحرى.
 - ٣ - القيام بجلسات التداعى الحر للمفحوصين فى الحال العادية.
 - ٤ - تطبيق اختبار تفهم الموضوع كتكنيك اسقاطى على المفحوصين فى احوالهم المتباينة (الحرى - العادية - النشوة).
- وكان الاستبيان يكشف عن النقاط الآتية:

- ١ - ظروف بدء التعاطى.
- ٢ - تأثير التعاطى وفيها يتكلم المفحوص عن تجربة التعاطى وما يمر به من أحوال متعددة تبين صور الأحوال الأربع التى يخبرها المتعاطى ألا وهى:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| (أ) حالة التخدير. | (ب) ثانى يوم صباحاً. |
| (ج) الحالة العادية. | (د) حالة الحرى. |
| ٣ - العلاقة بالوالد. | |
| ٤ - العلاقة بالأخوة. | |
| ٥ - العلاقة بالوالدة. | |
| ٦ - العلاقة بالزوجة. | |
| ٧ - العلاقة بالأبناء. | |
| ٨ - العلاقة بالاصدقاء. | |
| ٩ - العلاقة بالجنس الآخر. | |

نتائج الدراسة :

- ١ - تتسم حالة الحرى بالتوتر الناجم عن الاحباط الفنى، بالإضافة إلى الحرى والاكتئاب والعجز وإفترقاد الاحساس بالأمن، وهذه المشاعر

والأحاسيس التي يوجد بعضها في الحال المعتاد ولكن على نحو أخف وطأة مما هو عليه الحال في الحرم، وترجع هذه المشاعر إلى إفتقاده للموضوع الطيب (الثدي) وفي حالة الحرم قد تستثار لديه من مخاوف وقلق الخصاص تلك التي ينجح بالتعاطي في انكارها.

٢ - الشعور بالحاجة إلى الاشباع السريع دون مقدرة على الارجاء، فالمتعاطي يشعر بالرغبة في إرضاء أنه الأعلى الذي يقوم بالحجز على رغبات الهى، إلا أن الأنا هنا في الحرم يكون أكثر تعاطفاً مع مطالب الهى تلك التي تتمثل في حاجته إلى الحب وأن يعين ذاته بالمحبوب، وأن يفتنى فيه، بينما نجد في الحال المعتاد أكثر تعاطفاً مع مطالب الأنا الأعلى وإن حال الحرم يجعله أكثر حساسية لتأثير المخدر بحيث أن قدراً ضئيلاً منه يحدث التأثير المرغوب.

٣ - عدم الكفاية والمقدرة على التعامل مع الواقع وإقامة علاقة انسانية، ومن ثم العزوف عن عقد تلك الصلات، أي أنه غير راغب في التواصل الانساني والتخدير وسيلته في عقد صلته بالواقع والتعامل معه بكفاية.

٤ - تزداد في الحرم مقدرته على العطاء ضعفاً، فهو لا يستطيع أن يعطى دون مقابل.

٥ - الافتقار إلى وجود الأم والرغبة في التواجد معها، واشباع الرغبات وتحقيق هذه الرغبات هלוيساً، فهو في حال الحرم يستشعر ضرورة الاشباع الفمى والرغبة في الحب والدفء من قبل الأم يدفعه إلى أن يتحول تجاه الأب، فهو يقف موقفاً أوديبياً سالباً، وفي حال التعاطي تتواجد الأم كموضوع طيب ومثالى يقوم باشباع رغباته الفمى، وهنا يستشعر المتعاطي تحصيله على القدرة المطلقة على تحقيق الرغبات، وبإدماج موضوع الاشباع الفمى في التعاطي فإنه يستشعر الاقتراب من أنه الأعلى ذي القدرة المطلقة الذي يرغب -في الحرم- في الحصول على

رضائه، ويهاجم بشدة الجانب القاسى السىء منه الذي تشدد قسوته فى الحرم، كما وأنه يستشعر تلك الحال الاخيرة كاحباط من جانبه، لما يعتمل فى نفسه من رغبات للهسى يدينها يشدة، ويمكن القول بأن الأنا يزداد ضعفاً فى الحرم بينما يشتد الأنا الأعلى قسوة.

٦ - الارتداد إلى الوضع الفصامى البارانوي، وما يتسم به من حصر وصراعات ذات طبيعة اضطهادية، واللجوء إلى الميكانيزمات البدائية، ولكنه ليس نفسه ارتداد اللهاني، فهو ليس ارتداداً شاملاً وتاماً.

٧ - الميل إلى الحصول على القدرة المطلقة والعمل على استعادتها، وكذلك النزعة إلى الحصول على رضاء الأنا الأعلى ذي القدرة المطلقة.

٨ - موقف المتعاطى من تعاطى الحشيش مضاعف الحتم، فهو تارة إدماج لموضوع سىء، وتارة بمثابة إدماج للموضوع الطيب، وتارة ثالثة بمثابة إدماج لموضوع محبوب ومكروه فى آن واحد، وهكذا يتسم الموقف من التعاطى بالثنائية الوجدانية والتناقص فى الارادة.

٩ - ثمة ما يوحي بأن تعاطى الحشيش لا يشبع خرمه فحسب، وإنما يشبع أيضاً خرم السيجارة، وإن لم يكن العكس صحيحاً، وهكذا يمكن من افتراض أن خرم السيجارة والحشيش ينتميان إلى مصادر متقاربة، وإن يكن الاشباع الذي يحققه تعاطى الحشيش أقوى، أي إنه يمكن القول، أن تعاطى الحشيش يمكنه أن ينكر المشاعر الاكتئابية.. بينما السجائر ليست كفيلة بانكارها كلية.

١٠ - إن خرم الحشيش يمكن اشباعه جزئياً بمواد بديلة كالأفيون أو أن خرم الحشيش إنما هو خرم لتحقيق حال من المرح.

١١ - البناء النفسى لمتعاطى الحشيش قريب من البناء النفسى لدى مرضى الاكتئاب والهوس.

١٢ -متعاطى الحشيش فى حال الحرم ينشد الاشباع القمى كما تحققه

جلسة التعاطى، وما تتسم به من وجود رفقّة في التعاطى يتحقق بوجودهم
خرب من التواصل الانساني.

١٣ - تزداد صورة الذات رداءة وعجزاً في حال الحرّم وتعاطى
الحشيش يحقّق لها طبيعتها ويضفى عليها طابعاً مثالياً^(١).

١٤ - دراسة فاروق عبد السلام (١٩٨٠) :

موضوعها: «دراسة نفسية اجتماعية لبعض المتغيرات المتعلقة بالإدمان»

أهداف البحث :

يحاول الباحث الاجابة على الأسئلة الثلاثة الآتية:

١ - ما هي العوامل الاجتماعية والنفسية المتصلة بالإدمان؟

٢ - ما المتغيرات النفسية التي قد تطرأ على المدمن عند انقطاعه عن
المخدر؟

٣ - ما المتغيرات النفسية التي قد تطرأ على المدمن من جراء تنفيذ
برنامج أولى للعلاج النفسى؟

فروض الدراسة :

١ - إن الشعور بعدم الطمأنينة الانفعالية أكثر شيوعاً عند مدمنى
المخدرات؟

٢ - إن مدمنى الأفيون ينتمون إلى مستويات ذكاء منخفضة؟

٣ - إن الأعراض السيكوباتية تشيع لدى مدمنى الأفيون أكثر من
الأعراض الذهانية أو الأعراض العصابية.

٤ - إتجاهات مدمنى المخدرات حيال المتغيرات التي يقيسها اختبار

(١) محمد رشاد سيد كفاي، ١٩٧٣، سيكولوجية اشتهاء المخدر لدى متعاطي المخدرات
- رسالة ماجستير (غير منشورة) - كلية الآداب - جامعة عين شمس.

ساكنس وهى الأسرة، الجنس، العلاقات الانسانية وتصور الذات تتسم باضطراب التوافق والسلبية.

٥ - إن اضطراب الشخصية لدى المدمنين، كما يكشفها اختبار تفهم الموضوع هى من نوع الاضطرابات عميقة الجذور.

٦ - تختلف السمات السيكلولوجية لدى المدمنين، كما يكشفها اختبار تفهم الموضوع هى من نوع الاضطرابات عميقة الجذور.

٧ - تختلف السمات النفسية لدى المدمنين المتحررين فسيولوجياً عنها عند تحررهم النفسى (معبراً عنه بالبقاء فترة ثلاثة شهور بالمصحة).

٨ - تختلف السمات النفسية لدى المدمنين الذين تعرضوا للعلاج النفسى عن هؤلاء الذين لم يتعرضوا لأي نوع من العلاج.

٩ - إن الإدمان عادة يبدأ فى المراهقة.

١٠ - إن المدمنين ينتمون إلى مستويات اجتماعية اقتصادية دنيا.

١١ - هناك علاقة طردية بين الإدمان والنشاط الجنسى.

١٢ - آثار الأفيون تختلف عند بدء الإدمان عنها عند آخر مرة تعاطى.

١٣ - الحالة المزاجية النفسية للمخدر تختلف وهو تحت تأثير المخدر عنها وهو خارج ذلك التأثير.

١٤ - إن المدمنين يصفون مجتمع المدمنين بصفات تشيع فيها السلبية، والازدراء وعدم التقدير.

عينة البحث :

تتكون عينة البحث من جميع المتقدمين طوعية للعلاج الداخلى بمصحة الامراض النفسية. بالخانكة فى الفترة من ١/٩/١٩٧٤، ٣١/٣/١٩٧٥، أي مدة ستة شهور. وقد بلغ مجموع مدمنى الأفيون الذين دخلوا المصحة فى هذه الفترة ٥١ فرداً استبعد منهم ٩ حالات لعدم صلاحيتهم للبحث، وتمت دراسة بقية الحالات وعددهم ٤١ حالة.

■ العمر الزمني للعيينة تراوح من ٣٠ - ٥٧ سنة.

■ معظم العينة كانوا متزوجين.

أدوات البحث :

١ - استمارة مقابلة لدراسة المتغيرات النفسية والاجتماعية للمدمنى الأفيون.

٢ - اختبار الشخصية المتعدد الأوجه.

٣ - استفتاء ماسلو.

٤ - اختبار تفهم الموضوع.

٥ - اختبار ساكس لتكملة الجمل.

٦ - اختبار الذكاء المصور.

٧ - جلسات المناقشة الجماعية.

نتائج البحث :

١ - افتقار المدمنين إلى الطمأنينة النفسية مما جعلهم يلجأون إلى الإدمان لمدارة هذه المشاعر المسيطرة عليهم.

٢ - مدمنى الأفيون ينتمون إلي مستويات ذكاء منخفضة.

٣ - مدمنى الأفيون ينتمون إلي مستويات إجتماعية دنيا.

٤ - وجود مشاعر حرمان واسعة لدي المدمنين فى فترة الطفولة المبكرة.

٥ - عدم حل الموقف الابدئى.

٦ - وجود مظاهر للسلوك السيكوباتى والميول العصابية.

٧ - وجود خلل فى نظام الثواب والعقاب فى مرحلة الطفولة.

٨ - تدور الصراعات حول الوصول للشباع العاجل وكذلك مشاعر

القلق.

وقد جاءت نتيجة هذه الدراسة مؤيدة لعظم الفروض التى وضعها الباحث لدراسته^(١).

- دراسة محمد رمضان محمد (١٩٨٢) :

دراسة محمد رمضان محمد للدكتوراه بعنوان « تعاطى المخدرات لدى الشباب المتعلم » (١٩٨٢).

هدف البحث :

- بالرغم من أن كل البحوث السابقة عن التعاطى والإدمان قد انتهت إلى أن هناك سمات مشتركة تميز المتعاطين فى شخصياتهم إلا أن هناك سؤال ملح هو:

■ لماذا هؤلاء الاشخاص بتلك السمات اصبحوا متعاطين رغم اشتراكهم مع غيرهم فى السمات والآخرين لما لم يصيبوا مدمنين؟

■ ولماذا أصبحوا مدمنين على عقار معين؟

■ ما الذى دفع الفتاة الجامعية لأن تصبح مدمنة حشيش وما الذى يسم بنائها النفسى؟

■ ما هى الفروق بين طلبة وطالبات الجامعة المدمنين والمدمنات فى بنائهم النفسى وديناميات الشخصية؟

■ ما هى أوجه التشابه الموجودة بين الطلبة والطالبات المدمنين والمدمنات؟

■ هل تتسم الاناث بقدر أكبر من العدوان عن الذكور؟

■ هل الإناث أكثر توافقاً من الذكور فى ممارسة أدوارهن الاجتماعية.

(١) فاروق عبد السلام، ١٩٨١، بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية المتعلقة بالإدمان - رسالة دكتوراه (غير منشورة) - كلية التربية - جامعة الأزهر.

عينة البحث :

عيتتين من الذكور والانات المدمنين والمدمات للحشيش.

خصائص عينة (الذكور) :

- أن يكون فى المرحلة الجامعية خلال السنة الأولى حتى الرابعة.
- لديه خبرة التعاطى لمدة ثلاث سنوات متواصلة.
- عدد مرات تعاطيه لا تقل عن ٤ مرات أسبوعياً.
- لديه الرغبة فى التعاون فى البحث.
- عدد أفراد عينة الذكور خمسة أفراد.
- كانوا يمثلون مستويات اقتصادية مختلفة.
- السن تراوح بين ١٩ - ٢٤ سنة.
- الحالة الاجتماعية: غير متزوجين.
- المهنة: طلاب.
- المخدر: الحشيش.
- أسلوب التعاطى: الجوزة والسيجارة.
- التخصص: (١) كلية الحقوق، (٢) من كلية الآداب، (١) واحد من تجارة الخرطوم، (١) من معهد التعاون.

عينة الإناث :

- تتمتع عينة الاناث بنفس خصائص عينة الذكور وهى:
- أن تكون فى المرحلة الجامعية خلال السنة الأولى حتى الرابعة.
- لديها خبرة التعاطى لمدة ثلاث سنوات متواصلة.
- عدد مرات تعاطيها لا تقل عن ٤ مرات أسبوعياً.

- لديها الرغبة فى التعاون فى البحث.
- عدد أفراد العينة خمسة اناث.
- الوضع الاقتصادي، يمثلون طبقات مختلفة.
- السن من ١٩ - ٢٤ سنة.
- الحالة الاجتماعية: غير متزوجات.
- المهنة: طالبات.
- أسلوب التعاطى: الجوزة، السيجارة.

كيفية اختيار العينة :

بدأ التعرف على العينة عن طريق أحد الاشخاص الذي عرفه الباحث على المبحوث الاول وشرح له الغرض من البحث وعن طريق المبحوث الأول تعرف الباحث على بقية المبحوثين.

أدوات البحث :

- المقابلة الاكلينيكية (حرة غير مقننة)،
- اختبار البيكفورد الاسقاطى المصور.
- اختبار اليد الاسقاطى.
- اختبار التوافق لهيوم بل.

نتائج الدراسة :

١ - إن الفتاة المتعلمة فى محاولة منها للتكيف مع اضطراب وجودها نجدها ترفض ضرورة الوجود على النحو الانثوي وتتمرد عليه، وتحاول أن تحيا من خلال كونها ذكراً على المستوى المتخيل.

٢ - كما وجد لديهن شجاعة ظاهرة فى طلب الجنس عن الذكور وهى شجاعة تخفى خوفاً كامناً من الضعف الانثوي.

٣ - إن المشكلة الاساسية التى يعانى منها المدمن والمدمنة هى مشكلة اضطراب الوجود مع الآخر، فيذهب إلى عالم الحشيش والمخدرات فى محاولة منهما للتكيف مع انفسهم وللحصول على المشروعية التى افتقداها فى عالمهما الواقعى.

٤ - ان علاقة الذكر بالأم هى علاقة اعتماد طفلى تماماً فالأم هى موضوع الحب والحنان والعطف والعتاء الدائم المتدفق، بينما تتسم علاقة الفتاة بأمها بالتمرد والعصيان.

٥ - يتفق كل من الذكور والاناث فى التمرد على السلطة بكافة اشكالها وإن اختلف اسلوب التمرد عند كل منهما^(١).

نقد موجز للدراسات العربية السابقة :

بعد هذا العرض للدراسات العربية التى تناولت موضوع الإدمان ترى الباحثة مايلى:

■ اقتصر هذه الدراسات على دراسة المخدر ونوعه أكثر من تركيزها على المتعاطى نفسه.

■ التركيز الأكبر على الآثار الجسمانية الناتجة من تناول المخدر وعدم تناوله ولم تركز على العوامل التى دفعت لهذا التعاطى للمخدر.

■ معظم الدراسات انصببت على دراسة الحشيش وكأنه المخدر الوحيد الموجود فى مصر على الرغم من شيوع الأفيون وغيره من المخدرات التخليقية التى زاد الإدمان عليها وانتشرت فى انحاء البلاد أكثر من انتشار الحشيش.

■ معظم الدراسات قد تمت على عينات من القاهرة وكأن القاهرة ممثلة لكل المحافظات دون مراعاة للفروق بين الأفراد الناتجة عن البيئة والمكان.

(١) محمد رمضان محمد، ١٩٨٢، تعاطي المخدرات لدى الشباب المتعلم - رسالة دكتوراه (غير منشورة) - كلية الآداب جامعة عين شمس.

■ تعتبر دراسة الباحثة هي الدراسة الأولى في المجتمع السكندري وفي الثمانينات وقد تناولت فيها عينات من جميع أقسام المدينة وقد ركزت على دراسة العوامل المؤدية إلى الإدمان، ولم تهتم بنوع المخدر المدمن لذا كانت دراستها عن الإدمان وليس على مخدر بعينه.

■ بالنسبة لدراسة سعد زغلول المغربي «تعاطي الحشيش ظاهرة نفسية اجتماعية ينطبق عليه ما سبق ذكره إلى جانب»:

١ - إن فروض هذه الدراسة كانت أشبه بالقضايا التي تعالج موضوعاً أدبياً وليس فرضاً يبحث في العلاقة بين متغيرين أو أكثر.

٢ - اقتصر الباحث في عينته على دراسة المدمنين المسجونين بالرغم من أن مجتمع السجن يمد قاطنيه بسمات سلوكية معينة وقد يساعد على ظهور ما هو كامن من سلوك العدوان والانحراف فقد ترجع معظم النتائج إلى البيئة وليس الادمان.

٣ - كانت النتائج على قدر كبير من الغموض وعدم التفسير فقد وصل الباحث في نتائجه إلى أن الأصل في الإدمان ناتج عن تركيب نفسي مرضى يحدث حالة الاستعداد، ولم يوضح لنا ماهية هذا التركيب النفسي وطبيعته، وكذلك عن أن التركيب النفسي المرضى يؤدي للإدمان. وهل كل من لديه تركيب نفسي مرضى يصبح مدمناً.

■ كذلك الحال بالنسبة لدراسة نفس الباحث د. سعد زغلول المغربي، في الدكتوراه بعنوان «سيكولوجية تعاطي المخدرات»، إلا أنه اهتم بدراسة الأفيون وحده وآثاره وما يحدثه من تغيرات، وليس ما الذي أدي إلى الإدمان.

■ بالنسبة للعينة طبق الباحث اختبارات على ١٠ أفراد وهذه عينة غير ممثلة احصائياً ولا يمكننا التعميم منها.

■ ميل الباحث إلى النزعة التطبيقية في بحثه فقصر الإدمان على

الطبقة الدنيا فقط، على الرغم من وجود الإدمان في كل الطبقات مع اختلاف في نوع المخدر المدمن وكذلك طريقة التعاطي.

■ اعتمد الباحث في اختيار عينته على الوسيط، الذي قرر وحده أن هذه العينة مدمنة ولم يتأكد الباحث من وجود الإدمان عند العينة بوسيلة أخرى.

■ لم يذكر الباحث كيفية احتفاظه بمعلومات عن تاريخ الحالة حيث أن دراسته لتاريخ الحالة كان حراً وغير مقنن.

■ اقتصرَت الدراسة على دراسة عينة المدمنين ولم تذكر المقارنة بين المدمنين وغيرهم على الرغم من كونها دراسة مقارنة.

■ ذكر الباحث في نتائجه أن الفقر وارتباط الأفيون بالتاريخ الحضاري للشعب المصري هو السبب في الإدمان، على الرغم من انتشار الأفيون ومشتقاته في أعرق وأعظم الحضارات الغربية إلا أن الباحث لم يفسر لنا كيفية انتشاره في هذه الحضارات التي لا يقوم أسلوبها الحضاري على كف العدوان وتعتبر من أغنى الحضارات.

■ بالنسبة للدراسة د. محمد رشاد كفاقي عن سيكولوجية إشتهاء المخدر:

- قسم الباحث متعاطيه إلى حالات وهي: حالة معتادة، حالة تخدير، حالة خرم، ولم تكن لديه أداة موضوعية للتعرف على كل حالة من هذه الحالات الثلاثة.

- كانت العينة صغيرة جداً للدراسة إذ إنها تكونت من ٦ حالات فقط.

- جاءت معظم النتائج خالية من التفسير والتوضيح.

■ وبالنسبة لدراسة د/ فاروق عيد السلام «دراسة بعض المتغيرات الاجتماعية والنفسية المتصلة بالإدمان»:

- انكب الباحث في الدراسة على دراسة الآثار الناجمة عن الانقطاع عن المخدر أكثر من دراسته للعوامل المؤدية للإدمان.

- قصر الإدمان على الأفيون فقط.

■ دراسة د. محمد رمضان محمد «تعاطى المخدرات لدى الشباب المتعلم».

- على الرغم من أن الرسالة تدرس التعاطى عند الشباب المتعلم إلا أن الباحث ركز على دراسة الفروق بين الذكور والإناث في الإدمان أكثر من دراسته لعملية الإدمان ذاته.

- كانت عينة البحث صغيرة إلى جانب اعتماده على الوسيط في جلب الباحثين وتأكيدهم ولم يتأكد من وجود الإدمان بطريقة أخرى.

- كانت النتيجة الأولى للبحث: رفض الفتاة المتعلمة للوجود الانثوي يجعلها تلجأ إلى الإدمان كحل تحميا خلال كونها ذكراً على المستوى المتخيل فهل أي رافض للوجود يكون مدمناً مخدرات.

- كذلك النتيجة الثانية التي عممها من دراسة الخمس حالات من الفتيات الجامعيات وهي شجاعة الفتاة الظاهرة في طلب الجنس.

- كانت معظم حالاته من أسر متفككة وبها خلل في تنشئتها الاجتماعية، ولم يرجع الباحث الإدمان لهذه الأسباب بل أرجعه إلى عوامل خاصة بتركيب نفسى فردي.

ثانياً - الدراسات الأجنبية :

وقد صنف الباحث هذه الدراسات إلى:

١ - دراسات تناولت وصف سمات المدمن النفسية.

٢ - دراسات تناولت وصف الظروف الاجتماعية للمدمن وبيئات المدمنين.

أولاً - اندراسات التى تناولت وصف نفسية المدمن وشخصيته :

وقىما يلى عرض للدراسات التى تناولت وصف سمات المدمن النفسية:

١ - دراسة ماركوفيتش ومايرز (١٩٤٤).

٢ - دراسة كوبرا وكوبرا (١٩٥٧).

٣ - دراسة بوكيه (١٩٥١).

٤ - دراسة وولف.

٥ - دراسة نايت.

٦ - دراسة بيرزن وروث وانجبلش.

٧ - دراسة اوزويل.

٨ - دراسة بول وسنار.

٩ - دراسة ايلينوود.

١٠ - دراسة ايستون.

١١ - دراسة ايفنسون.

١٢ - دراسة برنارد ورتس.

١٣ - دراسة هيكيما وجرشون.

١٤ - دراسة هل.

١٥ - دراسة هكيله وسكولر.

١٦ - دراسة لاسكوتز.

١ - دراسة ماركوفيتش ومايرز (١٩٤٤) :

وقد قاما الطبيبين الامريكيين ماركوفيتش ومايرز - Meyres and Mar-

covitz بدراسة على ٣٥ مدمن ماريجوانا فى الجيش الأمريكى وضعوا

تحت الملاحظة لمدة سبعة شهور، وكانت نتائج هذه الدراسة تلخص السمات العامة للمدمنين فيما يلي:

- كثرة التعرض للمؤاخذة والعقوبة العسكرية.
- عدم القدرة على تحمل الاحباط أو الحرمان أو النظام العسكري.
- ضعف القدرة على ضبط سلوكهم لكي يكون مقبولا اجتماعياً.
- استجابات عدوانية لمواقف الاثارة والضغط، وأحياناً يوجهون هذا العدوان إلى أنفسهم كمحاولة قطع شرايئهم أو إصابة أنفسهم بالجراح.
- معاناة القلق وعدم الاستقرار والتهيجية والاكتئاب عندما لا يتيسر لهم تعاطي المخدر، وعدم القدرة على تحمل المسئوليات العسكرية والرغبة الدائمة فى دخول المستشفى والفشل المتكرر فى القيام بأي واجب أو عمل.

■ وقد كشفت دراسة تاريخ حياتهم إنه يتسم بالسلوك الجناحى والفشل فى تكوين علاقات اجتماعية ايجابية^(١).

وقد أكدت هذه النتائج دراسات كل من فوجل^(٢) وماري نيسواندر^(٣) Marynyswander وديهل^(٤) Dihell، حيث وصفت هذه الدراسات سمات مدمنى المخدرات بالبلادة والخمول، واضطراب الادراك، والحس والشعور، وتدهور كفاءة الوظائف العقلية، وتدهور أخلاقى، وارتكاب الجرائم والانهاطية، والاكتئاب، وضعف الارادة.

(1) Marcovitz E., and Myers H., 1944, Marijuana Addicts in the Army War: Chicago.

(2) Vogel V.H., and Murer D.W., 1957, Narcotics and Science Research, Chicago: ASSO.

(3) Nyswander, M., 1960, Durg Addiction, New York: Silvano.

(4) Dihell H.S., and Laton D. A., 1954, Health and Safety for Youth, New York: Mrcrawhill.

٢ - دراسة كوبرا وكوبرا (١٩٥٧) : Copera and Copera

وقد صنف كوبرا وكوبرا المتعاطين للمخدرات في الهند على ضوء ملاحظتهما إلى مجموعتين:

الأولى: وهي الغالبية، ويتسم أفرادها بالبرودة Phlegmatic والغباء، أو الضعف العقلي، وعدم الكفاءة، وعدم القدرة على مواجهة مشقات الحياة وعدم الثقة بأنفسهم.

الثانية: وهؤلاء يكونون جزءاً صغيراً من المتعاطين ويتسمون بسرعة التهيج والمشاغبة والاضطراب للهموم أو المتاعب البسيطة التي يتجاهلها العاديون^(١).

٣ - دراسة بوكيه (١٩٥١) : Pouquet

وقد وصف بوكيه Pouquet، المدمن، بأن رغبته للعمل تقل، ويصبح غير مكترث بكل شيء، متدهور أخلاقياً، ويصاب بحالة من العنة تنتهي بانحراف جنسى، ويعانى من ضعف ومقطعات الذاكرة، وعدم الترابط والاتساق فى احاديثهم، والاصابة بحالة الاختلاط العقلى Mental Con- fusion والتي تظهر فى عرضين واضحين هما: السبات أو الكسل العقلى، والاحلام المستمرة^(٢).

٤ - دراسة وولف (١٩٤٨) : Woolf

ويرى وولف Woolf إن مدمن المخدرات، متردداً، وسطحياً وغير موثوق به وذوي اتجاهات خسنة فى معاملاته المختلفة، ويظهر الاهمال واضحاً

(1) Copera I.C., an Copera I.N., 1955, The Use of the Cannabis Durg India. Bulletin on Narcotics, Vol. L, New York: Geneva.

(2) Pouquet, R. J., 1951, Cannabis, New York: Bulletin on Narcotics. (Vol. II).

فى سلوكه وأفعاله، ويظهر لديه انهباط فى جميع الوظائف العقلية، وتأخر عقلى ملحوظ وكذلك تدهور جسمى، وضعف فى قيمه الاخلاقية^(١).

٥ - دراسة نايت (١٩٧٠) : Knight

وقد أكد نايت Knight فى بحثه أن الكحوليين تختلف شخصياتهم عن مدمنى المخدرات، فالكحوليين أقوىاء قادرون جسمانياً وجنسياً بينما مدمنو المخدرات، خاضعون وغير قادرين، وإيده بندر Bender فى بحثه عن القبائل الهندية الأمريكية ووجد أن مدمن المخدرات يتسم بالعزلة والوحدة ولا ينتمى لأي قبيلة أو وحدة اجتماعية ومعظم مدمنى المخدرات متمردون على السلطة المقبولة كأبائهم وكنيستهم، وهذه العزلة هى التى تقودهم إلى عالم الإدمان^(٢).

٦ - دراسة بيرزين وروث والمجلش (١٩٧٤) :

Berzin, Ross & English

وفى الدراسة التى قام بها بيرزين وروث والمجلش (١٩٧٤)، Berzin, Ross, English et al وآخرون على مجموعة من مدمنى المخدرات، فقد لاحظ الباحثون أن حوالى ٦٠٪ من عينة بحثهم من المدمنين يعانون من المزيج من المشكلات الانفعالية.

وقد تمكن الباحثون من التمييز بين فئتين أساسين فى أن الإدمان فى الـ ٤٠٪ من العينة المتبقية، مجموعة من المدمنين ظهرت تعانى من اكتئاب واضح، فقد كانوا قلقين مكتئبين، يعانون من الاشمئزاز من أنفسهم لكونهم مدمنين، بينما المجموعة الثانية كانت مختلفة فكانت

(1) Woolf, P. O., 1948. Marijuana In Latin America. Washington: Lincor Press.

(2) Knight, E., and Beonbrun, M.H., 1973, Psychiatric Assessment of 30 Chronic Users of Cannabis and 30 Matched Control. New York: Amer. J. Psychiat.

أكثر تكيفاً، وكانوا يبدون هادئين متكيفين راضين عن أنفسهم، وخاليين من أي اضطرابات انفعالية أو عاطفية واضحة^(١).

٧ - دراسة أوزيل (١٩٦١) : Ausubel

وقد بين أوزيل Ausubel من مراجعته لمجموعة من البحوث عن الإدمان، إن الاعتماد الجسمي على المخدر ليس إلا ذريعة للاستمرار في الإدمان ~~لأنه~~ منه استمراراً وظيفياً للشخصية غير الناضجة^(٢).

٨ - دراسة بول وسنار (١٩٦٩) : Ball and Snnar

وقد وضع بول وسنار Ball and Snnar من دراستهما لـ ١٠٨ مدمن مستشفى كلسنجتون مستخدمين المقابلة وتقارير المستشفى والشرطة أن هناك فئتين من المدمنين:

■ النمط الأول أولئك الذين يعملون في أعمال إجرامية أو أعمال غير منتجة.

■ النمط الثاني وهم الذين يكون العقار لديهم هو مركز حياتهم واهتماماتهم^(٣).

٩ - دراسة إيلينود (١٩٦٠) : Elinwood

وقد وجد إيلينود Elinwood من دراسته على عينة عشوائية قوامها ٣٠ مدمنة ومقارنتها بعينة من الذكور مستخدماً أسلوب المقارنة فوجد أن الأم من وجهة نظر المدمنات زائدة الحماية ومنعزلة وتسلبية، بينما تتصف

(1) Kazdine E. A., Bellack A. S., and Micheal Hersen, 1980, New Prespective in Abnormal Psychology, New York; University Press.

(2) Ausubel; D.P., 1961, Causes and Types of Narcotics Addiction A Psychological View, New York, Psychiat (9).

(3) Baul, J. C., and Snar R.W., 1969, A Test of Maturation Hypothesis Report to Opiate Addiction, New York; Bulletin on Narcotics, Geneva.

عند الذكور بالاستكانة، كما أن الأب من وجهة نظر المدمنات قابل للغواية والاستكانة، بينما يتصف عند الذكور بأنه غير عطوف ويميل إلى استخدام العنف دائماً، وقد انتشرت الأعراض الذهانية عند الاناث بينما شاع الانحراف السيكوباتي عند الذكور^(١).

١٠ - دراسة ايستون (١٩٦٥) : Easton

وقد وجد ايستون Easton إن المدمنين يعانون من اضطرابات خطيرة في الشخصية بالإضافة إلى نوبات اكتئابية مع مشاعر الملل وتشيع بينهم الانحرافات السيكوباتية، مع سلوك نكوص وعدم كفاية في التحكم في الحفزات وصورة الأب لديهم غير كاملة مع وجود علاقة مرضية بالأب وذلك في دراسته لـ ٢١ مدمن مخدرات مستخدماً أسلوب الفحص الاكلينيكي^(٢).

١١ - دراسة ايغنسون (١٩٦٤) : Evenson

وفي الدراسة التي أجراها ايغنسون Evenson على ثلاثين مدمنة مسجونة وعينة أخرى ضابطة قوامها أيضاً ثلاثون مسجونة غير مدمنة تم اختيارهن عشوائياً وطبق عليهن مجموعة من الاختبارات تشمل: اختبار الشخصية متعدد الأوجه واختبار الرورشاخ، واختبار بيتا للذكاء المعدل، واختبار تايلور للقلق وقائمة مودزلي للشخصية وبعد ضبط متغيرات الذكاء والجنس أثبتت الدراسة أن المسجونات المدمنات أكثر عدوانية وأقل توافقاً من المسجونات غير المدمنات^(٣).

(1) Ellinwood E. H., Smith W.G., and Vaillant G.E., 1960, Narcotics Addiction in Males and Females, New York: A Comparison International Journal of Addiction (1).

(2) Easton, 1965, Clinical Study on the Pathogenic and Personality Structure of Male Narcotics Addiction, New York: Hill Sid Hospital: Geneva.

(3) Evenson, M., 1964, Research With Female Drug Addicts at Prison for Woman, Attawa: Journal of Correction (6).

١٢ - دراسة برنارد (١٩٦٧) : Bernard and Ritchi :

ويري برنارد وريتشي Bernard & Ritchi أن المدمن ذو خلق اعتمادي طفلي أساساً وأن صراعاته متمركزة في المرحلة المبكرة من حياته والتي دائماً ما تكون هذه الصراعات عند مرحلة ما قبل اللغة^(١).

١٣ - دراسة هيكيमान وجرشون (١٩٦٥) :

Hekimian and Gershon

وفي الدراسة التي قام بها هيكيमान وجرشون Hekimian & Gershon على مجموعة من مدمني المخدرات المختلفة قوامها ١١٢ مدمناً تبين لهما أن مدمني المخدرات عادة ما يكونون ذوي شخصية سيكوباتية وأنهم مضطربون انفعالياً والرغبة في السعادة تنبع عندهم من الاكتئاب الكامن الذي يعد من وجهة نظرهم السبب الرئيسي في الإدمان^(٢).

١٤ - دراسة هل (١٩٦٨) : Hill :

وفي الدراسة التي قام بها هل Hill مستخدماً اختبار الشخصية المتعدد الأوجه على ٢٧٠ مدمن مخدرات، وجد أنهم قد حصلوا جميعاً على درجات عالية في مقياس السيكوباتية^(٣).

١٥ - دراسة هكيلا وسكولر (١٩٦٩) : Hkilla & Schoolar :

ومن نتائج الدراسة التتبعية التي قام بها كل من ادنيان هكيلا وسكولر Hkilla and Schoolar على ٤١ مدمن مخدرات وجد أن هؤلاء

(1) Bernard, G. W. and Ritch, L. (1968), Psychodynamics of Narcotics Addiction, New York; Jacksonwill.

(2) Hekimian L.J. and Grashon, 1966, Characterestios of Drug Abusers Admitted to a Psychiatric Hospital, Chicago, I.A.M.M. P.1966.

(3) Hill, Haertzen and Glasser, 1972, Psychological Aspects in Drug Addiction, In: David L. Sills (ed) International Encyclopedia of The Social Sciences, (Vol 3 and 4) New York: The Free Press.

المدمنين يأتون من طبقات اجتماعية عليا غير مستقرة أو من طبقات دنيا أو وسطى^(١).

١٦ - دراسة لاسكوتز (١٩٦٤) : Laskowitz

ويري لاسكوتز Laskowitz من خبراته في مجال الإدمان إن المراهق من مدمنى المخدرات ذو شخصية انعزالية اجتماعياً، كما إنه يعاني من مشاعر عنيفة من عدم الاتساق والنقص في الشجاعة والرغبة في الحماية والتدليل، وعادة ما تكون اتصالاته الاجتماعية مقصورة على رفاقه من المدمنين أمثاله، وتكون اتصالاته الجنسية مضطربة، ويتصف بالبلادة في عمله والخوف من الفشل وعدم القدرة على تأجيل الاشباع العاجل^(٢).

ثانياً - دراسات تناولت السمات الاجتماعية للمدمنين:

١ - دراسة تلتنبرج.

٢ - دراسة راثود.

٣ - بعض دراسات تاريخ الحالة.

٤ - دراسة تورد.

٥ - دراسة ونك.

٦ - دراسة جن سميث.

٧ - دراسة هيرت هندن.

٨ - دراسة أرفنج لوكوف.

(1) Hikilla I., and Schoolar, J.C., 1969: Heroin Use Among Multiple Drug Users-Its Diagnostic and Therapeutic Significance. New York: International Conference on Drug Abuse-Geneva.

(2) Jon S.L. and Laskowitz D., 1964, Rorschach Study of Adolescent Addicts Who Die of Over Dose A Sign Approach-Psychiatry Digest, Math Field.

٩ - دراسة سمير نعيم أحمد.

١٠ - دراسة هوبا وجنرد.

١١ - دراسة هربرت هندن.

١٢ - دراسة ازادور تشاين.

١ - دراسة تنكلينبرج (١٩٧١) : Tinklenberg

وجد تنكلينبرج فى دراسته خمسين فرداً من مدمنى المخدرات طبق عليهم قائمة ايزنك، والمقابلة الاكلينيكية، واستفتاء للقلق، ومصفوفة رامن، إن مدمن المخدرات يتسم باضطرابات شخصية وعدم التضج، والسلبية فى معالجة القلق، ووجد لديهم انحرافات جنسية كبيرة، كما إنهم ذو ذكاء متوسط، ولديهم درجات عالية من القلق والعصابية، وأن أسرهم جميعاً من الطبقة العاملة.^(١)

٢ - دراسة راثود (١٩٦٩) : Rathod

وفى الدراسة التى قام بها راثود Rathod تبين له أن نسبة كبيرة من المدمنين لهم وضع خاص فى الأسرة، كأن يكون الطفل الوحيد من نفس الجنس، كما أنهم أتوا من أسر ليس بها آباء أو بها آباء غير متوافقين، ومطلقين أو مرضى عقليين أو سكيرين.^(٢)

٣ - بعض دراسات لتاريخ حالة المدمن (١٩٥١) :

وكذلك الدراسات التى أقيمت فى سنة ١٩٥١، ١٩٥٢ على أكثر من مائة شاب من الذين أدمنوا المخدرات الموجودين فى إحدى مستشفيات

(1) Tinkleenberg I.R., Kappell, S., and Hallister, L.E., 1972, Marijuana and Alcohol; New York: Arch. Gen Psychiatrie.

(2) Rathod H.N., 1970, Early Experience in the Life of a Narcotics User, In: Tongue A. et al (eds), Papers Presented to the International Institute on Prevention and Treatment of Drug Dependence : Clausanne.

الصحة العامة بالولايات المتحدة، وقد درس ١٠ من هؤلاء المائة دراسة مكثفة وتعتبر هذه العينة ممثلة لعينة المدمنين، وشملت هذه العينة كل أنواع الإدمان فشملت الفئات التي أدمنت لمجرد عدة شهور بسيطة إلى هؤلاء الذين أدمنوا لسنوات طويلة، وبالنسبة لظروف العينة التعليمية فقد كان معظمهم يعانون من مشكلات دراسية بدأت في المرحلة الإعدادية واثرت على استمرارهم في التعليم الأكاديمي، وقد قررت هذه العينة إنهم أدمنوا المخدرات أثناء فترة تجنيدهم في الجيش، وقد وضحوا أن السبب في وصولهم للإدمان هو سهولة الحصول على المخدر حيث أنهم كانوا يسرقونه من حقائب الاسعافات الأولية، وكانت طريقة التعاطي عن طريق الاستنشاق حيث أنهم كانوا يدمنون الهيرويين ثم بعد ذلك بحقنه، وبعد ذلك كانوا يحقنون بخليط من الهيرويين والكوكايين. وكانت أداة البحث عبارة عن استمارة لقياس الإدمان ودراسة تاريخ الحالة.

نتائج الدراسة :

- إن السبب في التعاطي هو وجود الشخص مع زميل له مدمن.
- سهولة الحصول على المخبر.
- الرغبة في تجريب المخدر^(١).

٤ - دراسة توردا : Torda

وقد بين توردا Torda من دراسته التي قام بها على ٣٠ مدمن هيرويين وثلاثين آخرين من غير المدمنين، وطبق عليهم اختبارات الشخصية البيولوجية، واختبار التقييم لروث، وقد انتهت من دراسته إلى أن: مدمني المخدرات نتاج لأسر قتل الأم فيها السلطة في المنزل، كما أنها

(1) Nitezl M. T., Awinett R., Marian L., Macdonald and Wilfams S., Davidon 1977, Behavioural Approaches to Community Psychology, New York, Pergaman Press INC.

ذات شخصية معاقبة سواء على النشاط أم التعبير الذاتي وتأكيد الذات وذلك عن طريق انكار الحاجة للانحياز، وعدم الموافقة الظاهرة لاحتياجات الأبناء، كما أن فكرة المدمن عن نفسه إنه مجرد انسان حقير لا حاجة إليه، وغير مرغوب فيه^(١).

٥ - دراسة ونك (١٩٧٣) : Winick

وقد بين ونك Winick في دراسته التي أجراها على ٩٨ من الأطباء المدمنين أن العمل الزائد والآلام الفسيولوجية، ومفهوم الذات، والزوجات، ومستوى الطموح، ومشاعر الانتشاء والاكتئاب وتعاطى الخمر، والأرق، والسن، من العوامل المرتبطة بالإدمان لديهم^(٢).

٦ - دراسة جن سميث (١٩٧٩) : Gen Smith

ويتحدث جن سميث Gen Smith في بحثه بعنوان «الوعي بتأثير استخدام المخدرات» Perceived effects of substances use فأكد أن الاعتماد على المخدرات إنما يختلف من فرد لآخر، فبعض الأفراد يبدأون في التعاطى منذ الطفولة، والبعض الآخر يبدأ في مرحلة متأخرة عن ذلك، والبعض يتفادي التعاطى على الإطلاق، ولكنه يؤكد أن انتشار التعاطى يسود في فترة المراهقة والشباب، وتشير نتائجه إلى أن الشباب الذي لم يتعاطى المخدرات حتى الآن، من المحتمل أن يستخدموا الماريجوانا أو المخدرات الأخرى خلال فترة شبابهم وأنهم أميل إلى أن يكونوا أكثر قرداً وتهوراً وانفعالاً وأكثر حزناً وأقل تمثلاً للقيم الاجتماعية، وأقل تديناً وقبولاً من الآخرين، أي أنه يؤكد على أن الانتشار الأكثر للمخدرات إنما يكون في سن المراهقة والشباب^(٣).

(1) Lindsmith A.R., 1980, Basic Problem in the Social of Addiction and Theory, New York : W.H.O.

(2) Winick C., 1980, A Theory of Drug Dependence Based on Role. New York : Department of Health and Human Services.

(3) Smith M., 1980; Perceived Effects of Substances Use-A General Theory, New York : Departmen of Health and Human Services.

٧ - دراسة هيربرت هندن (١٩٨٠) : Herbert Henden

ويتحدث هيربرت هندن Herbert Henden فى بحثه عن «النظرية النفسية الاجتماعية لتعاطى المخدرات، الاتجاه النفسى الدينامى» Psychosocial Theory of drug Abuse, A Psycodynamic Approach إنه من خلال دراسته لمجموعة من طلاب الدراسات العليا المدمنين للمخدرات أتضح له أن الصراعات التى يعايشها هؤلاء الطلاب إنما هى صراعات تدور حول المنافسة والنجاح والفشل فى الحياة وأن الأساليب التى تورط فيها هؤلاء الطلبة والتى تشمل تعاطى المخدرات أو القتل أو العدوان والتعصب الاعمى قد وقعوا فيها بسبب: إنهم يمتنون أن يكونوا أحراراً من هذا الألم المؤلم أى أن الواقع المحيط المعاش الملىء بالصراعات والمنافسة والفشل هو الدافع لإدمانهم^(١).

٨ - دراسة أرفنج لوكوف : Arving F. Loukoff

وفى الدراسة التى قام بها أرفنج لوكوف Arving F. Loukoff حول النظرية الاجتماعية لاستخدام المخدرات، وجد أنه لا يوجد فقط قطاعات كبيرة من الناس يستخدمون المخدرات، بل يوجد اختبارات ملحوظة لاستخدام المخدرات، فعلى سبيل المثال بينما تدمن الطبقات الاجتماعية المتوسطة Middle - Class على عقار الـ LSD والحشيش تجد أن الهيرويين منتشر بين مجتمعات الجيتو (المجتمعات المعزولة Chetto Communities) لأنه أرخص من الماريجوانا، إذ أن نماذج وطرق استخدام المخدرات بصفة عامة إنما هو اختيار مقصود يتحدد بطبيعة الطبقات الاجتماعية، وبالعرف أحياناً أى إنه ليس اختياراً عشوائياً، بل هو اختيار مقصود من جانب الطبقة الاجتماعية التى تستخدم عقاراً أو مخدرًا معيناً بالذات^(٢).

(1) Henden H., 1980, Psychological Theory of Drug Abuse. A research Monography No. (25) New York, NID.

(2) Lukoff L., 1980, Toward A Psychology of Drug Abuse. New York : Department of Health and Human Scivices.

٩ - دراسة سمير نعيم أحمد : Samir Naeim Ahmed

وتدل معظم الدراسات العالمية على أن تعاطي المخدرات ينتشر بين من يقل عمرهم عن الأربعين عاماً، ولكن نتائج البحوث تتفاوت فى مدى انتشار التعاطي بين فئات العمر المختلفة قبل سن الأربعين، وفى الولايات المتحدة الأمريكية تدل الدراسات على أن تعاطي المخدرات يزداد انتشاراً بين صغار السن، فقد كانت نسبة الذين تقل سنهم عن ٢٥ سنة بين متعاطي المخدرات تقدر بحوالى ٥٠ ٪، وقد وجد أن نسبة كبيرة من المتعاطين للمخدرات بمدينة اوكلاند بولاية كاليفورنيا خلال سنة ١٩٦٤-١٩٦٧ من الأحداث الذين تقل سنهم عن ٢٠ سنة وإن نسبة هؤلاء الأحداث المتعاطين للمخدرات فى تزايد مستمر خطير، بل ويمتد الإدمان ليشمل الأطفال الصغار الذين يتعاطون الحشيش ويستشقون الغازات المخدرة^(١).

١٠ - دراسة هوبا وواجنرد وبتلر (١٩٧٩) :

Hoba, Wingard & Bentler

وقد توصل كل من هوبا وواجنرد وبتلر Hoba, wingard & Bentler فى بحثهم عن تعاطي المخدرات أن بداية سن التعاطي هو سن الشباب، والتعاطي يحدث فى هذه السن نتيجة للضغط الاجتماعى على ذات الانسان أولاً، ذلك النظام الاجتماعى والضغط الاجتماعى الذي يلعب دوراً هاماً فى تحريك الأفراد للإدمان من خلال اللوائح والقوانين والقيم التى يضعها المجتمع، وقد توصل هؤلاء الباحثون أيضاً إلى أن نظام الشخصية يلعب دوراً هاماً فى الإدمان ومن أهم هذه الأبعاد التى تلعب دوراً هاماً فى الإدمان: أبعاد الانسباط Extrouertion، والقيادة Leader-ship، الاستقلال Autonomy الحاجة إلى التمرد Need of Reblitiousness

(١) سمير نعيم أحمد، ١٩٧١، خطر تعاطي المخدرات القائم فى المنطقة العربية. القاهرة: المكتب الدولي العربى لشئون المخدرات.

فكل هذه الحاجات تؤدي إلى الإدمان ويبدو وهذا واضحاً عندما تحرم العادات أو المجتمع تعاطى المخدرات^(١).

١١ - دراسة هربرت هندن (١٩٨٠) : Herbert Henden

ويؤكد البحث الذي قام به هربرت هندن Herbert Henden أن جميع متعاطى الماريجوانا يعانون من اضطرابات عائلية في المنزل، وفي معظم الحالات تكون مشاكلهم مشابهة لتلك المشاكل التي يعاني منها معظم الشباب، إلا أنهم يحاولون أن يحددوا أسساً جديدة للتعامل مع والديهم. وإن اتجاهات هؤلاء الشباب تميل دائماً إلى تدمير العلاقات مع الوالدين، فكل شاب من هؤلاء الشباب يبدو أنه يرفض الانصياع إلى أوامر والده ويريد أن يحصل على النشوة والسعادة.

ويري هندن أن العمل الاساسى الذي قام به أوسكار لويز عام ١٩٦٦ يوضح لنا أثر الفقر على الإدمان وقد تراوحت المتغيرات الاجتماعية فى الإدمان بين النشاط الجنسى، والمزاملة، والصداقة، وهناك دراسات أخرى اجتماعية اقتصادية تفسر الإدمان على إنه نتيجة لعدة عوامل منها: الفقر، الجنس، الصراع الطبقي، المنافسة، ويقول هربرت هندن فى ذلك «إن عوامل الفقر والجنس والعنصرية والحتمية الاقتصادية هى الأسباب التى تؤدي إلى الإدمان، فهو يرى أن الإدمان ما هو إلا عملية تكيفية مع الواقع الاجتماعى الاقتصادى»^(٢).

١٢ - دراسة ازدور تشاين (١٩٥٦) : Isoder Chein

وهناك البحث الذي قام به ازدور تشاين (١٩٥٦) Isoder Chein وكان

(1) Huba, Wingar and Benter, 1979, Framework for an Interactive Theory of Drug Abuse. New York : NIDA. Amonography No.(24).

(2) Herbert, A., and Richard, 1981, A Dolscent Marijuana Abusers and Their Families, New York : National Institute of Drug Abuse.

هدف البحث تحديد الأحياء التي ينتشر فيها تعاطى المخدرات، وقد أعد الباحث قوائم بأسماء مدمنى المخدرات الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ . ٢١ سنة الذين تعرفهم الجهات الرسمية.

ويصف الباحث نتائج هذه الدراسة بقوله « أتضح من هذه الدراسة أن المناطق السكنية التي يتركز فيها تعاطى المخدرات هى أكثر مناطق المدينة حرماناً وازدهاراً وفقراً، وحتى داخل هذه المناطق السيئة وجد أن المخدرات تكون أكثر انتشاراً فى تلك الأجزاء منها التى يكون الدخل فيها شديد الانخفاض، والمستوي التعليمى منخفض جداً، ويسود فيها التفكك الأسري، وتؤكد هذه الدراسة على أن الحرمان الاقتصادي للأسرة والبطالة وانخفاض المستوي التعليمى والسكن السيء المزيج من أهم أسباب إدمان المخدرات. (١)

(1) Chein I., 1956, Narcotics use Among Juvenils, Social Work (Vol No. 1).

الفصل الرابع

العوامل النفسية والاجتماعية المؤدية لإدمان المخدرات

وآثارها على السلوك

دراسة ميدانية نفسية

■ أهمية البحث

■ تحديد مشكلة البحث

■ حدود الدراسة

■ متغيرات البحث

■ منهج البحث

■ أدوات البحث

■ عينة البحث

أهمية البحث :

إن مشكلة تعاطى المخدرات وإدمانها من أكثر المشكلات الاجتماعية خطورة وتأثيراً على تقدم مجتمعنا ورقية كماً وكيفاً. وتستنفذ هذه المشكلة معظم طاقات الفرد والمجتمع وامكانياتهما. والبحث الحالي يهدف إلى ما يلي:

- دراسة لبيئة المدمن الاجتماعية والتعرف على ما يعترها من قصور اجتماعي وما يتعرض له المدمن من ضغوط اجتماعية تدفعه الى تعاطى المخدرات ومن ثم إدمانها.

٢ - التعرف على السمات الشخصية المميزة للمدمن المخدرات.

٣ - التعرف على آثار الإدمان للمخدرات على شخصية الفرد وقواه العقلية وسلوكه.

٤ - التعرف على السن التي تبدأ عادة فيها عملية الإدمان.

٥ - التعرف على أكثر المخدرات إدماناً في المجتمع المصري.

٦ - اشباع الحاجة الملحة لمجتمعنا السكندري بصفة خاصة والمصري بصفة عامة لدراسات وبحوث توضح هذه العملية من الناحية النفسية والاجتماعية.

٧ - توجيه النظر الى أكثر أحياء الإسكندرية اشتهاراً بإدمان المخدرات والاتجار فيها.

تحديد مشكلة البحث :

تح إن الباحثة في هذا البحث بصدد تناول مشكلة الإدمان من النواحي النفسية والاجتماعية الدافعة والمؤدية الى انتشار هذه المشكلة، ولم تركز على دراسة مخدر بعينه أو آثاره وإنما ركزت على أهم عنصر مؤثر في هذه المشكلة ألا وهو المدمن نفسه. فركزت على دراسة السمات الشخصية

للمدمن والتفسيرات النفسية لعملية الإدمان، وكذلك سمات بيئة المدمن الاجتماعية وظروفة وكل ما دفعه إلى تعاطي المخدر، فالباحثة هنا تحدد المشكلة في المدمن نفسه وبصورة أكثر وضوحاً سمات المدمن الشخصية والعقلية والظروف الاجتماعية المحيطة به وما أدى إليه الإدمان من تدهور في سلوك الفرد

حدود الدراسة :

تحد هذه الدراسة بالعينة المستخدمة في هذا البحث، وهي من مدمنى المخدرات. وعينة أخرى تقابلها من حيث السن والجنس والمستوى الاجتماعي من غير المدمنين. كما تحد بالقدرات والسمات التي تقاس بالمقاييس المستخدمة في البحث. وكذلك تحد بالمنهج المستخدم في هذا البحث وهو منهج احصائي وصفي لبيان دلالة الفروق وتفسير النتائج.

متغيرات البحث :

■ العصبية :

- توهم المرض.

- الاكتئاب.

- الهستيريا.

■ السيكيوباتية.

■ مستوى الطموح.

■ الذكاء.

■ المستوى الاجتماعي/الاقتصادي.

■ القدرات الابتكارية:

- الأصالة.

- المرونة التلقائية.

- الاستعمالات.

■ الإدمان.

■ المادة المخدرة.

■ السلوك.

■ العصابية : Neurosis

العصاب اضطراب انفعالي يسبب تصدعاً وصراعاً في العلاقات الشخصية وأهم سماته القلق.^(١)

والعصاب اضطراب وظيفي في الشخصية يبدو في صورة أعراض نفسية وجسمية مختلفة منها : القلق والوساوس والافكار المستلطة والمخاوف الشاذة والتردد المفرط والشكوك التي لا أساس لها وأفعال قسرية يجبر المريض نفسه مضطراً إلى أدائها بالرغم من إرادته^(٢) والمرض النفسي هو محاولة شاذة لحل أزمة نفسية مستعصية. إن العصابي لا تكفيه الحيل الدفاعية المعتدلة في خفض ما لديه من قلق، لذا يلجأ إلى الإسراف فيها طمعاً في استعادة توازنه، وليست هذه الحيل المشتطة إلا أعراض المرض، ومن الأمراض النفسية الهستريا Hysteria، عصاب القلق Anxiety وعصاب الوسواس وغيرها^(٣).

والعصابية مجموعة أعراض نفسية تصحبها أحياناً مظاهر جسمية شاذة ناشئة عن عوامل نفسية كالانفعالات المكبوتة والصدمات والصراع بين الدوافع المتناقضة. والمظاهر الجسمية الشاذة في الهستريا تؤثر على الحالة النفسية وتكون غير ناتجة عن إصابة عضوية، فتعرف بالأعراض

(١) عهد النعم الحفني، ١٩٧٨، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، القاهرة: مكتبة مدهولي، ص ٨٢.

(٢) أحمد عزت راجع، ١٩٧٥، أنفول علم النفس، القاهرة: المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر، ص ٤٧٤.

(٣) أحمد عزت راجع، ١٩٦٥، الأمراض النفسية والاجتماعية، أساليبها. علاجها وأثارها الاجتماعية، القاهرة: دار المعارف، ص ٦٩.

الوظيفية. ومن أهم الأعراض العصابية، المخاوف المرضية والحصر النفسي والأفكار الثابتة والشك المرضى والحصار (الاندفعات القهرية والافكار المتسلطة)^(١)، ويعد العصاب أيضاً اضطراباً انفعالياً ناتجاً عن حلول غير متسقة للصراعات النفسية اللاشعورية الداخلية، ويتفق معظم المحللين النفسيين مع فرويد في أن العصاب نتاج للتثبيت على النكوص إلى مرحلة من مراحل الجنسية الطفلية، وتحدد درجة المرض بدرجة تبكير التثبيت أو عمق النكوص. فالصراعات المسببة للعصاب كما صاغها فرويد في صورة قوى جنسية شبقية تقابل القوى الخاصة بحفظ الذات - pre-Self servative ومن الناحية البنائية فإن الصراع العصابي يمكن النظر إليه من خلال كفاح الهرم والأنا والأنا الأعلى للاشباع اللاشعوري، وتظهر الأعراض عند العصبيين عند محاولة الأنا كبت الرغبات الغريزية، إذ يحدث أن يكون الأنا ضعيفاً وأن هذه القوى ملحة بحيث تحتفظ بطاقاتها الدافعة إلى الشعور وينتج القلق من هذا التهديد المستمر للرغبات المكبوتة، كما لو كان إشارة ليحاول العصابي أن يخفي طاقة الدوافع اللاشعورية في صورة أعراض عصابية تعمل نوعاً من المعالجة فهي ترضى كلا من الرغبات المكبوتة والاجهزة الكابتة ويحدث تفريغ جزئي لهذه الرغبات المكبوتة.

ويطلق كل من «روش وزمباردو» Ruch and Zimbardo على العصاب فقدان المرح في الحياة، فالعصابي يشعر بالتهديد المستمر في حياته وأنه غير كف، وقد يصل به الأمر في النهاية إلى غط أو أكثر من الانمط العصابية.

ويرى «كولمان» Colman أن العصاب يتميز بخمس عمليات أساسية قد توجد كلها أو بعضها لدى العصابي وهي:

(أ) تنقاب الفرد مشاعر الدونية وعدم الاتساق الى درجة قد تدفعه

(١) منير وهيبه، ١٩٦٠، معجم مصطلحات علم النفس، بيروت: دار النشر للجامعيين.

إلى تقييم مشاكله اليومية على أنها مهددة له أو إلى زيادة في إبقاء مشاعر القلق لديه.

(ب) تحاشي المواقف الضاغطة.

(ج) يظهر الفرد نقصاً مستمراً في الاستبصار بسلوكه الانهزامي مصحوب بجمود عقلي، بحيث يفشل في ادراك الواقع أو التعامل معه بطرق أخرى.

(د) تركز العصابي حول ذاته وصعوبة تكوين علاقات مع الآخرين.

(هـ) تولد مشاعر الاحساس بالذنب لدى العصابي.

وقد حدد كولمان Colman أنواع العصاب على النحو التالي:

١ - القلق.

٢ - المخاوف الشاذة.

٣ - الهستريا وتحتوى على نمطين:

- نمط تحولى.

- نمط غير ترابطى^(١).

وترى الباحثة أن العصابية هي اضطرابات تنتاب الفرد وتتميز بالدونية وعدم الاتساق والقلق والسلوك الانهزامي وتجنب المواقف الصعبة أو الضاغطة والتمركز حول الذات وشدة الاحساس بالذنب وعدم المرح والانقباض.

وقد استخدمت الباحثة اختبار الشخصية المتعدد الأوجه لقياس العصابية متمثلاً في مقاييسه الثلاثة الخاصة بثلاث العصابية وهي: توهم المرض، الهستريا، الاكتئاب^(٢).

(١) فاروق عبد السلام، ١٩٨١، بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية المتعلقة بالإدمان - رسالة دكتوراه (غير منشورة) - كلية التربية - جامعة الأزهر. ص ١٠٤.

(٢) لويس كامل مليكة، محمد عماد الدين اسماعيل، عطية محمود هنا، ١٩٧٤، تعليمات الشخصية المتعدد الأوجه: القاهرة: النهضة المصرية. ص ٤٧.

تعريف الاعضية المقاسة :

١ - توهم المرض : Hypochondria, Hypochondriasis

وهو اهتمام الفرد المفرط والمتواصل بحالته الجسمية أو صحته الانفعالية، ويصحب ذلك شكوى من آلام جسمية متعددة دون وجود دليل عضوى واضح^(١) وقد أخذت الباحثة فى تعريفها الإجرائى لتوهم المرض بالتعريف الذى وضع فى المقياس المستخدم فى الدراسة (مقياس توهم المرض من اختبار الشخصية المتعدد الأوجه). وقد عرف هذا المقياس توهم المرض بأنه الاهتمام الزائد بالوظائف الجسمية والقلق - الذى لا يستند الى سبب - على الصحة فيشكو الفرد غالباً من آلام واضطراب يصعب تبينها، ولا يوجد لها أساس عضوى واضح، ومن خصائص المتوهم للمرض أن يكون ناقص النضج فى معالجته لمشكلات الراشدين ولا يستجيب لها بالاستبصار الكافى^(٢).

٢ - الاكتئاب : Depression

وهو حزن أو كآبة مرضية، وهمة مثبطة، ومزاج سوداوى. ويختلف هذا المرض عن الحزن العادى الذى يتميز بالواقعية وتناسبه مع قيمة ما فقده الشخص^(٣). ومن سمات الاكتئاب صعوبة فى التفكير وضيق يصيب النفس، وكساد فى القوى الحيوية والحركية وهبوط فى النشاط الوظيفى، وقد يكون له أعراض أخرى كتوهم المرض، وأوهام اتهام الذات، وتوهم الاضطهاد والهلوسة والاستشارة ومن أخطر سماته الميل للانتحار^(٤).

(١) محمد حلمي المليجي، ١٩٨٤، سيكولوجية الابتكار، الإسكندرية: دار المعارف، ص ٢٣٨.

(٢) لويس كامل مليكة، محمد عماد الدين أسناجيل، عطية محمود هنا، ١٩٥٩،

الشخصية وقياسها. القاهرة: النهضة المصرية، ص ١٥٢.

(٣) محمد حلمي المليجي، ١٩٨٤، علم النفس المعاصر. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

ص ١٥٣.

(٤) عبد الشعم الحفنى، ١٩٧٨، موسوعة علم النفس والتحليل النفسى. القاهرة: مكتبة

ميدولي، ص ٢٠٦.

وقد أخذت الباحثة فى تعريفها الإجرائي للاكتئاب بالتعريف الذى وضع فى المقياس المستخدم (مقياس القلق فى اختبار الشخصية المتعدد الأوجه) والذى عرف الاكتئاب بأنه انخفاض الروح المعنوية مع الشعور باليأس والعجز عن النظر الى المستقبل نظرة عادية متفائلة، نقص فى الثقة فى النفس، ونزعة إلى القلق وضيق فى الاهتمامات وانطواء^(١).

٣ - الهستيريا : Hysteria

مرض نفسى ينتج عن صراع انفعالى، ويتميز عادة بنقص النضج والاندفاع، وجذب الانتباه، والاعتماد على الغير، واستخدام الحيل للدفاعية الخاصة بالتحويل والتفكك. ومن الناحية الكلاسيكية يتضح بأعراض جسمية مؤثرة تشمل العضلات الاراذية مثل (الشلل الهستيرى) أو أعضاء حواس معينة مثل (العمى الهستيرى)^(٢) والهستيريا عصاب من سماته البارزة القابلية للإيحاء والتقلب الانفعالى وضعف الشحنة الوجدانية وتفكك محتوى الشعور، وينشأ عن صراع بين الذات الشاعزة والرغبات اللاشعورية المكبوتة، ويؤدي هذا الكبت إلى ظهور أعراض تعويضية ترضى الرغبات اللاشعورية بطريقة رمزية، ويعتبر العرض الهستيرى على الرغم من شدوه ضرباً من ضروب التكيف الناقص^(٣).

وقد أخذت الباحثة فى تعريفها الاجرائى للهستيريا بالتعريف الذى وضع فى المقياس المستخدم فى الدراسة (مقياس الهستيريا فى اختبار الشخصية المتعدد الأوجه) والذى عرف الهستيريا اضطراب يأخذ صورة شكاوى منتظمة أو شكاوى أكثر تحديداً وتخصيصاً مثل الشلل والتقلصات

(١) لويس كامل مليكة، محمد عماد الدين اسماعيل، عطية محمود هنا، ١٩٥٩، الشخصية وقياسها. القاهرة: النهضة المصرية. ص ١٥٤.

(٢) محمد حلمي المليجي، ١٩٨٤، سيكولوجية الابتكار. الإسكندرية: دار المعارف. ص ١٥٤.

(٣) متير وهيبه، ١٩٦٠، معجم مصطلحات علم النفس. بيروت: دار النشر للجامعيين. ص ٦٠.

والاضطرابات المعوية والأعراض القلبية وبوبات مفاجئة من الضعف والاعياء أو ما يشبه نوبات القلق.

ويحتمل أن المريض بالهستيريا قد يلجأ إلى حل المشكلات التي تواجهه عن طريق هذه الأعراض^(١).

■ السيكوباتية : Psychopathy

الشخصية السيكوباتية يسيطر عليها سلوك لا أخلاقي أو مضاد للمجتمع، ويتميز بالاندفاع المتأثر بنزوات الفرد، الذي لا يراعى المسؤولية في أفعاله التي تشبع اهتماماته المباشرة والرجسية دون اعتبار للنتائج الاجتماعية الواضحة والمتضمنة التي يصاحبها دليل خارجي ضئيل على القلق أو الذنب^(٢)، والشخصية السيكوباتية شخصية مريضة نفسياً، تتسم بعدم النضج الانفعالي لنشأتها في بيوت باردة انفعالياً، وضعف بناء الشخصية، بسبب التدليل المفرط بحيث لا يتعلم الفرد من طفولته قمع رغباته فيثبت عند مستوى طفلي من التمرکز حول الذات، أو لعدم توفر التعيين بأفراط اجتماعية مقبولة^(٣).

والشخص السيكوباتي يوجه اهتمامه بصورة غير طبيعية الى الحاضر، ويقصر دون ادراك تأثير أعماله على الآخرين، فالشخصية السيكوباتية لا تستفيد من التجربة سيئة التوافق مع المحيط الذي تعيش فيه. قاصرة على ادراك صلتها بالقانون الاجتماعي والناس الذين حولها. والشخصيات السيكوباتية هم الذين نرى منهم ما يسمى بالمجرم العائد، وهم عادة

(١) لويس كامل مليكة، محمد عماد الدين اسماعيل، عطية محمود هنا، ١٩٥٩، الشخصية وقياسها. القاهرة: النهضة المصرية. ص ١٥٥.

(٢) محمد حلمي الملبجي، ١٩٨٤، سيكولوجية الابتكار. الإسكندرية: دار المعارف. ص ٢٣٩.

(٣) عبد المنعم الحفني، ١٩٧٨، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي. القاهرة: مكتبة مدبولي. ص ١٨١.

أشخاص مصابين بالفجاجة العاطفية والعقلية وعدم النضج الاخلاقي مع نقص ملحوظ في سلامة التقدير والحكم على الأمور مع قلة التبصر في العواقب وضعف القدرة على الاستفادة من التجارب. وهم عادة عصبويو المزاج سريعوا الغضب والانفعال ولا يقوون على ضبط أنفسهم فيفلت منهم الزمام ويتورطون في الجريمة. ولا يشترط أن يكون مستوى الذكاء لديهم أقل من المستوى الطبيعي في بعض الحالات^(١).

ويعرف «صبرى جرجس» السيكوباتية بأنها: اضطراب خطير في الشخصية يمنعها من التكامل أو يشوه علاقة الفرد بالعالم الخارجى، ويصدر هذا الاضطراب عن قصور في نمو الأنا والأنا الأعلى يلزم الفرد منذ نشأته أو يظهر في سن مبكرة لا تتجاوز البلوغ، فيعجزه عن تمثيل الزمن كخبرة حتمية وعن إدراك المعنى في الحياة والعلاقات الانسانية، وتبدو مظاهر القصور في سلوك لا اجتماعى أو فضاء للمجتمع يتميز بالاندفاع وبأولوية القيم القصيرة الأجل، واتباع مبدأ اللذة مما يجعل صاحبه عاجزاً عن الافادة من التجربة ومن ثم عن التكيف مع البيئة الاجتماعية ولا تجدى معه وسائل العلاج أو وسائل الردع.

ويرى كاهن Kahn أن السيكوباتيين هم أولئك الذين يتميزون بانحرافات في المزاج والأنا والخلق.

ويرى «شبندر» أن السيكوباتية هي تلك الشخصية التى يعانى صاحبها والمجتمع من عدم سوانها^(٢).

وقد أخذت الباحثة في تعريفها للسيكوباتية بالتعريف الذى وضع في المقياس المستخدم في هذه الدراسة (مقياس السيكوباتية في اختبار الشخصية

(١) منير وهيبه، ١٩٦٠، معجم مصطلحات علم النفس. بيروت: دار النشر للجامعيين.

ص ١٢٠.

(٢) صبرى جرجس، ١٩٥٧، مشكلة السلوك السيكوباتي. القاهرة: دار المعارف. ص ص

٥٦ - ٦٢.

المتعدد الالوان)والذى عرف السيكيوباتية بأنها: نقص الاستجابة الانفعالية وعدم القدرة على الافادة من الخبرة، وعدم المبالاة بالمعايير الاجتماعية وإلحاق الضرر بالفرد والمجتمع والمعايير الاجتماعية. وتتسم الشخصية السيكيوباتية بالكذب والسرقة والإدمان على المخدرات والكحوليات والشذوذ الجنسي وارتكاب الأفعال الاجرامية، دون تفكير فى كسب محتمل لأنفسهم أو دون تجنب إكتشاف إمرهم^(١).

■ مستوى الطموح :

ظهر لأول مرة استخدام اصطلاح مستوى الطموح فى الدراسة التى قام بها ديمبو Dembo عن النجاح والفشل والتعويض والصراع. وقد كانت الاتجاهات الغالبة للعلماء الذين درسوا مستوى الطموح تنحو نحو تعريفه على أساس شرح العملية التى تكشف عنه من حيث الأداء العملى ووصف السلوك بصرف النظر عن توضيح ماهيته، وقد يرجع هذا فى الواقع إلى كثرة العوامل المتدخلة فى طبيعته.

وفيما يلى عرض للاتجاهات المختلفة فى تعريف مستوى الطموح وطبيعته، ثم توضيح التعريف الذى سوف تلتزم به الباحثة فى بحثها:

■ تعريف هوبى (١٩٣٠) : Hobey

يعتبر هوبى Hobey أول من عرف مستوى الطموح فى مجال دراسته عن علاقة النجاح والفشل بمستوى الطموح حيث عرفه بأنه «أهداف الشخص أو غاياته أو ما ينتظر منه القيام به فى مهمة معينة».

■ تعريف فرانك (١٩٣٥) : Frank

وقد عرفه فرانك Frank (١٩٣٥) بأنه « مستوى الاجادة المقبل فى واجب مألوف يأخذ الفرد على عاتقه الوصول إليه بعد معرفة مستوى

(١) لويس كامل مليكة، محيى عماد الدين اسماويل، عطية محمود هنا، ١٩٥٩، الشخصية وقياسها. القاهرة: النهضة المصرية. ص ١٥٨.

اجادته من قبل فى ذلك الواجب». وقد أوضح فرانك أن سلوك مستوى الطموح يميز للشخصية وثابت ثباتاً نسبياً. ويعتبر هذا التعريف قاصراً عن توضيح معنى مستوى الطموح ومفهومه.

■ تعريف جاردنر (١٩٤٩) : Gardner

وقد حدد جاردنر مستوى الطموح بأنه «القرار أو البيان الذى يتخذه الفرد بالنسبة لأدائه المقبل».

■ تعريف مورتون دوتش (١٩٥٤) : Morton Dotch

ولا يختلف تعريف دوتش عن تعريف فرانك بأن مستوى الطموح هو الهدف الذى يعمل الفرد على تحقيقه حيث كان نص تعريف دوتش لمستوى الطموح بأنه «الهدف الذى يعمل الفرد على تحقيقه، ومفهوم مستوى الطموح يكون له معنى أو دلالة حين نستطيع ان ندرك المدى الذى تتحقق عنده الأهداف الممكنة»

■ تعريف دريفر (١٩٥٢) : Drever

مستوى الطموح هو «الإطار المرجعى الذى يتضمن اعتبار الذات أو هو المستوى الذى على أساسه يشعر الفرد بالنجاح أو الفشل».

■ تعريف إيزنك (١٩٤٥) : Eysenck

لم يعرف إيزنك Eysenck مستوى الطموح، ولكنه عرف الطموح بأنه «الميل إلى تذليل العقبات وتدريب القوة، والمجاهدة فى عمل شئ بصورة سريعة وجيدة لتحقيق مستوى غال مع التفوق على النفس».

■ تعريف راجع (١٩٦٨) :

عرف راجع مستوى الطموح باعتباره دافعاً اجتماعياً فردياً بأنه «المستوى الذى يرغب الفرد فى بلوغه أو يشعر أنه قادر على بلوغه وهو يسعى لتحقيق أهدافه فى الحياة وانجاز أعماله اليومية».

طبيعة مستوى الطموح :

١ - مستوى الطموح باعتباره استعداداً نفسياً، والمقصود بالاستعداد النفسى بالنسبة لمستوى الطموح، أن بعض الناس عندهم الميل إلى تقدير وتحديد أهدافهم فى الحياة تقديراً يتسم بالطموح الزائد أو الطموح المنخفض. فمستوى الطموح لدى كل فرد يتأثر بالعوامل التكوينية، وعوامل التدريب، والتربية والتنشئة المختلفة.

٢ - مستوى الطموح باعتباره وصفاً لإطار تقدير وتقويم المواقف ويتكون هذا الإطار من عاملين أساسيين:

(أ) التجارب الشخصية من نجاح وفشل التى يمر بها الفرد والتى تعمل على تكوين أساس يحكم به على مختلف المواقف والأهداف.

(ب) أثر الظروف والقيم والتقاليد والعادات واتجاهات الجماعة فى تكوين مستوى الطموح. ومن ثم ينظر الفرد إلى المواقف والأهداف ويقدرها من خلال هذا الإطار الحضارى العام والتجربة الشخصية الخاصة.

٣ - مستوى الطموح باعتباره سمة، ويمكن القول أن مستوى الطموح يمكن أن يكون سمة على أساس أنه استعداد عام أو صفة سلوكية ثابتة نسبياً، تتأثر بما لدى الفرد من استعدادات فطرية ومكتسبة، وما لديه من عادات وأساليب سلوك إلا أنها من ناحية أخرى تتأثر بالمواقف المختلفة فى المجال السلوكى. أى أننا لا نتوقع أن يكون مستوى الطموح سمة عامة ثابتة فى كل المواقف والظروف^(١).

وبالتالى يمكن للباحثة أن تستخدم التعريف التالى كتعريف لمستوى الطموح فى بحثها وهو «مستوى الطموح سمة ثابتة نسبياً تفرق بين الأفراد

(١) كاميليا عبد الفتاح ، ١٩٧٢، مستوى الطموح والشخصية. القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة. ص ٧ - ١٢.

فى الوصول إلى مستوى معين يتفق والتكوين النفسى للفرد وإطاره المرجعى ويتحدد حسب خبرات النجاح والفشل التى مر بها^(١). وهذا هو التعريف الذى بنى عليه استبيان مستوى الطموح المستخدم فى الدراسة الحالية^(٢).

الذكاء : Intelligence

هو قوة عقلية تدفع للسير بنجاح فى شئون الحياة، ومن مظاهر القدرة على حل المشكلات الجديدة بما استفاده الانسان من التجارب السابقة. وباستعراض التعريفات المختلفة التى قبلت عن الذكاء يتضح أن الذكاء ليس وظيفة بسيطة أو ملكة مستقلة بل هو وظيفة تأليفية تتكامل فيها عدة مقومات عقلية وإرادية واجتماعية.

ويعرف «استدارد» Staddard الذكاء بأنه القدرة على القيام بأعمال تميزها الصفات الآتية: «الصغوية، التعقيد، التجريد، الاقتصاد، ملائمة الهدف، القيم الاجتماعية، الابتكار».

ويعرف «شترن» Stern بأنه القدرة العقلية على التكيف للمواقف الجديدة أو القدرة على التصرف وقد أخذ بهذا التعريف كل من «بيرت» Birt، «وينتير» Bintner.

وعرفه «بينيه» Binnet بأنه القدرة على التكيف والانتباه الإرادى، وأنه كذلك القدرة على الادراك والابتكار والاتجاه^(٣).

وقد عرف «تيرمان» Terman الذكاء بأنه القدرة على التفكير المجرد.

(١) كاميليا عبد الفتاح، ١٩٦٦، الاتزان الانفعالي وعلاقته بمستوى الطموح. رسالة ماجستير - كلية الآداب - جامعة عين شمس. ص ٦٢.

(٢) كاميليا عبد الفتاح، ١٩٧٥، كراسة تعليقات استبيان مستوى الطموح. القاهرة: النهضة المصرية ص ٣.

(٣) منير وهيبة، ١٩٦٠، معجم مصطلحات علم النفس. بيروت: دار النشر للجامعين. ص ٧٣.

أما «ديربورن» Dearborn فيؤكد أنه «الاستعداد للتعلم».

ويرى «كولفين» Colvin أنه «التكيف مع البيئة»

ومن أحد الأشياء العظيمة التي أسهم بها بينيه Binnet هو إحلال فكرة الوظائف المنفصلة بمفهوم الذكاء العام^(١).

ومن التعريفات السابقة نجد أن الذكاء تكوين أو مركب مجرد، فنحن لا نستطيع تعريف ما هو، لكن نستطيع تحديد ما يتضمنه وما يميزه، وقد تمكن علماء النفس حديثاً من الحصول على اختبارات تشخيصية تعطي معلومات عن المظاهر المميزة للقدرة، ويختلف تعريف الذكاء من اختبار إلى آخر إلى الحد الذي دعا البعض إلى تعريف الذكاء على أنه ما يقيسه اختبار الذكاء^(٢).

والباحثة بصدد تعريف الذكاء تلتزم بالتعريف الذي بنى عليه الاختبار المستخدم في الدراسة، اختبار الذكاء المصور، ويعرف الذكاء بأنه القدرة على التصنيف وتحديد علاقة التشابه بين الأشكال المختلفة، وهو يقيس القدرة العقلية العامة معتمداً على ادراك العلاقة بين مجموعة من الاشكال وانتقاء الشكل المختلف بين وحدات المجموعة^(٣).

■ المستوى الاجتماعي - الاقتصادي : Socio - economic level

وهو المستوى الذي يقيس وضع الفرد في الأبعاد التالية:

- درجة تعليم الفرد.

- مهنة الفرد.

(١) محمد حلمي المليجي، ١٩٦٩، القياس السيكولوجي في الصناعة. القاهرة: دا المعرفة الجامعية، ص ٣٩.

(٢) لويس كامل مليكة، ١٩٨٠، علم النفس الاكلينيكي - الجزء الأول - القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص ١٣١.

(٣) أحمد زكي صالح، ١٩٧٥، كراسة تعليمات اختبار الذكاء المصور. القاهرة: المطبعة العالمية ص ٤.

- درجة تعليم الوالدين.

- وظيفة الوالدين.

- عدد أفراد الأسرة.

- الحالة السكنية.

- دخل الفرد (الأسرة) الشهري بالمنزله المصرى.

وقد استخدمت الباحثة استمارة صممتها خصيصاً لقياس المستوى الاجتماعى/الاقتصادى وقامت بتقنينها وستعرض لها فيما بعد.

■ التفكير الابتكارى : Creative Thinking

ينظر إلى موهبة الابتكار ذاتها كسمة موزعة توزيعاً اعتدالياً، كما ينظر إليها البعض على أنها استعداد فطرى لدى الشخص، ويراها البعض الآخر عملية سيكولوجية، وثمة فريق يعتبرها أسلوب حياة. وقد وصفت سمة الابتكار بأنها تلك الموهبة التي تؤدي إلى التجديد فى العلم، والأداء فى الفنون الجميلة أو الأفكار الجديدة.

ويعرف «شتاين» Stien الإبداع بأنه «عملية تنتج عنها عمل جديد يرضى جماعة ما، أو تقبله على أنه مفيد».

وقد عرف «كلوفر» Klopfer الإبداع بأنه «استعداد الفرد لتكامل القيم والخواص الأولية Archaic بداخل تنظيم الذات والقيم الشعورية، وكذلك تكامل الخبرة الداخلية مع الواقع الخارجى ومتطلباته»^(١).

ويرى «فروم» (١٩٥٩) From أن الابتكار بمعنى خلق شئ جديد، شئ يمكن أن يراه ويسمعه الآخرون كأن يكون تصويراً أو نحتاً أو موسيقى أو شعراً أو رواية. ويضيف «فروم» إلى كل ذلك محدداً معنى الابتكار

(١) محمد حلمى الميجى، ١٩٨٤، سيكولوجية الابتكار. الإسكندرية: دار المعارف. ص ١٢٨ - ١٣٠.

عندما يقول «إن الابتكار على وجه العموم هو القدرة على أن ترى وتتجاوز».

ويرى «روجرز» (١٩٥٩) Rogers «إن المظاهر الهامة لتنظيم الشخصية التي تساعد على التنويع الصحيح بالانتاج الابتكاري هي نفسها علاقة الشخصية المتكاملة القادرة على التفاعل السوي مع البيئة»، فالشخص المبتكر هو الشخص الناضج انفعالياً، وهو الذي يشعر بالآلفة في العالم الذي يعيش فيه، كما يشعر في الوقت ذاته بالوئام مع نفسه ويعرف «روجرز» Rogers الابتكار بأنه «انتاج جديد نسبياً، نابعاً من فردية الشخص من جهة ومن المواد والحوادث والناس أو ظروف الحياة المختلفة من جهة أخرى». ويؤكد روجرز على أن الانتاج الابتكاري لا بد أن يحظى بقبول الجماعة ورضاها في حقبة زمنية معينة.

ويرى «ماسلو» (١٩٥٩) Mizlo «الشخص المبتكر يستطيع أن يحيا متغاوناً على أساس المساهمة المتبادلة مع الآخرين ويجد في ذلك إرضاء لحاجاته العديدة وتحقيقاً لتطلعاته في داخل هذا الإطار».

ويرى «المليجي» (١٩٦٨) أن الابتكار هو عملية تفكير من شأنها أن تحل مشكلة ما بطريقة أصيلة ومفيدة.

ويقدم «عبد السلام عبد الغفار» (١٩٦٤) تعريفاً للابتكار مؤداه: «إن الابتكار هو عملية يحاول فيها الانسان أن يحقق ذاته وذلك باستخدام الرموز الداخلية والخارجية التي تمثل الأفكار والناس، وما يحيط بنا من مشيرات لكي ينتج انتاجاً جديداً بالنسبة إليه أو بالنسبة لبيئته، على أن يكون هذا الإنتاج نافعاً للمجتمع الذي نعيش فيه». والمتأمل لهذا التعريف يجده يحتوى على عناصر هامة تتدخل في العملية الابتكارية هي:

١ - إن الابتكار يرمز إلى عملية معينة ينتج عنها شئ ملموس (وهو ما يسمع أو يرى).

٢- الابتكار له هدف معين، وهو اشباع حاجة المبتكر إلى تحقيق الذات (على اعتبار أن تحقيق الذات هو أسمى هدف يمكن أن يحققه الانسان).

٣ -إن وسيلة الشخص للوصول إلى هدفه هو استعمال الرموز الداخلية والخارجية التي تمثل الأفكار والمثيرات الخارجية.

٤ - ومن خلال استعمال هذه الرموز يصل إلى انتاج جديد، قد يكون الانتاج جديداً بالنسبة إلى الفرد، وقد يكون جديداً بالنسبة إلى جماعته وفي الحالتين الانتاج ابتكارى.

٥ - يجب أن يكون الانتاج وظيفياً ونافعاً بحيث يسد فراغاً معيناً.

٦ - هذا الفراغ إما أن يشعر به الفرد أو تشعر به الجماعة.

ومن العوامل العقلية التي لها أهمية فى العملية الابتكارية كما أوضحها «جيلفورد» (١٩٥٧) ما يلى:

١ - الحساسية للمشكلات : Sensitivity to problem وهى تشير إلى قدرة الفرد لأن يرى أن موقفاً معيناً ينطوى على عدة مشكلات تحتاج إلى حل .

٢ - الأصالة : Originality وهى القدرة على سرعة انتاج أكبر عدد من الاستجابات ذات الارتباطات البعيدة غير المباشرة Association Remote بالموقف المثير، أو استجابات نادرة، أو استجابات تتميز بالمهارة Cleverness.

٣ - الطلاقة الفكرية : Ideational fluency وهى القدرة على سرعة انتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار التى تنتمى إلى نوع معين من الأفكار التى تحددها بنود الاختبار.

٤ - المرونة التلقائية : Spontaneous Flexibility وهى القدرة على سرعة انتاج أكبر عدد ممكن من أنواع مختلفة من الأفكار التى ترتبط بموقف معين.

وقد أكدت هذه العوامل مجموعة من الدراسات الأخرى: دراسة جيري، وديبوتورنس (١٩٥٩)، ودراسة لوفيلد (١٩٥٩)، ودراسة ماكيتون (١٩٧٦)، دراسة أندروز (١٩٦٨)، رونالد (١٩٧٠)، Gery, Dembo, Torance, 1959, Lounfield 1959, Mackinnon, 1967, Andrews 1968, and Ronald, 1970^(١).

والتفكير الابتكاري في هذا البحث مرتبط بالتعريف الذي بنى عليه الاختبار المستخدم في البحث وهو يرى أن التفكير الابتكاري «هو قدرة الشخص على إعطاء أكبر عدد من الأفكار المتنوعة والتي تتميز بالأصالة والمرونة والطلاقة بالنسبة للشخص المبتكر نفسه أو بالنسبة لجماعته أو ثقافته».

ويتضمن هذا التعريف المكونات الرئيسية للابتكار:

١ - الطلاقة : Fluency

وهي القدرة على استدعاء أكبر عدد ممكن من الأفكار المناسبة في فترة زمنية محددة لمشكلة أو موقف، وينصب الاهتمام هنا على عدد الأفكار أو الكم Quantity بغض النظر عن نوع الأفكار Quality، وتستخدم الباحثة مقياس الطلاقة الفكرية والذي يحددها على أنها القدرة على سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار التي تنتمي إلى نوع معين من الأفكار التي تحددها بنود الاختبار.

٢ - المرونة : Flexibility

وهي القدرة على إنتاج استجابات مناسبة لمشكلة أو موقف، ويتم بالتنوع، وبمقدار زيادة الاستجابات الفريدة الجديدة تكون زيادة المرونة، وتستخدم الباحثة اختبار المرونة التلقائية والذي يحددها على

(١) سيد صبحي، ١٩٧٥، دراسات وبحوث في الشخصية - القاهرة: عالم الكتب. ص ١٧ - ١٩.

أنها القدرة على سرعة انتاج اكبر عدد ممكن من أنواع مختلفة من الافكار التي ترتبط بموقف معين يحدده الاختبار.

٣ - الأصالة : Originality

وهي القدرة على انتاج استجابات أصيلة أى قليلة التكرار بالمعنى الاحصائي داخل الجماعة التي ينتمى إليها الفرد، أى أنه كما قلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها، وتستخدم الباحثة مقياس المترتبات والذي يعرف الأصالة بأنها «القدرة على سرعة انتاج أكبر عدد من الاستجابات ذات الارتباطات الغير مباشرة البعيدة Remote Association بالموقف المثير».

وتلتزم الباحثة بالتعريفات التي وضعها الاختبار لتعريف القدرات المقاسة.

■ الإدمان : Addiction

عندما نحاول تحديد مفهوم الإدمان نجد بعض الصعوبة في ذلك، لأن مفهوم الإدمان يختلف من الناحية اللغوية فهناك من يقول الإدمان Addiction او إساءة الاستعمال Abuse أو الاستعمال الخاطئ Misuse أو الاستعمال غير الطبي Nonmedical use أو الاعتناء Dependence أو الاستخدام القهري Compulsive use. وكذلك تعنى كلمة إدمان أشياء كثيرة مختلفة لأناس مختلفين، فرجال القانون، ورجال الطب النفسى، وعلماء الأدوية، وعلماء الاقتصاد، وعلماء الاجتماع، كل منهم يعرفها بطريقة مختلفة. فالإدمان بالنسبة للطبيب مشكلة صحة عامة من حيث أنه يؤدي إلى أمراض جسمية كثيرة بالكبد والجهاز المعوى والكلى والجهاز التنفسى والجهاز الهضمى والجهاز التناسلى. وبالنسبة لرجال القانون يمثل مخالفة لقواعد وقوانين وعرف أرتضاء المجتمع، والإدمان يعتبر خروج عن القانون. ويستوجب العلاج، وبالنسبة لرجال الطب النفسى فهو اعتماد

قهرى على سموم يستوجب العلاج للتخلص منها، كما يعتبره الطبيب النفسى أنه عبارة عن حالة عقلية تنتاب أنماطاً معينة من الناس لهم شخصية معتلة. وبالنسبة لرجال الاقتصاد فالإدمان عبارة عن نقص فى الانتاجية وسؤ فى توزيع الدخل وتعطيل للقوى البشرية المنتجة. والإدمان بالنسبة لعلماء الاجتماع هو نتاج فقر وبيئات دنيا وضغوط اجتماعية ومسايرة قيم عدائية تجاه المجتمع، والتحصن بنظريات وثقافات اجتماعية منحرفة.

— أما الإدمان بالنسبة لعلماء النفس، فهو اضطراب خطير فى الشخصية يجعل الفرد يفضل الاشباع العاجل على الاشباع الآجل، ومشاعر احباط اجتماعي ومعاناة من المرض النفسى، وقلق حاد، واضطراب عقلى لفترة طويلة. فالإدمان مشكلة أساسية من مشاكل الصحة النفسية وسوء التوافق أو هو نوع من حل الصراعات والخلل فى الشخصية. أى أن الإدمان شأنه فى ذلك شأن المرض النفسى حيث أنه فى بعض نواحيه اضطراب وانحراف فى الشخصية، كما أن التخلص منه هو إعادة لتنظيم الشخصية أو تقويتها أو زيادة استبصار الفرد بذاته.

ومن الناحية الفارماكولوجية فإن الإدمان مرادف للاعتماد الفسيولوجى ويقصد بذلك أنه ينتج حالة من التعاطى المتكرر للعقار التى إذا منعها المدمن نتج عنها اضطرابات فسيولوجية أو ما يسمى بأعراض الامتناع Withdrawal Symptoms وهذه الاضطرابات عادة ما يمكن تفسيرها فارماكولوجياً^(١). وهكذا يمكن أن يختلف تعريف الإدمان حسب التخصص العلمى وثقافة الشخص، فكل منا ينظر إلى المسألة من زاويته الخاصة والتى تختلف من فرد لآخر. ولكن الإدمان عامة يجمع بين الآتى:

« (أ) الاعتياد أو التعود (التحمل) Tolerance؛ ومعناها أن أنسجة

(1) Halback, H., 1973, Defining Durg Dependence and Abuse. Berlin: Federal Republic of Germany. PP 17 - 21.

الجسم تتكيف مع وجود العقار، وتكون في حاجة دائمة لزيادة الجرعة لاجداث نفس التأثير السابق لها المتعود عليه.

(ب) الاعتماد الجسمي Physical dependence: نظراً لتناول العقار بصفة مستمرة فإن وجود العقار بالجسم يصبح ضرورياً لتأدية الوظائف العادية المختلفة، وتحدث مضاعفات جسمية أو نفسية شديدة عند الكف عن تناول هذا العقار.

(ج) أعراض الكف أو الانسحاب (الامتناع) Withdrawal Symptoms هو التأثير الذي يحدث في الجسم عند الكف أو إيقاف تعاطى العقار الذي أصبح للجسم اعتماداً كلياً عليه.

(د) الاعتماد الفسيولوجي: Physiological dependence: الارتباط بتناول العقار والذي ينشأ من قدرة العقار على إرضاء حاجة عاطفية أو نفسية لفرد ما، وهذا الارتباط لا يستلزم اعتماداً جسمياً علي الرغم من أن الاعتماد الجسمي يمكن أن يقوى الاعتماد الفسيولوجي.

(هـ) التعود: Habituation، وهو الحالة التي فيها يرغب الشخص أو يتعود على عقار ما ولكنه لا يرتبط معه باعتماد جسمي^(١).

ويرى «سولتمان» (١٩٧٠) Soltman اتفاقاً مع «وكلر» (١٩٦٣) Wikler أن الادمان يعنى الحاجة الجسمية والنفسية للعقار، بحيث يشعر المدمن برغبة ملحة وقهرية للعقار، ويضطر إلى أن يزيد الجرعة حتى يحصل على نفس التأثير المطلوب، ويعانى المدمن من اضطرابات تسمى أعراض الانسحاب، وعادة ما بضر نفسه والمجتمع في حالة استمراره في تعاطى العقار^(٢).

(1) World Health Organization, 1970, Expert Committee on Durg Liable to Produce Dependence, Techn. R. Ser. No. 312. Geneva: W.H.O.

(2) Saltman, Jules, 1970, What We can do About Durg Abuse, New York: Harvard University. P 78.

وقد ميز «سميث» (١٩٧١) Smith بين ثلاث مراحل من الاستخدام للعقار، فهو يرى أن هناك سؤ استخدام يرجع الى رغبة الفرد للتجريب وحسب الاستطلاع، ثم سؤ استخدام دورى بقصد الترفيه والتسلية، ثم الإدمان وهو سؤ الاستخدام القهري Compulsive للعقار^(١).

وهناك تعريف بأن الإدمان هو المداومة على تعاطى مواد معينة أو القيام بنشاطات معينة لمدة طويلة، يقصد الدخول فى حالة من النشوة واستبعاد الحزن والاكتئاب. وإدمان المخدرات عرض لاضطراب أساس فى الشخصية، والإدمان الحقيقى معناه أن فسيولوجيا الجسم قد تغيرت بالتعاطى المتكرر، فإذا انقطع التعاطى ظهرت فى الحال أعراض الانقطاع^(٢).

ويرى معظم المهتمين بدراسة وتعريف الإدمان أن من خصائص الإدمان الأتى:

■ زيادة فى الطاقة والتحمل Tolerance أو نقص الآثار لنفس الجرعة المعطاة من المخدر، وهذا يدفع بعض الأفراد لأن يزدوا من الجرعة لكي يحصلوا على نفس الأثر للجرعة الأولى.

■ الاعتماد الجسمى Physical depece تغير الحالة الجسمية أو التوازن الجسمى الذى يحدث من استخدام المخدر لمدة طويلة من الزمن، وهذه هى الأساسيات فى استخدام المخدر لتجنب الآلام والمضايقات من منع المخدر.

■ الرغبة Desire رغبة الفرد القوية أو الحاجة للاستمرار فى أخذ المخدر والحصول عليه بأية وسيلة.

■ الاعتماد النفسى Psycholoigical Dependence على المخدر، متضمناً احلال المخدر لأنواع أخرى من السلوك التكيفى .

(1) Smith H. D., 1977, "Drug Use and Abuse". In: Ruch and Zimbardo (eds) Psychology and Life, New York, Grow Hill Book, (Co. INC). P 98.

(٢) سعد حلال، ١٩٦٨، أسس علم النفس الجنائي، القاهرة: دار المعارف، ص ٢٤١.

■ الميل الى العودة (النكوص Relapse) حتى بعد فترة طويلة من الحرمان من المخدر^(١).

وقد أضافت منظمة الصحة العالمية (١٩٦٩) W.H.O معنى آخر للإدمان أسمته بالتبعية للعقاقير وعرفته بأنه حالة نفسية وأحياناً جسمية ناتجة عن التفاعل ما بين جهاز الجسم الحى، وعقار ما. وتتسم هذه الحالة بتغيرات وانفعالات تنطوى دائماً على تعاطى العقار بصورة مستمرة ومتتالية وذلك بغية إعادة توفير الآثار البدنية، وأحياناً لتلاشى العناء الذى يورثه الحرمان، وقد يخضع الفرد لتبعية أكثر من عقار.

■ التبعية النفسية: وهى أن يثير المخدر شعوراً بالارتياح ودافعاً مادياً لتعاطى المخدر بصورة رتيبة ومستمرة وذلك للحصول على متعة أو لتلاشى مشاعر مكروهة.

■ التبعية البدنية: وهى تطبع يبدو بظهور اضطرابات جسمية عنيفة عندما ينقطع تعاطى المخدر، وتؤلف هذه الاضطرابات أى أعراض الانقطاع مجموعة خاصة من الأعراض الجسمانية والنفسية وهى تختلف تبعاً لنوع المخدر^(٢).

وترى الباحثة نتيجة لتعدد التعريفات فى تحديد مفهوم الإدمان الأخذ بالتعريف الذى وضعتة منظمة الصحة العالمية W.H.O كتحديد إجرائى لمفهوم الإدمان فى البحث الحالى، وذلك كما صاغته المنظمة وهو كالاتى: «إدمان المخدرات حالة تسم دورية أو مزمنة تلحق الأذى بالفرد

(1) Kazdine E. A., Bellack A.S., and Micheal Hersen, 1980, New Prespective in Abnormal Psychology, New York: Univirsiry Press. P 316.

(2) World Health Organization, 1969, Expert Commite on Durg Dependence, Sixteen Report-Tech. R. Ser; No. 407. Geneva W.H.O.

والمجتمع وتحدث من تكرار تعاطى عقار معين (طبيعى أو مصنوع) ومميزاته هي:

١ - رغبة غلبة أو حاجة قهرية للاستمرار فى تعاطى العقار والحصول عليه بأية وسيلة.

٢ - ميل إلى زيادة الجرعة المتعاطاة من العقار .

٣ - اعتماد نفسى (سيكولوجى) وجسمانى بوجه عام على مفعول العقار.

٤ - تأثير ضار مؤذى للفرد والمجتمع^(١).

وقد فرقمت منظمة الصحة العالمية بين التعاطى والإدمان فعرفت التعاطى بأنه الاعتقاد أو العادة وهى حالة تنشأ من تكرار تعاطى عقار معين ومميزاته هي:

(أ) رغبة ولكنها ليست قهرية فى الاستمرار فى تعاطى العقار من أجل الشعور بالانتعاش الذى يبعثه.

(ب) ميل قليل ، بل قد لا يوجد ميل قط لزيادة الجرعة المتعاطاة من العقار.

(ج) اعتماد نفسانى إلى حد ما على مفعول العقار، ولكن لا وجود للاعتماد الجسمى ، وعلى ذلك لا وجود لأعراض الامتناع عن تعاطيه.

(د) تأثير إذا وجد - ضار بالفرد أولاً وقبل كل شيء^(٢).

وبذلك يكون الإدمان اعتماداً كلياً على المخدرات أو بعبارة نفسية

(1) World Health Organization, 1965, Expert Committee On Drug Liable to Produce Addiction, Tech. R. Ser. No. 116. Geneva: W.H.O. P 5.

(2) World Health Organization, 1978, Expert Committee on Drug Dependence. Techn. R. Ser. No. 618. Geneva: W.H.O.

اعتماداً عليه من حيث ما تؤدي إليه نفسياً، بينما التعاطى اعتماد عارض أو حاجة عارضة إلى ما يؤدي إليه المخدر نفساً^(١).

■ المدمن : Addict

هو الشخص الذى يدخل المخدر فى روتين حياته اليومية أو الذى لا يقل عدد مرات تعاطيه للمخدر عن أربع مرات أسبوعياً وبصفة منتظمة لفترة لا تقل عن خمس سنوات.

■ المخدرات :

يعرف القانون المادة المخدرة أو الجوهر المخدر تعريفاً شاملاً كما يلي :

المادة المخدرة هى العنصر أو المركب أو المحلول المحتوى على الأفيون أو الحشيش أو الكوكا أو الهروين بنسبة خاصة، يكون من شأنها أن تفتت الجسم أو تغييب العقل أو تهيج الشعور، ذلك لأن معظم المواد المخدرة لا بد وأن تحتوى على الأفيون أو الحشيش أو الهروين أو نبات الكوكا.

فالمادة المخدرة تعتبر كل مادة خام أو مستحضرة وتحتوى على جواهر منبهة أو مسكنة من شأنها إذا استخدمت فى غير الأغراض الطبية والصناعية الموجهة أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان^(٢).

وللمخدر تعريفان : تعريف علمى ، وتعريف قانونى :

فالتعريف العلمى : المخدر مادة كيميائية تسبب النعاس أو النوم أو غياب الوعى المصحوب بتسكين الألم، وكلمة مخدر ترجمة لكلمة Nar-cotic المشتقة من الأغريقية Narkosis التى تعنى يخدر أو يجعل الفرد مخدراً.

أما التعريف القانونى : المخدرات مجموعة من المواد تسبب الإدمان

(1) World Health Organization, 1973, Expert Committee on Drug Dependence. Techn. R. No. 526. Geneva: W.H.O.

(٢) سعد جلال، ١٩٦٨، أسس علم النفس الجنائي، القاهرة: دار المعارف، ص ٢٨٥.

وتسم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك.

وقد أخذت الباحثة في تعريفها الاجرائي للمخدرات التعريف الذى وضعتة منظمة الصحة العالمية والتي عرفت فيه المادة المخدرة أو العقاقير كما يلي: «أى مواد يتعاطاها الكائن الحى بحيث قد تعدل وظيفة أو أكثر من وظائفه الحيوية»

■ السلوك : Behavior

هو كل ما يصدر عن الفرد من نشاط داخلى أو خارجى وهو يتفاعل مع بيئته ويحاول التكيف لها^(١) وهو كل ما يصدر عن الفرد من استجابات مختلفة إزاء موقف يواجهه، أو إزاء مشكلة يحلها أو خطر يهدده أو قرار يتخذه أو أزمة نفسيه يكابدها. ويقصد بالاستجابة كل نشاط يشيره منه أو مثير. والمثير هو أى عامل خارجى أو داخلى يثير نشاط الكائن الحى أو نشاط عضو من أعضائه وعلى هذا يشمل السلوك الأتى:

- كل ما يفعله الانسان ويقوله.

- كل ما يصدر عنه من نشاط عقلى كالادراك والتفكير والتخيل.

- كل ما يستشعره من تأثيرات وجدانية، كالاحساس باللذة والألم، والشعور بالضيق والارتياح، بالخوف والغضب مع ما يصاحب ذلك من أنشطة فسيولوجية شتى^(٢).

وترى الباحثة أن السلوك «هو ما يقوم به الفرد من استجابات مختلفة

(١) عيد المنعم الحفني، ١٩٧٨، موسوعة علم النفس التحليل النفسي. القاهرة: مكتبة مدهولي. ص ٩٢.

(٢) أحمد عزت راجح، ١٩٧٥، أصول علم النفس. القاهرة: المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر. ص ٧٢.

تجاه ما يقابله من مواقف، فهو ما يقوله، وما يصدر عنه من أنشطة عقلية مختلفة، وما يشعر به من مشاعر وانفعالات وما يعتريه من احساسات مختلفة».

أدوات البحث :

وقد استخدمت الباحثة الأدوات التالية والتي تتفق مع ما فرضته من فروض وتصلح للتطبيق على العينة:

- ١ - استمارة المقابلة من إعداد الباحثة.
 - ٢ - استمارة المستوى الاجتماعى/ الاقتصادى من إعداد الباحثة.
 - ٣ - بعض مقاييس من اختبار الشخصية المتعدد الوجة:
 - مقياس توهم المرض.
 - مقياس الهستريا.
 - ١- مقياس الاكتئاب.
 - مقياس الانحراف السيكوباتى.
 - ٤ - بعض اختبارات من اختبارات القدرة على التفكير الابتكارى:
 - اختبار الطلاقة الفكرية.
 - اختبار المترتبات.
 - اختبار الاستعمالات.
 - من إعداد عبد السلام عبد الغفار.
 - ٥ - استبيان مستوى الطموح من إعداد د. كاميليا عبد الفتاح.
 - ٦ - اختبار الذكاء المصور من إعداد د. أحمد زكى صالح.
- منهج البحث :

استخدمت الباحثة المنهج الوصفى الاحصائى وقد قامت باستخدام

الاحصاء الوصفى لبيان دلالة الفروق بين المجموعات، فاستخدمت اختبار «ت» وتحليل التباين لمجموعتين لمعرفة مدى تجانس العينة أو عدمه.

خطوات البحث :

وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية:

١ - الدراسة النظرية: وهى تجميع نظرى لمعظم ما كتب من أعمال نظرية أو دراسات عقلية تناولت موضوع الإدمان وقد ساعدتها هذه القراءات فى تحديد حجم المشكلة عالمياً ومحلياً وفى التجميع النظرى مادة هذا البحث.

٢ - تجميع الدراسات السابقة العربية أو الاجنبية التى لها صلة بموضوع الدراسة، وسوف يتم عرض هذه الدراسات فى الفصل الخاص بها.

٣ - الدراسة الاستطلاعية: وقد ساعدتها هذه الدراسة فى إعداد استمارة المقابلة كذلك معرفة ضرورة إعادة صياغة الاختبارات من اللغة العربية الفصحى إلى العامية نظراً لما وجدته الباحثة من ظروف العينة التعليمية والثقافية.

٤ - تقنين الاختبارات.

٥ - الاتصالات بالجهات المسئولة عن مدمنى المخدرات لاتاحة الفرصة لمقابلة العديد منهم والتعرف على استعداداتهم لمساعدة الباحثة.

٦ - قامت الباحثة بعد ذلك بتحديد اماكن العينة.

٧ - تطبيق الاختبارات المستخدمة فى هذا البحث على العينة وقد استغرق التطبيق ثمانى أشهر من يناير إلى أغسطس ١٩٨٣.

٨ - تفسير النتائج التى توصل إليها البحث فى ضوء فروض البحث ومتغيراته.

٩ - كتابة التوصيات الخاصة بالبحث وما أسفر عنه من نتائج وما يسفر عنه من دراسات مستقبلية.

أولاً - العينة :

تنقسم عينه البحث إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تجريبية مدمنة للمخدرات المختلفة ولها تاريخ ادمانى طويل، والمجموعة الثانية ضابطة، ليس لها أى علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمخدرات.

مصدر العينة التجريبية :

قامت الباحثة بدراسة استطلاعية لمعرفة الأماكن والأحياء التى يتزدد عليها المدمنون والموجودين فيها بصورة ثابتة نسبياً، حتى تتمكن الباحثة من مقابلتهم أكثر من مرة وأن تضمن وجودهم فيها عندما ترغب فى مقابلتهم مرة أخرى.

وكانت مصادر العينة كالاتى:

(أ) المصدر الأول :

قامت الباحثة بالذهاب إلى مستشفى شرق المدينة والتى بها قسم لعلاج الإدمان ويتردد عليها المدمنون يوم الاثنين من كل اسبوع، ومعظم المدمنين المترددين على هذه المستشفى لم يذهبوا للعلاج من تلقاء انفسهم ولكن تم ضبطهم عن طريق مكاتب مكافحة المخدرات المنتشرة فى معظم أجزاء مدينة الإسكندرية أو عن طريق مكتب الرعاية اللاحقة بمديرية الأمن ويشرف على قسم الإدمان بهذه المستشفى، وقد حصلت الباحثة على ١٨ حالة مدمنة للمخدرات من هذه المستشفى، وجميعهم لهم ملف إدمان وتاريخ ادمانى طويل ويذهبون للمستشفى مرغمين، وليست لديهم أى رغبة للاقلاع عن المخدر، ولا يتناولون العلاج المقرر لهم فيما عدا الحبوب المهدئة فيتناولونها مع مخدرهم المفضل.

ب) المصدر الثانى :

حصلت الباحثة من مكتب مكافحة المخدرات بحى غرب الاسكندرية على أسماء مجموعة من المدمنين الخطيرين والمسجلين بالمكتب، وقد

ساعدتها المكتب فى الحصول على ١ حالات وقد نم اختيارهم عشوائياً
من بين أسماء المدمنين.

(ج) المصدر الثالث :

قامت الباحثة بزيارة أكبر مجتمع فى الإسكندرية شهرة بإدمان
المخدرات وخاصة (الحشيش) وهو حى كوم الدكة. وقد ساعدها تجار
المخدرات فى هذا الحى، بعد أن شرحت لهم الباحثة الغرض من البحث
وكسب ثقتهم، فى جمع ثمانى حالات من المدمنين الذين يتناولون المخدر
بصورة يومية.

■ وكذلك تمكنت الباحثة من حصر ٥ حالات من حى العامرية عن
طريق مكتب مكافحة المخدرات فى هذه المنطقة.

■ وأيضاً من منطقة نادى الصيد بحى محرم بك تمكنت الباحثة
بمساعدة أصدقاء لها فى الحصول على ٣ حالات مدمنة للأفيون بهذه
المنطقة.

■ تمكنت الباحثة من حصر حالتين من المدمنين المترددين على بنك
الدم بمستشفى الشاطبي، فكانت هذه الحالات تتبرع بدمها مقابل مبلغ
من المال لشراء المخدر.

■ حالة مدمن مخدرات مقبوض عليه فى نيابة المخدرات.

■ حالة من منطقة السيوف.

وبذلك تكون عينة المجموعة التجريبية مكونة من ٤٨ فرداً مدمناً
كالآتى:

جدول رقم (٦)

عدد الحالات	مصدر العينة
١٨	مستشفى شرق المدينة
١٠	مكتب مكافحة المخدرات (المنشية)
٥	مكتب مكافحة المخدرات (العامة)
٣	حي نادي الصيد (محرم بك)
٢	مستشفى الشاطبي الجامعي (بنك الدم)
١	نيابة المخدرات
٨	حي كوم الدكة
١	منطقة السيوف
٤٨	المجموع

وقد راعت الباحثة في اختيارها لعينتها الآتي:

■ أن تكون العينة مشتملة على مدمنين لجميع أنواع المخدرات دون التركيز على نوع بعينه.

■ أن تكون العينة من أماكن متفرقة من مدينة الإسكندرية.

■ أن يكون حجم العينة مناسباً ودرجة تسمح للمقارنة.

■ أن تتميز العينة بتاريخ إدماني طويل.

■ أن تكون العينة لا زالت على عهدها بالمخدر.

مصادر العينة الضابطة :

قامت الباحثة بجمعهم بطريقة عشوائية من العاملين في المهن الحرفية واليدوية في مجموعة من الشركات الانتاجية وكانت مصادره كالاتي:

المصدر الأول :

شركة كابو (التصر لصناعة المنسوجات) ١٨ فرداً من العاملين فى اصلاح الماكينات والسعاه.

المصدر الثانى :

شركة ستيا ١٣ حالة.

المصدر الثالث :

شركة مطابع محرم الصناعية ١٢ حالة

- خمس حالات من العاملين فى المهن الحرة.

جدول رقم (٧)

عدد الأفراد	مصدر العينة
١٨	شركة كابو
١٣	شركة ستيا
١٢	شركة مطابع محرم الصناعية
٥	مهن حرة مختلفة
٤٨	المجموع

وقد راعت الباحثة عند اختيارها للعينة الضابطة أن تكون ماثلة للعينة التجريبية فى المهن، السن، المستوى الاجتماعى، والبيئة السكنية.

سن المجموعة الضابطة :

وكان المتوسط الحسابى لسن المجموعة الضابطة (٤٠ر١٥) سنة بانحراف معياري قدره (١٥ر١٦).

وصف العينة التجريبية :

تتكون عينة البحث التجريبية من مجموعة من مدمنى المخدرات التى تمكنت الباحثة من جمعهم من مناطق الإسكندرية المختلفة، وستعرض الباحثة لوصف المهنة، المستوى الاجتماعى الاقتصادى، التاريخ الإدمانى ليعيتها. وقد قامت الباحثة بتصنيف معظم هذه البيانات فى فئات ونسب مئوية كالآتى:

أولاً - السن :

وتم حساب المتوسط الحسابى لسن المجموعة التجريبية فكان (٤١٫٤٨) بانحراف معيارى قدره (٩٫٤٢).

ثانياً - الحالة الاجتماعية :

يشكل المتزوجون أكبر نسبة من أفراد المجموعة التجريبية، إذ بلغت نسبة المتزوجون من العينة (٦٢٫٥٪)، ونسبة (٢٠٫٨٣) لم يسبق لهم الزواج، ونسبة (١٢٫٥٠) من العينة مطلقين، ونسبة (٤٫١٧) أرامل.

وبالنسبة لعدد مرات الزواج، يتساوى عدد من تزوجوا مرة واحدة بعدد من تزوجوا مرتين، إذ تبلغ النسبة لكل منهما (٤٦٫٨٨٪) وهناك (٦٫٢٥) من العينة تزوجوا ثلاث مرات .

مهنة الزوجة :

كل زوجات المجموعات التجريبية المتزوجين لا تعمل فيما عدا ثلاثة منهم تعمل زوجاتهم عاملات فى الشركات. وبالنسبة للحالة التعليمية للزوجة فكانت ١٠٠٪ من زوجات المدمنين أميات وهى كل زوجات العينة.

وبالنسبة لعدد الأولاد:

فقد كان هناك ٣٠٪ من العينة المتزوجة لم تنجب بعد وكان

٦٨٦٤٪ من العينة لديهم أولاد ومتوسط عدد الأولاد بالنسبة للمجموعة كلها ٦ أولاد للفرد الواحد.

ثالثاً - الحالة التعليمية :

بلغت نسبة الأمية ٥٢.٨٪ فى العينة، ونسبة من يقرأون ويكتبون بلغت ٣٧.٥٪، وكانت نسبة ٦٢.٥٪ من العينة متعلمة تعليم ابتدائي، و٤١.٧٪ من العينة تعليمها متوسط.

رابعاً - الحالة الوظيفية :

قامت الباحثة بعمل جدول يوضح توزيع مهن العينة التجريبية كالآتى:

جدول رقم (٨)

المهنة	تكرارها	نسبتها٪	المهنة	تكرارها	نسبتها٪
صباد	٤	٨.٣٣	فلاح	٢	٤.١٧
بائع أسماك	٣	٦.٢٥	تاجر مخدرات	٤	٨.٣٣
حلاق	١	٢.٠٨	صاحب عربة شاي	٦	١٢.٥٠
خردواتى	٢	٤.١٧	ميكانيكي سيارات	٥	١٠.٤٢
عاطل	٥	١٠.٤٢	فراش	٥	١٠.٤٢
سيك	٤	٨.٣٣	ترزى	١	٢.٠٨
مقاول	١	٢.٠٨	موظف	٣	٦.٢٥
صانغ	١	٢.٠٨	جزار	١	٢.٠٨

وتبين من الجدول السابق أن أفراد العينة يمتهنون مهن وأعمال مختلفة، وقد نجد أن توزيع المهن هذا يتفق مع من يرون أن مدمنى المخدرات من ذوى الأعمال الحرة والتي لا تتطلب استعداداً عقلياً أو مستوى تعليمى معين.

خامساً - الحالة السكانية :

■ الأحياء التي يقطنها المدمنون :

جدول رقم (٩)

اسم الحي	عدد الأفراد	النسبة المئوية %	اسم الحي	عدد الأفراد	النسبة المئوية %
امبروزو	٢	٤١٧	ميناء البصل	٢	٤١٧
نادي الصيد	٣	٦٢٥	السيوف	١	٢٠٨
كرموز	٣	٦٢٥	المنشية	٢	٤١٧
حارة باطارية	٣	٦٢٥	بحري	٥	١٠٤٢
العامة	٥	١٠٤٢	القبلي	٢	٤١٧
سیدی بشر	١	٢٠٨	الوردان	٢	٤١٧
كوم الذكة	٥	١٠٤٢	العزبة	٣	٦٢٥
كوم الشفاقة	٥	١٠٤٢	جبل ناعسة	٢	٤١٧
الليان	٢	٤١٧			

■ عدد حجرات المسكن :

جدول رقم (١٠)

عدد الحجرات	عدد الأفراد	النسبة %
حجرة واحدة	٢٣	٤٧٩٢
حجرتان	١٧	٣٥٤٢
ثلاث حجرات	٦	١٢٥
أربع حجرات	٢	٤١٧

سادساً - الدخل الشهري :

وستعرض الباحثة له في جدول من واقع بيانات المفحوصين كالاتي:

جدول رقم (١١)

الدخل الشهري	تكراره	النسبة المئوية %
٦٥	٧	١٤ر٥٨
٩٥	٢	٤ر١٧
١٠٠	٦	١٢ر٥
١٥٠	٥	١٠ر٤٢
١٦٥	١	٢ر٠٨
٢٠٠	٧	١٤ر٥٨
٢٥٠	٥	١٠ر٤٢
٣٠٠	٥	١٠ر٤٢
٤٠٠	٦	١٢ر٥
٥٠٠	٤	٨ر٣٣

وكان متوسط دخل الفرد من مدمنى المخدرات = ٢٢٣ر١٢ جنيه بحد أدنى ٦٥ جنيه وحد أقصى ٥٠٠ جنيه.

ومن الجدول يتضح لنا التفاوت الواضح فى دخل المجموعة إلا أنهم يشتركون جميعاً فى سمة الإدمان ولكن الاختلاف فى الدخل سينعكس أثره على نوع المخدر المدمن وعدد مرات تعاطيه.

سابعاً - التاريخ الإدمانى :

١ - بالنسبة لنوع المخدر الذى سبق للمدمن تعاطيه :

جدول رقم (١٢)

المخدر	تكراره	النسبة %
حشيش	٤٣	٨٩ر٥٨
أفيون	٣٤	٧٠ر٨٣
هيروين	١٠	٢٠ر٨٣
كوداين	٣	٦ر٢٥
حبوب مهدنة ومنبهة	١٩	٣٩ر٨٥
كوكاين	٣	٦ر٢٥

ويتضح من الجدول السابق أن معظم أفراد العينة قد تناولوا الحشيش. ويعد الحشيش أكثر العقاقير انتشاراً إذ بلغ من تعاطى الحشيش من أفراد العينة نسبة (٨٩,٥٨٪)، وكذلك تناولت نسبة كبيرة من العينة الأفيون (٧٠,٨٪) ونسبة منهم أخذت المهدئات والمنبهات، وتناول الهرويين منهم (٨٣,٢). وكان أقل مخدر هو الكوكايين (٢٥,٦) فقط من العينة وربما يرجع ذلك إلى ندرته وغلوه ثمنه.

وقرر من يأخذون المنبهات والمهدئات إنهم يقومون بسحقها وإضافتها إلى الشاي المغلى ويشرب في الصباح الباكر. قبل تناولهم أي طعام.

المخدر الحالي :

يعد الحشيش من أعلى العقاقير الجالبة لتناول وتكراراً إذ أن (٣٩,٨٥٪) من العينة يدمنون الحشيش، ولكن ليس الحشيش بمفرده كما أجمع كل الأفراد ولكنهم يقومون بخلطه بحبوب الاوبتاليدون المستورد أو الريتالين أو حبوب الماندركس ويغلى الخليط على النار في مشروب القهوة أو الشوكولاتة أو بتدخين الحشيش وبلع الأقراص قبل التدخين مباشرة. ويلي إدمان الحشيش والحبوب، إدمان الأفيون إذ بلغت نسبة (٨٣,٢٨) من العينة الذين يدمنون الأفيون، يلي ذلك إدمان الحشيش بدون إضافة حبوب (٦٧,١) ثم الحبوب المهدئة (٤٢,١٠٪). وكانت أقل نسبة للكوداين (٢٥,٦) والهرويين (١٧,٤).

وستعرض الباحثة لهذه النسب في جدول لتوضيحها:

(جدول يوضح توزيع المخدرات المدمنة حالياً لدى عينة البحث)

جدول رقم (١٣)

المخدر الحالي	تكراره	النسبة المئوية %
حشيش + حبوب	١٩	٣٩,٨٥
أفيون	١٠	٢٨,٨٣
هيروين	٢	٤,١٧
كوداين	٣	٦,٢٥
حبوب مهدنة أو منبهة	٥	١٠,٤٢
كوكايين	١	٢,٠٨
حشيش فقط	٨	١٦,٦٧

عدد المخدرات المتناولة حالياً :

قررت نسبة كبيرة من العينة أنها تتناول أكثر من مخدر في آن واحد وفي الجرعة الواحدة، ويرجعون ذلك إلى أن التجار يقومون بخلط المخدرات الطبيعية بمواد غريبة، مما يفقدها قوتها التأثيرية التي ألفوها، كما أن معظم الذين يتناولون مخدرين كانوا مدمني أفيون، ونظراً لندرة الأفيون وغلو ثمنه فوق طاقتهم فإنهم يعملون الخلط هذا لكي يحميهم من مشاعر قطع الأفيون المؤلمة وتريحهم نفسياً.

(جدول يوضح عدد المخدرات المدمنة لدى أفراد العينة)

جدول رقم (١٤)

عدد المخدرات في الجرعة الواحدة	عدد الأفراد	النسبة المئوية %
مخدر واحد	١٠	٢٠,٨٣
مخدرين	٣٣	٦٨,٧٥
ثلاثة أنواع أو أكثر من ذلك في الجرعة الواحدة.	٥	١٠,٤٢

السن عند تعاطى أول عقار :

وقد قامت الباحثة بتفريغ السن للمجموعة كلها في فئات كالآتى:

جدول رقم (١٥)

النسبة المئوية %	ك	فترة السن
١٢ر٥	٦	١٢ - ١٠
١٤ر٥٨	٧	١٥ - ١٣
٢٩ر١٧	١٤	١٨ - ١٦
٢٧ر٠٨	١٣	٢١ - ١٩
٤ر١٧	٢	٢٤ - ٢٢
٦ر٢٥	٣	٢٧ - ٢٥
٦ر٢٥	٣	٣٠ - ٢٩

وكان متوسط السن عند بداية التعاطى (١٨ر٢٥) سنة وبنحرف معيارى قدره (٣ر٦٩):

الدافع لأخذ المخدر فى أول مرة :

جدول رقم (١٦)

النسبة المئوية %	تكراره	السبب
٤٩ر٩٢	٢٣	الأصدقاء
١٦ر٦٧	٨	حب الاستطلاع
١٤ر٥٨	٧	عادات المجتمع
١٤ر٥٨	٧	توافر المال
١٤ر٥٨	٧	الجنس
٦ر٥	٣	بيع المخدر
٦ر٢٥	٣	المرض
٢ر٠٨	١	الحزن

ومن الجدول يتضح لنا أن أقوى الأسباب دفعاً لأخذ المخدر هم جماعة الأصدقاء ويلييه حب الاستطلاع، ثم الجنس، وقد ذكر بعض أفراد العينة أكثر من سبب مجتمعين فقد جمع معظمهم بين (الأصدقاء والرغبة في المعرفة) (الجنس وتوافر المال).

■ مدة الإدمان :

جدول رقم (١٧)

النسبة %	تكرارها	المدة
١٦٦٧ر	٨	٧ - ١٠ سنوات
٢٠٨٣ر	١٠	١١ - ١٤ سنة
٢٠٨٣ر	١٠	١٥ - ١٨ سنة
٣١٢٥ر	١٥	١٩ - ٢٢ سنة
١٠٤٢ر	٥	أكثر من ٢٢ سنة

وقد قامت الباحثة بحساب مدة الإدمان من طرح السن الحالي للمدمن من السن عند بداية التعاطي، وذلك بالنسبة للمدمنين المنتظمين وحيث أن عينة البحث منتظمة في الإدمان ولم تقلع عن المخدر فكانت العينة كلها لها تاريخ إدماني طويل وكانت أعلى نسبة في فئات الزمن من (١٩ - ٢٢ سنة) بنسبة مئوية (٣١٢٥ر٪) يليها فئات الزمن من (١١ - ١٤)؛ (١٥ - ١٩) سنة وكانت نسبة كل منهما (٢٠٨٣ر٪) وتليها من (٧ - ١٠ سنوات بنسبة (١٦٦٧ر٪)، وأقل نسبة هي أكثر من ٢٢ سنة (١٠٤٢ر٪) وربما يرجع ذلك إلى أن العينة تعد صغيرة في السن نسبياً. وكان متوسط التاريخ الإدماني لدى العينة (١٦١٦) سنة بانحراف معياري قدره (٤٦٩ر).

ثانياً - أدوات البحث :

قامت الباحثة باستخدام الأدوات التالية:

- المقابلة المقيدة.
- اختبار الشخصية متعدد الأوجه (مقاييس توهم المرض، الاكتئاب، الهستيريا والانحراف السيكوباتي).
- استبيان مستوى الطموح.
- اختبار الذكاء المصور.
- اختبارات القدرة على التفكير الابتكاري (الطلاقة الفكرية - المرونة - الاصاله).
- استمارة المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وقد استخدمت الباحثة هذه الأدوات لأنها تغطي الفروض التي افترضتها في دراستها وتلائم اتجاهات البحث، فالمقابلة فرصة للتعرف على العديد من العوامل النفسية والاجتماعية للشخص المدمن، ومقاييس العصابية والانحراف السيكوباتي من مقياس الشخصية المتعدد الأوجه والتي افترضت الباحثة وجودها في مدمني المخدرات بصورة مرتفعة عن غيرهم من غير المدمنين. وكذلك مقياس الانحراف السيكوباتي والذي قررت معظم الدراسات أنها سمة مميزة لمدمني المخدرات، وأستخدمت كذلك استبيان مستوى الطموح لقياس مدى توافر هذه السمة من سمات الشخصية عند مدمني المخدرات دون غيرهم من دون المدمنين. وقد استخدمت الباحثة استمارة المستوى الاجتماعي والاقتصادي لوصف السمات الاجتماعية والاقتصادية للمدمنين ومقارنتها بغيرهم.

وصف الأدوات :

١ - استمارة المقابلة : (ملحق رقم ٨)

قامت الباحثة بتصميم استمارة للتعرف على العديد من العوامل

المتعلقة بالإدمان وذلك بعد مقابلتها لعدد من مدمني المخدرات قامت بعمل مقابلة حرة معها حددت منها بنود الاستمارة وعدد أسئلة كل بند وقامت بعد ذلك بتطبيق الاستمارة على ثلاثة من المدمنين الذين استوعبوا كل بنودها، ثم عرضتها على مجموعة من الأطباء النفسيين اللذين يعملون فى ميدان معالجة المدمنين وكذلك الاخصائيين النفسيين والأجتماعيين من العاملين بهذا الميدان أيضاً، وبناءً على توجيهاتهم تم تعديل الاستمارة وكانت كل تعديلاتهم متضمنة طول بنود الاستمارة، وجعل الأسئلة مفتوحة الاجابات.

وبعد إجراء هذه التعديلات وتصميم الصورة النهائية للاستمارة كانت كالآتى:

عدد أسئلتها	اقسام بنود الاستمارة
١٨	١ - بيانات عن الحالة الاجتماعية والمدينة
١٤	٢ - بيانات عن التاريخ الإدمانى للحالة
١٠	٣ - بيانات عن إدمان المخدر
٤٣	٤ - آثار المخدر على الشخص
١٢	٥ - آثار الإدمان على الجنس
١٠	٦ - مشكلات المدمن

ويتضح من ذلك أن عدد أسئلة الاستمارة (١٠٧) سؤالاً وضعت لقياس العديد من الأسمات عند المدمن.

٢ - اختيار الشخصية المتعدد الأوجه : (ملحق رقم ٤).

قام بوضع هذا الاختبار هاناواى وماكنلى، وقد ترجمه الى اللغة العربية لويس كامل مليكة وآخرون، والاختبار يفيد كأداة للتشخيص السيكياتري ويغطى بصورة موضوعية نظامية جوانب متعددة من السلوك أكثر مما

يتحقق عادة في المقابلة الأكلينيكية، ويشمل الاختبار ٥٦٦ عبارة تغطي مدى واسعاً من الموضوعات تتناول الجوانب المختلفة في الشخصية مثل: الصحة العامة، والنواحي الصحية الخاصة بما فيها من أجهزة الجسم المختلفة، والعادات، والعائلة، والزواج، المهنة، التعليم، والاتجاهات الجنسية والاجتماعية والدينية والسياسية والنزعات السادية والماسوكية والهواجس والهلاوس والخوف المرضية، وكذلك الحالات الانفعالية المختلفة بما فيها حالات الانقباض والحالات الوسواسية والقهرية، وكذلك الروح المعنوية، وما يتصل بالذكورة والانوثة واتجاه المفحوص نحو الاختبار.

وقد صنفت هذه العبارات في أربع مقاييس صدق يرمز إليها بالرموز (١، ل، ف، ك) وعشرة مقاييس أكلينيكية.

١ - مقياس (١) عبارة عن عدد العبارات التي لم يجب عنها المفحوص بنعم أو لا والدرجات الكبيرة على هذا المقياس تدل على أن عدداً من الأسئلة التي تخص المقاييس الأكلينيكية لم يجب عنها، وفي هذه الحالة لا يمكن الاعتماد على إجابات المفحوص لعدم صدقها.

٢ - مقياس (ل) وارتفاع درجات هذا المقياس تدل على أن القيم الفعلية للمقاييس الأكلينيكية أعلى من القيم التي حصلت عليها الحالة.

٣ - مقياس الصدق (ف) وهو يستخدم أساساً لتقدير صدق الاختبار الكلي وعندما تكون الدرجة (ف) عالية فإن المقاييس الأكلينيكية تكون غير صادقة.

٤ - مقياس (ك) ويستخدم أساساً لبعض المقاييس الأكلينيكية.

إلى جانب المقاييس العشرة الأكلينيكية وستعرض الباحثة لها عرضاً سريعاً على أن تعرض ببعض التفصيل بعد ذلك للمقاييس المستخدمة في هذا البحث.

١ - مقياس توهم المرض (هـ س Hypochondriasis) :

وهو مقياس خاص بالاهتمام الشاذ العصائى لوظائف الجسم والذي ليس له أي اساس عضوى، ويتميز الأفراد الذين يحصلون على درجة عالية فى هذا المقياس بالتمركز حول الذات، وعدم التضج فى معاملة المشكلات والاستجابات الغير مناسبة فى المسائل الخاصة بأبدانهم.

٢ - مقياس الاكتئاب (د Depression) :

ويتميز الأفراد الذين يحصلون على درجات عالية بأنهم منشغلين بالموت والانتحار ، وهبوط الروح المعنوية ، والتشاؤم، والاحساس بخيبة الأمل، وعدم القدرة على إظهار التفاؤل العادى والافتقار إلى الثقة بالنفس.

٣ - مقياس الهستيريا (هـ س Hysteria) :

فإن أصحاب الدرجات العليا يضموا أفراد مروا بخبرات من الضعف والأغماء ومن المحتمل أن يظهر الفرد هذه الأعراض مدارة لمسئولياته وصراعاته، وكذلك فإن هؤلاء الهستيريين يكونوا من المحتمل أقل نضجاً من الناحية السيكولوجية من أي فئة أخرى.

٤ - مقياس الانحراف السيكوباتى (ب د Psychopathic Deviation) :

والأفراد الذين يحصلون على درجات عالية فى هذا المقياس يميلون الى ارتكاب الأعمال الاجتماعية والاخلاقية بغض النظر عن خسارتهم الشخصية، كما أنهم يتشابهون مع أفراد أظهروا عدم الاكتراث بالعرف الاجتماعى وعدم الاستفادة من تجاربهم.

٥ - مقياس الذكورة - الانوثة (م . ف Masculinity - Femininity) :

ويدل ارتفاع الدرجة على هذا المقياس لكل من الذكور والإناث على انحراف فى نمط الاهتمام بالجنس الآخر وليس من الضرورى وجود جنسية مثلية إلا إذا كانت هناك قرائن أخرى.

٦ - مقياس البارانويا (ب أ Paranoia) :

ويقابل هذا المقياس بين استجابات جماعة من الأفراد العاديين ومجموعة من المرضى الذين اتصفوا بأوهام العظمة والاضطهاد والشك والحساسية الزائدة.

٧ - مقياس السيكاثينيا (ب ت Psychasthenia) :

ويتميز من يحصلون على درجات مرتفعة على هذا المقياس بوجود مخاوف مرضية أو سلوك قسرى مثل غسل اليد، الوسواس، والمخاوف الشاذة والاحساس بالذنب، وصعوبة التوصل إلى قرارات، وصعوبة التركيز، وعدم الواقعية في المستويات الأخلاقية، ونقد الذات ويشقون من أنفسهم ما لا يستطيعونه فعلاً.

٨ - مقياس الفصام (س ك Schizophrenia) :

والأشخاص الفصاميون ينقطعون في حياتهم الشخصية عن الواقع، ويتصفون بالعزلة الاجتماعية عن الناس، وعادة ما يوصف هؤلاء بأنهم باردون، غير ودودين ويوجد ارتباط قوى بين هذا المقياس ومقياس السيكاثينيا.

٩ - مقياس الهوس الخفيف (م أ Hypoimania) :

يتميز المريض ذو الهوس الخفيف بأنه ذو طموح عال وزيادة الانتاجية، والنشاط الزائد والاستثارة الانفعالية، والأفكار الطيارة، ويعتبر مريضاً خطيراً لأنه يعد بعيداً عن السلوك السوى، ونجد أنه من الصعب أن نميز بين هؤلاء الأفراد وبين الأسوياء من الطموحين والنشيطين.

١٠ - مقياس الانطواء الاجتماعي (س . ي Social Introversion) :

ويقاس الميل إلى الاتصالات الاجتماعية والمسئوليات، وعادة ما يظهر على هذه الحالات عدم الراحة في المواقف الاجتماعية وعدم الميل إلى الآخرين، كما أنهم يظهرون حساسية وعدم أمن وحذر غير محدد الوجهة

وعادة ما سكرور دفعاهم ٠٠ عر ، اتهم وكل هذا مرتبط بسلوك انطواي
: تأكيد ند لحقيق الداب

وتمثل المقاييس الاكليسكيه الثلاثه (الهستيريا - بوهم المرض
الانقباض ، مثلث العصاب ،

وهى مقاييس تستخدم منفصلة لقياس أنواع من العصاب. وإلى جانب
هذه المقاييس الأصلية فهناك المثات من المقاييس الفرعية منها ، مقياس
التعصب ، مقياس المسئولية ، مقياس ألم أسفل الظهر ، مقياس الاعتماد ،
مقياس قوة الأنا ، مقياس قوة المكانة الاجتماعية.... الخ^(١).

الاختبار كما استخدمته الباحثة : (ملحق رقم ٦)

■ اختارت الباحثة من الاختبار ٤ مقاييس تلائم ما وضعته من فروض
ليبحثها ، وهى المقاييس الثلاثة التى تمثل مثلث العصابية (توهم المرض ،
هستيريا ، اكتئاب) ومقياس الانحراف السيکوباتى.

■ ونظراً لأن اختبار الشخصية المتعدد الأوجه قد صيغت كل بنوده
باللغة العربية لفصحى ، وقد لاحظت الباحثة فى دراستها الاستطلاعية أن
معظم أفراد عينتها من مدمنى المخدرات لا يعرفون القراءة والكتابة وكان
من الصعب عليهم فهم عبارات المقاييس لذلك قامت الباحثة باعادة
صياغة بنود المقاييس المستخدمة باللغة العامية مستعينة فى ذلك
بالنسخة الامية التى أعدها د / سامى هنا .

■ قامت الباحثة باستخراج العبارات التى تقيس المقاييس الأربعة
وذلك باستخدام مفاتيح التصحيح الخاصة بكل مقياس ، بعد وضع المفتاح
الخاص بكل مقياس على ورقة الاجابة ووضع علامة على الأسئلة الخاصة
كل من هذه المقاييس الأربعة.

١٦ نوبس كامل عليكة . محمد عاد الدين اساعيل . عطية محمود هنا . ١٩٧٤ . طببات
اختبار الشخصية المتعدد الأوجه : القاهرة : النهضة المصرية . ص ص ٢٢ - ٤٣

■ قامت الباحثة أيضاً باستخراج نفس العبارات المقابلة من النسخة العامة وبذلك تكون الباحثة قد حصلت على نسخة للمقاييس الأربعة باللغة المصرية العامة وكان عدد الأسئلة ١٥٤ سؤالاً للمقاييس الأربعة.

■ قامت الباحثة بتعديل بعض العبارات في النسخة العامة وذلك لتوضيحها بصورة أكبر لمدمني المخدرات مع عدم المساس بجوهر العبارة وهذه العبارات المعدلة هي أرقام : ٦، ٧، ٨، ١٢، ١٦، ٢٣، ٢٩، ٣٦، ٤٢، ٧٢، ١٠٣، ١٨٢، ١٨٨، ١٩١، ٢٤٣.

■ قامت الباحثة بحساب صدق وثبات لهذه المقاييس الأربعة كالآتي:

أولاً - الصدق :

(أ) مقياس توهم المرض :

قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة قوامها خمسة وثلاثون طالباً من طلاب الفرقة الرابعة بقسم علم النفس بنسختيه العامة والفصحى، وبعد التصحيح حسب قيمة (ت) ومعامل الارتباط بين التطبيقين وكانت النتائج كالآتي:

١ - نتائج حساب دلالة الفروق بين التطبيقين (قيمة ت) سببها الجدول التالي:

جدول رقم (١٨)

بوضح دلالة الفروق بين التطبيقين (ت)

المقياس	النسخة العربية			النسخة العامة			ت	دالتها
	١م	١ع	١ن	٢م	٢ع	٢ن		
توهم المرض	٨٠٢٦	٤٩٩	٣٥	٨٠٤	٤٩٦١	٣٥	١٤٣ر	غير دالة

وقد استخدمت المعادلة التالية للحصول على قيمة ت :

$$T = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{S_1^2 + S_2^2}{n - 1}}}$$

حيث M_1 = المتوسط الحسابي للمجموعة الاولى.

M_2 = المتوسط الحسابي للمجموعة الثانية.

S_1 = الانحراف المعياري للمجموعة الأولى.

S_2 = الانحراف المعياري للمجموعة الثانية

n = عدد أفراد العينة.

وكانت قيمة (ت) في الجدول السابق غير دالة عند المستويين ٠.١ ، ٠.٥ ، مما يشير إلى عدم وجود فروق بين درجات الطلاب في المقياسين العامي والفصحي أي عدم وجود فروق بين المقياس باللغتين العامية والفصحى.

ثم قامت الباحثة بحساب معامل الارتباط بطريقة سبيرمان/ براون بين نتائج الاختبار بلغتيه العامية والفصحى وكانت نتائج معامل الارتباط كما يوضحها الجدول التالي رقم (١٩):

جدول رقم (١٩) يوضح قيمة معامل الارتباط

بين نسختي الاختبار (توهم المرض) العامية والفصحى

ن	مجد ص	مجد ص	مجد ص	مجد ص	مجد ص	مجد ص	مجد ص	مجد ص	ت	دالتها
٣٥	٢٨٤	٢٨٩	٣٣٣	٣٢٠١	٨٠٦٥٦	٨٢٥٢٩	٣٢٤٧	٨٢٠٧٦	٩٨	دالة

وقد استخدمت المعادلة التالية لحساب معامل الارتباط القيم الخام.

ن مج س ص - مج س مج ص

$$r = \frac{\sqrt{[n \text{ مج س}^2 - (\text{مج س})^2] [n \text{ مج ص}^2 - (\text{مج ص})^2]}}{n \text{ مج س مج ص}}$$

حيث r = معامل الارتباط

مج س = مجموع درجات الاختبار بالنسخة العامة

مج ص = مجموع درجات الاختبار بالنسخة الفصحى

س² = تربيع درجات النسخة العامة

ص² = تربيع درجات النسخة الفصحى

(س)² = مربع مجموع درجات الاختبار بالنسخة العامة (س)

(ص)² = مربع مجموع درجات الاختبار الثانى بالنسخة الفصحى

(ص)

س ص = مجموع حاصل ضرب الدرجات المتقابلة فى الاختبارين

مجم س × مج ص = حاصل ضرب مجموع درجات الاختبار الأول س ×

مجموع درجات الاختبار الثانى ص

وكانت نسبة r : دالة ومعامل الارتباط مرتفع.

(ب) مقياس الاكتساب :

وبعد تطبيق هذا المقياس بنسختيه العامة والفصحى علي نفس

المجموعة من طلاب الفرقة الرابعة قسم علم النفس وقوامها خمسة

وثلاثون طالباً تم تصحيح المقياس وحساب قيمة (ت) بين الاختبارين

وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٢٠) :

جدول رقم (٢٠) يوضح دلالة الفروق بين الاختبارين (ت)

المقياس	النسخة العربية			النسخة العامية			ت	دالتها
	١م	١ع	ن	٢م	٢ع	ن		
الاكتساب	١٧,٢١	٥,٧١	٣٥	١٧,١٤	٦,١٩	٣٥	٤٤١ر	غير دالة

وكانت قيمة (ت) غير دالة عند مستوى دلالة ٠.١ ر ولا ٠.٥ ر مما يدل على عدم وجود فروق بين النسختين العامية والفصحى، وقد قامت الباحثة بحساب معامل الارتباط للقيم الخام للاختبار بنسختيه وكانت النتائج كما يوضح الجدول التالي رقم (٢١):

جدول رقم (٢١) يوضح معامل الارتباط بين نسختي الاختبار

ن	مجد	مجد	٢(س	٢(ص	٢(س	٢(ص	مجد	مجد	ر	دالتها
٣٥	٦٠٠	٦٠٣	١١٥٧٨	١١٤٠٣	٣٦٠٠٠	٣٦٣٦٠٩	١١٣٤٠	٣٦١٨٠٠	٨٨١ر	دالة

(ج) مقياس الهستيريا :

وبحساب قيمة (ت) بين نسختي اختبار الهستيريا كانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٢٢) :

جدول رقم (٢٢) يوضح دلالة الفروق بين نسختي الاختبار (ت)

المقياس	النسخة العامية			النسخة العربية			ت	دالتها
	٢م	٢ع	ن	١م	١ع	ن		
هستيريا	١٤,٥٧	٤,٦٤	٣٥	١٥,٧١	٥,٢٩	٣٥	١٣٧ر	غير دالة

وكانت قيمة (ت) غير دالة عند مستويين الدلالة ٠.١ ر ، ٠.٥ ر.

وكانت نتائج حساب معامل الارتباط للقياس الخامس، كما يوضحها الجدول الآتي رقم (٢٣):

جدول رقم (٢٣) يوضح قيمة معامل الارتباط بين نسختي الاختبار

ن	مجدس	ص	٢م	٢(س	٢(ص	٢(س	مجدس	ر	دالتها
٣٥	٥٥٠	٥١٠	٩٦١٨	٨١١٢	٣٠٢٥٠٠	٢٦٠١٠٠	٨٦٤١	٢٨٠٥٠٠	٧٨٤ دالة

وكان معامل الارتباط عال ومرتفع.

(د) مقياس الانحراف السيكوباتي :

وكانت نتائج حساب قيمة (ت) بين نسختي الاختبار العامة والفصحي كما يوضحها الجدول التالي رقم (٢٤) :

جدول رقم (٢٤) يوضح دلالة الفروق بين نسختي الاختبار

العامة والفصحي

انحراف سيكوباتي	النسخة العامة			النسخة الفصحي			ت	دالتها
	١م	١ع	ن	٢م	٢ع	ن		
٩ر٤	٤ر٢٦	٣٥	٨ر٤	٢ر٧٩	٣٥	١ر١٥	غير دالة	

وكانت قيمة (ت) غير دالة عند مستويين الدلالة ٠.١، ٠.٥ مما يشير إلى عدم وجود فروق جوهرية بين نسختي الاختبار العامة والفصحي.

وبحساب الصدق بطريقة معامل الارتباط كانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٢٥):

جدول رقم (٢٥) يوضح معامل الارتباط بطريقة سبيرمان/براون
بين نسختي الاختبار العامية والفصحى

ن	مجدس	ص	ص ^٢	ص(ص ^٢)	ص ^٢ (ص)	ص ^٢ (ص ^٢)	ر	دالتها
٣٥	٣٢٩	٢٩٣	٣٧٢٨	٢٨٦٩	١٠٨٢٤٩	٨٥٨٤٩	٠.٧٢٩	دالة

وكان معامل الارتباط دال ومرتفع وموجب .

ثانياً - الثبات :

وقد تم حساب معامل ثبات المقاييس الأربعة عن طريق التجزئة النصفية لأسئلة الاختبار زوجي وفردى وحسب معامل الثبات بطريقة رولون للتجزئة النصفية وكانت كالاتى:

$$r_{\text{أأ}} = \frac{1 - E^2}{E^2}$$

حيث يدل رأأ على معامل الثبات.

ويدل ع^٢ق على تباين فروق درجات النصفين.

ويدل ع^٢ على تباين درجات الاختبار.

$$r_{\text{أأ}} = \frac{1}{N} [(N - 1) - (E^2)]$$

وكانت نتائج حساب الثبات للمقاييس الأربعة كما توضحها الجداول التالية :

(أ) توهم المرض :

وبحساب معامل الثبات لمقياس توهم المرض بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة رولون للتجزئة النصفية كانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٢٦):

جدول رقم (٢٦) يوضح معامل حساب الثبات لمقياس توهم المرض

ن	ن	ع ٢	ع ٢	أ أ	ز ف	دالاتها
٣٥	١٢٢٥	٦٩٤٢	٢٧٣٢	٧٥٠	٨٦	دالة

وكان معامل الثبات $رأأ = ٧٥$ وهو معامل ثبات مرتفع ومنوجب كما يوضحه قيمة جداول الدلالة حيث كانت $ز ف = ٨٦$

(ب) الاكتئاب :

وكان معامل الثبات لمقياس الاكتئاب عن طريق التجزئة النصفية باستخدام معادلة رولون للتجزئة النصفية كما يوضحه الجدول التالي رقم (٢٧):

جدول رقم (٢٧) يوضح معامل ثبات مقياس الاكتئاب

باستخدام معادلة رولون للتجزئة النصفية

ن	ن	ع ٢	ع ٢	أ أ	ز ف	دالاته
٣٥	١٢٢٥	٤٣٤	٣٧٥	٨٨	٩٤	

ز ف = ٩٤

(ج) مقياس الهستيريا :

وكان معامل الثبات لمقياس الهستيريا باستخدام معادلة رولون للتجزئة النصفية كما يوضحه الجدول التالي رقم (٢٨) :

جدول رقم (٢٨) يوضح قيمة معامل الثبات لمقياس الهستيريا

ن	٢ن	٢ع ق	٢ع	ر أ أ	ر ف ز
٣٥	١٢٢٥	١٠.٠٩	٢٧,٣٠	٦٣ر	٧٧ر

وهو معامل ثبات مرتفع وموجب.

(د) مقياس الانحراف السيكيوباتى :

وكان معامل الثبات لمقياس الانحراف السيكيوباتى باستخدام معادلة رولون للتجزئة النصفية كما يوضحه الجدول التالى رقم (٢٩):

جدول رقم (٢٩) يوضح معامل الثبات لمقياس الانحراف السيكيوباتى

ن	٢ن	٢ع ق	٢ع	ر أ أ	ر ف ز
٣٥	١٢٢٥	٦,٣٧	١٦,٤٢	٦١ر	٦٩ر

وكانت معاملات الثبات للمقاييس الأربعة مرتفعة وموجبة وذلك كما أوضحتها جداول الدلالة (٣٦ : ٦٦).

■ وصف المقاييس المستخدمة : (ملحق رقم ٦ ، ٧).

١ - مقياس توهم المرض :

وهو مقياس لقياس لاهتمام الزائد بالوظائف الجسمية والقلق الذى لا يستند إلى سبب على صحته، فيشكو الفرد غالباً من آلام واضطرابات يصعب تبينها، ولا يوجد لها أساس عضوى واضح، ومن خصائص المتوهم للمرض أن يكون ناقص النضج فى معالجته لمشكلات الراشدين، ولا يستجيب لها بالاستبصار الكافى.

وتكاد الزملة المتضمنة فى هذا المقياس تكون شبيهة بالفئة التشخيصية القديمة من العصاب وهى النيوراسثينيا.

والدرجة المرتفعة الصادقة على هذا المقياس تعبر - على الأقل - عن محاولة للاطمئنان، وفي الحالات الشديدة للتنفيس عن التوهم المتصل بالمرض الجسدي. والأنماط الممثلة لتوهم المرض تكون أحياناً جانباً بارزاً من الفصام. وغالباً تكون شائعة في الانقباض أيضاً، وعادة تنخفض الدرجة على مقياس توهم المرض دون محاولة علاجية معينة إذا اختفى الانقباض. ولكن أحياناً يكون توهم المرض هو المصدر الأساسي للانقباض. وبذلك تنعكس العملية الدينامية، أي أن خوف المريض على صحته الجسمية قد يكون مصدر الانقباض. وبينما نجد المرضى الذين يعانون فعلاً من مرض جسمي يسهل إثباته والتيقن من وجوده يحصلون عادة على درجة عالية في مقياس الهستيريا، بسبب شكواهم النفسية من المرض، وقد وجد أن الأشخاص من ذوي الدرجات المرتفعة على المقياس (هـ س، الهستيريا) يوصفون من يعرفون بتعدد الاهتمامات وبالأقبال على الناس وبالعطف والنظام والاعتراف بالجميل. ويختلف توهم المرض عن الهستيريا في أن متوهم المرض، يكون غالباً أكثر غموضاً من الهستيريا في وصف شكواه، كما أنه لا يظهر دليلاً واضحاً على أنه يستعين بالأعراض على الخروج من مأزق أو موقف غير مقبول كما يفعل الهستيريا. ومتوهم المرض يكون له غالباً تاريخ طويل من المبالغة في شكواه الجسمية.

وقد تتحسن الدرجة المرتفعة على هذا المقياس غالباً نتيجة للعلاج السيكلولوجي إلا أن النمط الأساسي للشخصية لا يمتثل أن يتغير تغيراً كبيراً والمرضى العضوي المعتاد لا يرفع درجة الشخص ارتفاعاً كبيراً لأن المقياس يكشف عن الفروق بين المريض عضوياً وبين متوهم المرض.

٢ - مقياس الاكتئاب :

يرتبط هذا المقياس بالزميلات الانقباضية المختلفة، وقد استخرج هذا

المقياس أساساً من استجابات المرضى الانقباضية. والذين يعاسون من حالات الجنون الدوري والدرجة المرتفعة على المقياس تدل على انخفاض في الروح المعنوية مع الشعور باليأس والعجز عن النظر إلى المستقبل نظره عادية متفائلة، وقد يكون الانقباض هو العجز الرئيسي عند المفحوص أو قد يكون مصاحباً أو نتيجة لاضطرابات أخرى في الشخصية. وفي حالات معينة قد يغيب الانقباض عن الملاحظة العارضة، وهو ما يسمى (بالانقباض الباسم) وفيه ترتفع الدرجة على المقياس رغم أن المريض قد ينكر وجود الانقباض إذا سئل سؤالا مباشراً. ويتكشف الانقباض في مثل هذه الحالات عن طريق نظرة الشخص إلى المستقبل وغالباً ما يصير مثل هؤلاء الأشخاص على أن اتجاهاتهم وحدها الاتجاهات الواقعية، حيث أن الموت محتوم، والزمن ينقضي والدرجة المرتفعة على المقياس لها دلالة أخرى مميزة للشخصية، لأن الشخص الذي يستجيب استجابة انقباضية للشذائذ يتميز بنقص في الثقة بالنفس، ونزعة إلى القلق وضيق في الاهتمامات وانطواء، ويرى البعض أن الانتحار يكون أمراً مرجحاً، إذا كانت الدرجة على المقياس مرتفعة نوعاً ما ولكن المريض لا يسلك سلوك المنقبض.

وبعض الأشخاص ممن يحصلون على درجات مرتفعة على هذا المقياس يستجيبون بسرعة للتحسين في بيئاتهم أو للكلام الدارج، أو للعلاج النفسي، إلا أن مثل هؤلاء الأشخاص يحتمل غالباً أن يظلوا عرضة للانقباض، أما العدد الأكبر من الأفراد، فإنه لا يستجيب استجابة سريعة للعلاج، ولكن درجاتهم تتجه ببطء مع الزمن نحو السواء. وقد وجد أن أهم الصفات التي نسبت إلى من حصلوا على درجات مرتفعة على هذا المقياس هي القلق، الصراحة، التواضع، الكرم، الحساسية، شدة العاطفة، تقدير الجمال، أما الذين حصلوا على درجات منخفضة، فقد وصفوا بالمرح أو التكيف، والثقة بالنفس، التعاون، والسلوك غير المتكلف.

٣ - مقياس الهستيريا (ه ي) :

يقيس مقياس الهستيريا درجة تشابه المفحوص بالمرضى اللذين تظهر عليهم أعراض الهستيريا التحويلية. وقد تأخذ هذه الأعراض صورة شكاوى عامة منتظمة أو شكاوى أكثر تحديداً وتخصيصاً مثل الشلل، التقلصات، الاضطرابات المعوية أو الأعراض القلبية، والأفراد الذين يحصلون على درجات مرتفعة على هذا المقياس معرضون أيضاً - على وجه الخصوص - لنوبات مفاجئة من الضعف والاعياء، أو حتى ما يشبه نوبات الصرع.

وقد لا تظهر مطلقاً أعراض واضحة محدودة علي شخص يحصل على درجة مرتفعة في المقياس، ولكنه في وقت الشدة يحتمل أن تظهر عليه الأعراض الهستيرية بوضوح. وأن يلجأ إلى حل المشكلات التي تواجهه عن طريق هذه الأعراض. وقد وجد أن هذا المقياس يعجز عن تمييز عدد صغير جداً من حالات الهستيريا التحويلية غير المعقدة، والتي قد تكون واضحة جداً اكلينيكيًا. ورغم أن التخلص من الأعراض الهستيرية، يكون أيضاً بصورة تقرب من أن تكون معجزة، إلا أن احتمال عودتها إلى الظهور يظل قائماً إذا استمرت أو إذا عادت الشدائد مرة أخرى. وقد وجد أن الأشخاص الذين يحصلون على درجات مرتفعة على مقياس الهستيريا، يوصفون عادة بالصراحة، وكثرة الكلام، والتحمس، والميل للمجتمعات، والمخاطرة، والود والقلق. أما الأشخاص الذين يحصلون على درجات منخفضة على المقياس فإنهم يوصفون عادة بالتواضع لدرجة ملحوظة، وبالاهتمامات المحدودة.

٤ - مقياس الانحراف السيكوباتي (ب د) :

يقيس هذا المقياس درجة تشابه المفحوص بجماعة السيكوباتيين اللذين تتمثل صعوبتهم الرئيسية في نقص الاستجابة الانفعالية العميقة، وفي عدم القدرة على الافادة من الخبرة، وعدم المبالاة بالمعايير الاجتماعية ورغم أنهم يكونون أحياناً خطرين على أنفسهم أو على الآخرين، إلا أنهم

يكونون عادة أذكياء ومحبوبين. وهم بغير مقياس موضوعي مثل هذا المقياس قد يظلون أحياناً لمدة طويلة دون اكتشاف أمرهم إلا حين يقعون فى مشكلات خطيرة. وقد يسلكون مسلك الأسوياء سنين عديدة بين كل أزمة وأخرى. وتنحصر أخطر أوجه انحرافهم عن المعايير الاجتماعية فى الكذب، والسرقة، إدمان الخمر والمخدرات والشذوذ الجنسى. وقد تمر بهم فترات من الهياج السيكيوباتى الحقيقى، أو الانقباض بعد اكتشاف شذوذهم. ولكنهم يختلفون عن بعض فئات المجرمين فى عدم قدرتهم على الافادة من الخبرة، وفيما يبدو من أنهم يرتكبون أفعالهم من غير تفكير فى كسب محتمل لأنفسهم أو دون تجنب اكتشاف أمرهم.

ولا يجدى أي علاج على وجه الخصوص- فى تحسين حالات الأشخاص ذوى الدرجات المرتفعة على هذا المقياس. وقد يبذل الاكلينيكي مجهوداً ضخماً ويهتم اهتماماً عميقاً بالمريض، ولكنه يفشل فى أن يتلقى مقابل ذلك أكثر من مجرد ولاء سطحي عابر.

ويبدو المنحرف السيكيوباتى للملاحظ أنه ينشد خبرات خطيرة فى محاولة منه للاحساس بمشاعر انفعالية مثل تلك التى يحسها الشخص العادى. وقد ينتحر أو يشرع فى الانتحار، إلا أن مصدر ذلك الفراغ الانفعالى أكثر من أن يكون انقباضاً عنيفاً أو اعترافاً بالفشل. وبينما يستطيع الفرد أن يعبر لفظياً عن عواقب سلوكه إلا أنه يفشل غالباً فى تقدير دلالة هذا السلوك فى إطار التوافق الاجتماعى على المدى الطويل.

وإذا ما وجد الانقباض، فإنه يعبر عادة عن خوف من العقاب العاجل، وفقدان الحرية أكثر مما يكون شعوراً بالذنب أو الأسف أو ما شابه ذلك، وتشيع غالباً النزعة إلى لوم الآخرين أو التماس الأعذار لما أرتكبوا من أعمال وهم يدعون أن الآخرين قد ضللوهم عن الطريق السوي، واستغلوا براءتهم وأن تأنيب الأسرة لهم كان من القسوة لدرجة اضطرتهم للثورة،

والفرد في مجموعة الانحراف السيكوباتي نظراً لثقته الفائقة في قدراته، فإنه يحس بأنه مضطهد من المجتمع حين يعاقب على سلوكه.

وإذا كانت الدرجة على مقياس الانحراف السيكوباتي مرتفعة ارتفاعاً كبيراً عن بقية المقاييس، وكان المفحوص صغير السن نسبياً، فإن الاحتمال قليل في أن يستطيع تجنب الاصطدام بالقانون، إذا لم يخضع لرقابة صارمة. وفي التعامل مع المنحرف سيكوباتياً يجب عدم الضغط على صغار السن لتحقيق مستويات مرتفعة من التحصيل المدرسي أو النجاح المهني حتى إذا كانت قدراتهم تسمح بذلك، ولعل وضع الحالات الخطيرة في المؤسسات ليس أكثر من وسيلة لوقاية المجتمع ووقايتهم. وقد نجد بعض الناس من ذوي المهن الراقية يحصلون على درجات مرتفعة على هذا المقياس. إلا أن أزماتهم - إذا وجدت - بتجاهلها الآخرون أو تخفى بعناية. وقد وصف الأشخاص ذوي الدرجات المرتفعة على هذا المقياس بالاقبال على المجتمع، والصراحة، وكثرة الكلام، والمخاطرة، وحب الكحول، والفردية.

بينما وصف الأشخاص ذوي الدرجات المنخفضة بأنهم حادون عاطفيون، يراعون التقليد، متزنون، ذو اهتمامات محدودة.^(١)

٣ - اختبار الذكاء المصور : (ملحق رقم ١)

■ تعريف الاختبار :

هذا الاختبار من النوع غير اللفظي الجمعي، فهو غير لفظي لأنه لا يعتمد على اللغة إلا كوسيلة في شرح تعليمات الاختبار، والمقصود منه للأفراد اللذين يطبق عليهم الاختبار.

(١) لويس كامل ملبية، محمد عماد الدين إسماعيل، عطية محمود هنلي، ١٩٧٤ : تعليمات اختبار الشخصية لاتعدد الأوجه، القاهرة، النهضة المصرية.

أما أداء الأفراد في الاختبار، فمسه فلا يخضع لأي عامل لغوي أو مهارة في اللغة، لأن هذه العلاقة أصلاً علاقه نشابه أو اختلاف بين وحدات الاختبار، حيث أن استلته الاحسب عن صور يطلب من المفحوص أن يدرك العلاقة بينهما

والاختبار جمعى لأنه يمكن تطبيقه على عدد من الأفراد أو جماعة منهم فى وقت واحد بواسطة فاحض واحد.

والفكرة الرئيسية التى يقوم عليها بناء الاختبار هى فكرة التصنيف، أي ينظر الفرد إلى الأشكال الخمس الموجودة فى شكل سطر، ثم يحدد علاقة التشابه بينها، وينتقى أحد الأشكال من حيث أنه المختلف عن الأشكال الأربعة الأخرى، وقد زوعى قى تصميم الاختبار خلوه من أي عنصر لا ينتمى إلى البيئة المصرية.

الهدف من الاختبار :

■ يهدف هذا الاختبار إلى تقدير القدرة العقلية العامة لدى الأفراد فى الأعمار من سن الثامنة إلى السابعة عشر وما بعدها - ويعتمد أصلاً على إدراك العلاقة بين مجموعة من الأشكال وانتقاء الشكل المختلف من بين وحدات المجموعة، وقد ثبت فى الميادين المختلفة التى استعمل فيها الاختبار أنه مفيد جداً فى حالات التشخيص الأولى، وتتضاعف فائدة هذا الاختبار حيث تتوافر فيه الشروط التالية:

■ من حيث أنه اختبار غير لفظى لا يعتمد على اللغة فى الإجابة عليه وبالتالي يمكن تطبيقه دون اعتبار للمستوى الثقافى للأفراد.

■ أنه يمتد فى مرحلة زمنية كبيرة إذ يصلح للتطبيق ابتداءً من سن الثامنة إلى ما بعده - ومن المعروف علمياً أن الاختبارات الجمعية لا تكون مقاييس صالحة قبل سن الثامنة:

طريقة انتصحيح واستخراج المعايير :

مفهوم السنة الزمنية في هذا الاختبار هو السنة الزمنية العادية، بمعنى أن طفل الثامنة من كان عمره ثمان سنوات أو أقل من تسع سنوات، أي أن السنة الزمنية تمتد من أول السنة إلى نهايتها.

والطريقة التي تستخرج بها نسبة ذكاء الفرد أو درجته المثوية كما يلي:

- ١ - يصحح الاختبار وفق المفتاح الخاص به.
 - ٢ - يحسب الصواب بدرجة ولا يحسب الخطأ أو المتروك.
 - ٣ - تجمع الاجابات الصحيحة.
 - ٤ - يحدد العمر الزمنى للفرد.
 - ٥ - يبحث عن الدرجة الخام التي نالها الفرد فى العمود المناسب لعمره الزمنى ونضع حولها دائرة.
 - ٦ - نقرأ المقابل المثوى أو نسبة الذكاء.
 - ٧ - بيان المعايير عبارة عن جدول مقسم إلى خانات يمثل الأعمار الزمنية من ٨:١٧ سنة ويتضمن كل عمود توزيعاً خاصاً للدرجات، ويوجد على اليمين خارج الجدول العام أرقام تدل على المثويات، أي ترتيب الفرد المثوى بين أفراد العينة المتفتحة معه فى العمر الزمنى فى هذا الاختبار، ويوجد على يسار الجدول أرقام تدل على نسبة الذكاء المقابلة.
- ويلاحظ: وبود ثلاث خطوط متقطعة الأول عند المثوى الخامس والعشرين، ويمثل حدود الفئة الدنيا فى جميع الأعمار، والثانى عند المثوى الخمسين ويمثل حدود الفئة الأقل من المتوسط، والثالث عند المثوى الخامس والسبعين ويمثل حدود الفئة فوق المتوسط، كما أن الدرجات التى تقع فوق هذا الخط تمثل أصحاب المستويات الممتازة فى هذا الاختبار.
- ولاستخراج الدرجة المثوية أو نسبة الذكاء المقابلة للدرجة الخام التى

نالها الفرد فى الاختبار، نحدد العمر الزمنى للفرد ثم ندخل العمود المخصص لهذا العمر ونبحث عن الدرجة التى نالها الفرد ثم نضع حولها دائرة ونرسم خطاً أفقياً بالمسطرة، ونقرأ الدرجة الواقعة على اليمين فتكون الدرجة المثوية، أو على اليسار وتكون نسبة الذكاء.

تقنين الاختبار :

بدأ البحث فى هذا الاختبار لقياس صلاحيته للتطبيق فيما بعد المرحلة الأولى من التعليم من سن ١٣-١٧ سنة، وقد دلت الأبحاث التى أجريت فى البيئة المصرية على أن النمو العقلى يكاد يقف فى هذا الاختبار عند سن السابعة عشر، لذلك أنجبه البحث الى قياس مدى صلاحية الاختبار للتطبيق على سن مبكرة عن ذلك.

الثبات :

حسبت معاملات ثبات هذا الاختبار فى كثير من الأبحاث التى استعمل فيها، عن طريق التجزئة النصفية أو عن طريق تحليل التباين، وتراوحت معاملات الثبات بين ٧٥ر وهى أقل قيمة، ٨٥ر وهى أعلى قيمة وهذه الأرقام تدل على معامل ثبات يمكن الوثوق به علمياً.

صدق الاختبار :

وقد حسب صدق هذا الاختبار عن طريق ارتباطه بالعديد من الاختبارات الأخرى مثل اختبارات معانى الكلمات، وإدراك المعانى، والتفكير، والقدرة العقلية العامة، والمعالجة الذهانية، وكذلك حسب الصدق العاملى فى دراستين الأولى لميسيل يونان والثانية لأمينه كاظم، وقد كان معامل الصدق ٠٦١٠ر.

المعايير :

لهذا الاختبار معياران :

الأول: انبجار المنوى.

والثانى: هو معيار نسبة الذكاء وكلاهما نوع من الموازين المطلقة التى ترد اليها الدرجات الخام.

القيمة العملية لاختبار الذكاء المصور :

■ يعتبر اختبار الذكاء المصور من أدق الاختبارات غير اللفظية من حيث قدرته على إعطاء الصورة الأولية عن المستوى العقلى العام للفرد، وخاصة أن تقنين الاختبار أعطى فترة زمنية كبيرة نسبياً يصلح الاختبار لتطبيقه فيها.

■ كذلك فإن الاختبار قد أثبت صلاحية كبرى فى تقدير المستوى العقلى للأفراد الكبار فوق عشرين عاماً إلى ستين عاماً، بغض النظر عن مقدرة هؤلاء الأفراد فى القراءة والكتابة أو أميتهم سواء كانوا رجالاً أم نساءً.

■ كذلك نجح الاختبار فى تشخيص حالات التخلف العقلى كما ثبت ذلك من الممارسة العملية فى فصول المتخلفين من نتائج تطبيق الاختبار فى السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، كذلك أعطى بهاناً فى التفرقة بين المتخلفين عقلياً.

■ وبالإضافة الى ذلك سهولة استعمال الاختبار فى مجال الدراسات السلوكية والنفسية والتربوية المختلفة.^(١)

٤ - استبيان مستوى الطموح : (ملحق رقم ٨)

عرف مستوى الطموح فى هذا الاستبيان بأنه «سمة ثابتة نسبياً تفرق بين الأفراد فى الوصول إلى مستوى معين يتفق والتكوين النفسى للفرد وإظهاره المرجعى ويتحدد حسب خبرات النجاح والفشل التى مر بها».

(١) أحمد زكى صالح، ١٩٧٤، كراسة تعليمات اختبار الذكاء المصور، القاهرة، المطبعة العالية ص ١ - ١٤٦.

وصف الاستبيان :

يحتوى الاستبيان على ٧٩ سؤالاً تتدرج تحت سبع سمات رئيسية كل منها وضع له عشرة أسئلة ماعدا السمة (الميل إلى الكفاح) لاعتبارات احصائية، وضع لها ٩ أسئلة، ثم وضعت عشرة أسئلة خاصة بالمراجعة وزعت بين باقى أسئلة الاستبيان، وفيما يلى بنود الاستبيان :

- ١ - النظرة إلى الحياة (وقد رمز لها بالرمز ن).
- ٢ - الاتجاه نحو التفوق (وقد رمز لها بالرمز ت).
- ٣ - تحديد الأهداف والخطوة (رمز لها بالرمز هـ).
- ٤ - الميل إلى الكفاح (ك).
- ٥ - تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس (س).
- ٦ - المثابرة (م).
- ٧ - الرضا بالوضع الحاضر، والإيمان بالحظ (ح).

وهذه السمات تكشف عن مستوى طموح الفرد فى ضوء ما جاء به من تجربة تأليف الاستبيان. أن الشخص الطموح يميل إلى الكفاح، نظرته إلى الحياة فيها تفاؤل، ولديه القدرة على تحمل المسؤولية، مثابر، ميال للتفوق ويسير وفق خطة معينة.

ثبات الاستبيان وصدقه :

كانت معاملات الثبات ٨٠ والصدق ٥٦ فى التجربة الأساسية لتطبيقه على عينة أختبرت عشوائياً من طلبة وطالبات كلية الآداب، جامعة عين شمس والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.

طريقة تطبيق الاستبيان :

يمكن أن يستعمل بطريقتين فردية فى جلسات خاصة أو بطريقة جماعية.

تصحيح الاختبار :

تعطى درجة واحدة لكل إجابة صحيحة وفق مفتاح التصحيح الخاص بهذا الاستبيان^(١).

٥ - اختبار القدرة على التفكير الابتكاري: (ملحق رقم ٢)

■ تصميم الاختبار :

ظهرت ثلاثة وسائل يستخدمها الباحثون في التعرف على المبتكرين:

الأولى : وفيها يعتمد الباحث على مقاييس التقدير Rating Scales مسلماً بأن الإنسان يستطيع أن يصدر حكمه على غيره بالنسبة إلى سمة معينة إذا ما أعطى تعريفاً لهذه السمة.

الثانية : وفيها يعتمد الباحث على الانتاج كوسيلة للتعرف على المبتكرين فالمبتكر هو من انتج انتاجاً اتفق المجتمع على إنه انتاج مبتكر.

الثالثة : وفيها يسلم الباحث بأن الابتكار عملية عقلية تتدخل فيها عوامل معينة، وأن هذه العوامل شائعة بين أفراد الجنس البشرى وأن اختلاف الأفراد فيها هو اختلاف في الدرجة لا في النوع، وأن هذه العوامل يمكن قياسها عن طريق مواجهة الفرد ببعض المواقف التي يستطيع أن يعبر عنها، والتي يستطيع فيها المختبر أن يلاحظ ذلك التعبير، وهنا يقوم المختبر بتحديد العوامل المقاسة ثم يصمم عدداً من المواقف مسلماً بأن هذا العدد يمثل المواقف المختلفة التي يعبر فيها عما يقاس تمثيلاً صادقاً.

وقد بنى هذا الاختبار على الوسيلة الثالثة للتعرف على المبتكرين أو من عندهم استعداد للابتكار، والتفكير الابتكاري هو نوع من التفكير

(١) كاميليا عبد الفتاح، ١٩٧٥، دراسة تعليمات استبيان مستوي الطموح، القاهرة، النهضة العربية. ص ٣ - ٥

ينطلق فيه الفرد عبر ما أصطلحت وتعارفت عليه الجماعة التي يعيش فيها الى مجالات وأفكار جديدة منتجاً انتاجاً جديداً بالنسبة إليه أو بالنسبة إليها أو بالنسبة إليهما معاً.

وقد أتضح من الدراسات أن التفكير الابتكاري يعتمد على أنواع معينة من العوامل، منها عوامل الطلاقة، والمرونة والأصالة وهي العوامل التي يقيسها الاختبار.

تعريف العوامل المقاسة :

١ - الطلاقة اللفظية : وهي القدرة على سرعة ذكر أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تتوافر فيها شروط معينة.

٢ - الطلاقة الفكرية : وهي القدرة على سرعة انتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار التي تنتمي إلى نوع معين من الأفكار والتي تحددها بنود الاختبار.

٣ - المرونة التلقائية : وهي القدرة على سرعة انتاج أكبر عدد ممكن من أنواع مختلفة من الأفكار التي ترتبط بموقف معين يحدده الاختبار.

٤ - الأصالة : وهي القدرة على سرعة انتاج أكبر عدد ممكن من الاستجابات ذات الارتباطات الغير مباشرة (البعيدة Remote Association) بالموقف المثير.

ويتكون الاختبار من خمسة اختبارات وهي :

اسم الاختبار	ما يقيسه الاختبار
اختبار الطلاقة اللفظية (١)	الطلاقة اللفظية
اختبار الطلاقة اللفظية (٢)	الطلاقة اللفظية
اختبار الطلاقة الفكرية	الطلاقة الفكرية
اختبار الاستعمالات	المرونة التلقائية
اختبار المترتبات	الأصالة

وهذه الاختبارات من النوع المفتوح حيث تترك للممتحن الحرية في كتابة الاجابات التي تمن له ويتفق هذا مع طبيعة العوامل المقاسة.

ثبات الاختبار :

استخرجت معاملات ثبات هذه الاختبارات بطريقتين:

١ - اعادة الاختبار بعد مرور فترة ثلاثة أسابيع بالنسبة إلى اختبارى
الطلاقة اللفظية.

٢ - استخدمت طريقة القسمة النصفية في حالة بقية الاختبارات ثم عدلت المعاملات المستخرجة باستخراج معادلة سبيرمان - براون.

جدول رقم (٣٠)

اسم الاختبار	الطريقة	معامل الثبات
اختبار الطلاقة اللفظية (١)	اعادة الاختبار	٠٦٢ر
اختبار الطلاقة اللفظية (٢)	اعادة الاختبار	٠٦٦ر
اختبار الطلاقة الفكرية	القسمه الى نصفين	٠٧٥ر
اختبار الاستعمالات	القسمه الى نصفين	٠٦٩ر
اختبار المترتبات.	القسمه الى نصفين	٠٨٠ر

صدق الاختبارات :

اعتمد في دراسة صدق هذه الاختبارات على طريقتين:

١ - الصدق المنطقي.

٢ - العلاقة بين اختبار القدرة على التفكير الابتكارى والتحصيل المدرسى، وذلك كما أوضحته الدراسات وكانت جميع معاملات الارتباط دالة احصائياً عند مستوى ٠.٠١.

وصف الاختبارات :

هذه الاختبارات كغيرها من اختبارات التفكير المنطلق من النوع المفتوح، أى أن المختبر حر فى كتابة الاجابة التى يرغب فى كتابتها.

زمن الاختبارات :

كل اختبار من هذه الاختبارات مقسم إلى أجزاء، يجيب عن كل جزء منها في زمن محدد، وفيما يلى الأقسام والزمن المحدد لكل منها. ^(١١)

جدول رقم (٣١)

اسم الاختبار	عدد الأجزاء	الزمن المحدد
الطلاقة اللفظية (١)	٣	٦ دقائق
الطلاقة اللفظية (٢)	٣	٦ دقائق
الطلاقة الفكرية	٤	٨ دقائق

اختبارات القدرة على التفكير الابتكارى كما استخدمت في البحث :

تبين من الدراسة الاستطلاعية أن معظم مدمنى المخدرات الذي سيتناولهم البحث يعانون من الأمية ولا يجيدون القراءة والكتابة، وكذا أفراد المجموعة الضابطة.

ونتيجة لذلك اختير من اختبارات القدرة على التفكير الابتكارى، الاختبارات النسي لا تحتاج إلى ثقافة لفظية أو قدرة لغوية عالية، فاستخدمت اختبارات الطلاقة الفكرية، المتربات، والاستعمالات.

وقد طبقت هذه الاختبارات الثلاثة فى الدراسة الاستطلاعية على عينة

(١١) عبد السلام عبد الغفار، ١٩٧٠، كراسة تعليمات قياس القدرة على التفكير الابتكارى، القاهرة، النهضة المصرية.

قوامها خمسة أفراد من مدمنى المخدرات، وكانت تقوم الباحثة بقراءة بنود الاختبارات بنداً بنداً للمفحوص وتطلب منه الاجابة وتسجل الاجابة التى ذكرها، مع حساب الزمن المستغرق، وكان المفحوصين قد استوعبوا جميع بنود الاختبارات فيما عدا بنداً واحداً من بنود اختبار المترتبة فكانت كلمة الجاذبية الأرضية التى لا يستطيع المفحوصين فهمها، فكانت الباحثة تشرح لهم هذه الكلمة قبل بداية الاختبارات جميعها. ثم تبدأ بالتطبيق بعد ذلك.

وقد طبقت هذه الاختبارات الثلاثة على عينة قوامها عشرة أفراد جميعهم من طلاب قسم علم النفس وتم التطبيق بطريقتين. الطريقة الأولى، وفيها يقوم الطالب بقراءة بنود الاختبار بنفسه ويجب عنها أيضاً مع حساب الزمن المستغرق أيضاً. وقد لوحظ أن اجابات المجموعة في مرتي التطبيق كانت متشابهة في عدد الاجابات الخاصة بكل بند من بنود الاختبارات (أي أن الفرد الذى أجاب على عشر نقاط فى الجزء الأول من اختبار الطلاقة الفكرية مثلاً بطريقة التطبيق الأولى، كان يجب أيضاً على نفس العدد من الاجابات فى طريقة التطبيق الثانية). علماً بأن الوقت المستغرق كان واحد فى المرتين.

وللتأكد من عدم وجود فروق بين طريقتى التطبيق - وأن تطبيق الاختبارات على المفحوصين الأميين على أن تقوم الباحثة بكتابة الاجابات التى يذكرونها - تم حساب قيمة «ت» لطريقتى التطبيق على كل اختبار من الاختبارات المستخدمة وكانت نتيجة حساب قيمة «ت» بين مرتي التطبيق لاختبار الطلاقة الفكرية كما يوضحها جدول رقم (٣٢):

جدول رقم (٣٢) يوضح دلالة الفروق بين طريقتي التطبيق

على اختبار الطلاقة الفكرية «ت»

الاختبار	١٢	١٤	١٥	٢٢	٢٤	٢٥	ت	دلالته
طلاقة فكرية	٢١	٤٣٩	١٠	٢٠٤	٤٦٣	١٠	٢٨	غير دالة

وكانت قيمة «ت» غير دالة عند مستويين الدلالة ٠.٠٥ ، ٠.٠١ .

وكذلك تم حساب قيمة «ت» لمرتي التطبيق على اختبار المترتبات وكانت النتائج كما يوضحها جدول رقم (٣٣)

جدول رقم (٣٣) يوضح دلالة الفروق

بين طريقتي التطبيق على اختبار المترتبات

الاختبار	١٢	١٤	١٥	٢٢	٢٤	٢٥	ت	دلالته
مترتبات	٣٢	٣٢٢	١٠	١٢٤	٢٦٢	١٠	٤٢	غير دالة

وكانت قيمة «ت» غير دالة عند مستويين الدلالة ٠.٠٥ ، ٠.٠١ .

وأيضاً لمعرفة دلالة الفروق بين طريقتي التطبيق على اختبار الاستعمالات كانت نتائج حساب قيمة «ت» كما يوضحها جدول رقم (٣٤).

جدول رقم (٣٤) يوضح دلالة الفروق

بين طريقتي التطبيق على اختبار الاستعمالات «ت»

الاختبار	١٢	١٤	١٥	٢٢	٢٤	٢٥	ت	دلالته
استعمالات	١٠٣	١٠٦	١٠	٩٧	٢٠١	١٠	٦٢	غير دالة

ويتضح من جميع نتائج حساب دلالة الفروق بين طريقتي التطبيق بحساب قيمة «ت» أنه لا توجد فروق دالة بين الطريقتين لا من حيث الزمن المستغرق ولا طريقة التطبيق.

ثبات الاختبارات المستخدمة :

بعد عرض هذه الطريقة للتطبيق على مجموعة من الأساتذة المتخصصين في علم النفس اقترحوا ضرورة حساب معامل الثبات لهذه الاختبارات المستخدمة نظراً لاختلاف عينة البحث الحالي ، عن عينة الثبات الأصلية في الاختبارات.

وقد تم حساب الثبات للاختبارات الثلاثة (الطلاقة الفكرية - المترتبات - الاستعمالات) بطريقة التجزئة النصفية بحساب معادلة رولون المختصرة لحساب معاملات الثبات. وذلك بعد تطبيق الاختبارات الثلاثة على عينة قوامها ثلاثين طالباً من طلاب قسم علم النفس الفرقة الرابعة، وقد تم التطبيق بصورة فردية، حيث كانت الباحثة تقرأ بنود الاختبار بنداً بنداً وتسجل الاجابات الخاصة بكل جزء . وكانت معاملات الثبات كما توضحها الجداول التالية :

جدول رقم (٣٥) يوضح قيمة معامل الثبات

بطريقة رولون المختصرة لاختبار الطلاقة الفكرية

الاختبار	٢ع ق	٢ع	ر أ أ	ر ف ز	دالتها
طلاقة فكرية	٢٩٣	٩٢,٦٦	٩٦٨	٩٨	دالة مرتفعة

وكان معامل ثبات هذا الاختبار مرتفع.

جدول رقم (٣٦) يوضح قيمة معامل الثبات

بطريقة رولون المختصرة لاختبار المترتبات

الاختبار	٢ع ق	٢ع	ر أ أ	ر ف ز	دالتها
المترتبات	٣١٧	٦٠,٢٨١	٩٤٧	٩٧	دالة مرتفعة

جدول رقم (٣٧) يوضح معامل الثبات
بطريقة رولون المختصرة لاختبار الاستعمالات

الاختبار	ع ٢ ق	ع ٢	ر أ	ر ف ز	دالتها
استعمالات	١٦٦٦ ر	١٦٨٤ ر	٩٠١ ر	٩٥ ر	دالة مرتفعة

وكما توضح جداول معامل الثبات السابقة فكانت جميعها مرتفعة، وقد اعتمدت الباحثة في صدق الاختبار، على الصدق المنطقي الذي أورده واضع الاختبار حيث أنها لم تتعرض لينود الاختبار بالتعديل ولم تغير من أسلوبه في شيء.

استمارة المستوى الاجتماعي الاقتصادي (ملحق رقم ٣)

أسفرت الدراسة الاستطلاعية عن عدم جدوى أدوات قياس المستوى الاجتماعي الاقتصادي الموجودة حالياً للتطبيق على عينة البحث من عدة نواحي:

■ أن معظم الأدوات التي تقيس المستوى الاجتماعي الاقتصادي للفرد من حيث أسرته، ولا تركز على الفرد نفسه، ولما كان معظم أفراد عينة البحث الحالي مستقلين عن أسرهم اجتماعياً واقتصادياً لذا كان من الضروري تصميم استمارة تغطي هذا الجانب.

■ أن فئات الدخل في الاستمارات التي تقيس المستوى الاجتماعي الاقتصادي لا تعكس الدخل الحقيقي لمعظم الطبقات الآن، وخاصة بعد سياسة الانفتاح الاقتصادي وما سببته من خلل في التركيب الاجتماعي للمجتمع المصري، حيث لم تعد المهن ذات المستوى العلمي والمؤهلات الأكاديمية هي التي تدر الدخل المرتفع، بل أصبحت المهن الحرفية هي التي تدر الدخل الوفير، وأصبح من يتربع على قمة المستوى الاجتماعي يختلف عن المتربع على قمة المستوى الاقتصادي - لذلك كان ضروري تصميم استمارة تختلف فئات دخلها، فئات الدخل الموجودة في الاستمارات السابقة وتلائم بعض الشيء جميع الطبقات.

تعريف المستوى الاجتماعي الاقتصادي :

المستوى الاجتماعي الاقتصادي يعد متغير بالغ الأهمية في مجال البحوث النفسية والاجتماعية، نظراً لما يقتزن به أو يصاحبه ويترتب عليه من أنماط سلوكية يتمثلها الفرد، وتحدد بدورها تفكيره، وتوجه استجاباته تفاعلاً وتكيفاً مع ما يتعرض له أو يعايشه في حياته اليومية وحياة مجتمعه من أحداث وتطورات. ويؤكد الكثير من الباحثين في علم النفس الاجتماعي مثل «جولدن» Golden (١٩٦٩) إلى أهمية التفاعل الذي يحدث بين الفرد ، وما يحيط به من أفراد وجماعات وأن سلوك الفرد عبارة عن محصلة لمجموعة القوى والعوامل المتفاعلة، وأن بعض هذه العوامل يرتبط بالتكوين النفسى للفرد ، وبعضها يرتبط بالبيئة التي يعيش فيها الفرد^(١).

ويختلف وضع الفرد الاجتماعي باختلاف الطبقة التي ينتمي إليها وتؤثر هذه الطبقة في نمو شخصيته وسلوكه تأثيراً بالغ الخطورة، ويميل معظم علماء الاجتماع المعاصرين إلى تعريف الطبقة الاجتماعية على أساس «المكانة» ومع أن كلاً من مفهوم الطبقة والمكانة متميزان إلا أنه كثيراً ما يحدث نوعاً من التداخل والادماج بينهما. والطبقة الاجتماعية كما يعرفها «جينزبرج» Ginsberg (١٩٥٩) هي جماعات من الأفراد أصبح لديهم من خلال الاشتراك والتشابه في المهنة والثروة والتعليم - طابعاً متشابهاً في الحياة، والتفكير والمشاعر ، والاتجاهات وأشكال السلوك، وهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ينتمون إلى جماعة واحدة

(1) Goldin D.A., 1969, Review of Children, Report of Parental Behaviour Psychology, London: Heinemann. P 223.

تشارك في كل أو بعض الجوانب^(١) أما المكانة الاجتماعية كما يعرفها «سبروت» (Sprotte ١٩٦٣) فهي الوضع الذي يشغله الفرد ، ومقدار الحقوق والواجبات التي يتمتع بها ، وهي بذلك تستخدم كمفهوم عام يتضمن ترتيب جماعات الناس علي أساس قابل للمقارنة تشير إلي المسافة الاجتماعية والهيبة، وإلي مقدار الحقوق والواجبات، أما مؤشرات المكانة الاجتماعية التي تحدد المستوي الاجتماعي الاقتصادي فيدخل في تحديدها كل من :

- الفلسفة العامة التي يوضع في إطارها كل من مفهوم المكانة الاجتماعية والطبقة الاجتماعية^(٢).

- الظروف الموضوعية النوعية الخاصة بالمجتمع موضع الدراسة وهناك الكثير من العلماء اللذين سعوا إلى تعريف المستوي الاجتماعي الاقتصادي تعريفاً نظرياً وإجرائياً.

حيث عرف أسعد رزق المستوي الاجتماعي الاقتصادي بأنه المستوي الذي يشير إلى الموقع الذي يحتله الفرد في مراتب النفوذ الاجتماعي أو في مقومات الواجهة الاجتماعية، وبدل المستوي الاجتماعي الاقتصادي على الموقع الطبقي للفرد أو المرتبة التي يحتلها في التوزيع الطبقي داخل المجتمع^(٣).

(1) Ginsberg, M., 1972, "Class Conaciovsness". In: David L. Sills (ed), International Encyclopdia of the Social Sciences, Vol (3 and 4) New York: The Free Press. P 538

(٢) عبد الحليم محمود السيد ، ١٩٨٠ ، الأسرة وإبداع الأبناء - دراسة نفسية اجتماعية لمعامله الوالدين في علاقتهم بقدرات الإبداع لدى الأبناء - القاهرة: دار المعارف. ص ٢٧٢.

(٣) أسعد رزق ، ١٩٧٧ ، موسوعة علم النفس. بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ص ٣٠٤.

ويرى عبد المنعم الحفنى أن المستوى الاجتماعى الاقتصادى هو المركز الاجتماعى الاقتصادى للفرد كما تحدده مهنته ودخله وتكاليف سكنه وأقاربه^(١).

ويعرف تيرى وتوماس Terry & Thomas 79 المستوى الاجتماعى الاقتصادى بأنه «وضع الفرد فى أي مجموعة أو ثقافة أو مجتمع، ويحدد هذا الوضع بالثروة والوظيفة والتعليم والطبقة الاجتماعية»^(٢).

وقد وضع وارنر Warner 60 مقياساً لقياس متغير المستوى الاجتماعى الاقتصادى يعتمد على أربعة عوامل هى :

١ - مستوى مهنة الوالد.

٢ - مستوى دخل الأسرة.

٣ - مستوى المنزل.

٤ - مستوى المنطقة السكنية.

وقد صمم «وارنر» Warner مقياساً متدرجاً يشتمل كل مقياس منها على سبع نقاط لتحديد حظ الأسرة من كل عامل من هذه العوامل الأربعة، وكانت حصيلة هذه الدراسة هى تصنيف الدرجات الكلية التى تم الحصول عليها إلى خمس شرائح اجتماعية يعبر كل منها عن مستوى اجتماعى معين^(٣).

ويرى «ماكس فيبر» Max Weber أن المستوى الاجتماعى الاقتصادى

(١) عبد المنعم الحفنى، ١٩٧٨، موسوعة علم النفس والتحليل النفسى. القاهرة، مكتبة مدبولي ص ٣١٥.

(2) Terry Pag G., and Thomas J. B., 1979, International Dictionary of Education, London; Billing and Sons (LTD). P 316.

(3) Warner, W.L., and Others, 1960, Social Class in America. New York: Herper and Row.

يتحدد من خلال :

- امتلاك الوسائل والمدعمات الاقتصادية.

- التسهيلات أو المعايير الخارجية للمعيشة.

- التسهيلات الثقافية والترفيهية.

- امكانيات العمل علي مستوى المجتمع المحلي^(١).

وقد استخلص «هولنجشيد» Hollingshead 58 من دراسته التي تناولت الوضع الاجتماعي لعينة من ٥٥ أسرة من اقليم نيويورك New Haven الأمريكي عدة مؤشرات يمكن الوثوق بها في قياس هذا المتغير وهي :

- مستوى الحى السكنى الذى تقيم فيه الأسرة.

- وظيفة الوالد ومستوى تعليمه.

وقد تم تقدير كل منهما في ضوء مقياس متدرج^(٢).

وقد اعتمد «محمد غالى» على مجموعة من الأبعاد التى اعتبرها ذات تأثير في تحديد المستوى الاجتماعى الاقتصادى، وقد شملت هذه الأبعاد :

- مهنة الوالدين.

- اجمالى دخل الأسرة.

- مستوى الحى السكنى الذى تعيش فيه الأسرة.

(١) عبد الحليم محمود السيد ، ١٩٨٠ ، الأسرة وإبداع الأبناء - دراسة نفسية اجتماعية لمعامله الوالدين في علاقتهما بقدرات الإبداع لدى الأبناء - القاهرة: دارالمعارف ص ٢٧٣ .
(2) Hollingshead A. B., and Redlich: F.Q., 1958; Social Class and Mental Illness, A Community Study - New York: The Macmillan Company.

وذلك فى محاولة منه لتقدير المستوى الاجتماعى الاقتصادى فى صورة كمية^(١).

وقد اعتمد محمد سامى هنا فى قياسه للمستوى الاجتماعى الاقتصادى على المتغيرات التالية:

- الدخل.
- عدد أفراد الأسرة.
- المسكن.
- استخدام الأجهزة والأدوات الحديثة.
- وقد حدد محمد نسيم رأفت ثلاثة محركات لتحديد المستوى الاجتماعى الاقتصادى وهى :
- مستوى تعليم الوالدين.
- مستوى العمل الذى يقوم به الفرد.
- مستوى دخله^(٢).

وكذلك حدد جميل منصور أبعاداً أربعة للمستوى الاجتماعى الاقتصادى للفرد هى :

- البعد المهنى للوالدين.
- البعد التعليمى للوالدين.
- البعد الاجتماعى للأسرة.

(١) محمد أحمد غالى، ١٩٦٤، دراسة مقارنة للجائعين والعصابيين من حيث تنظيم الشخصية - رحالة دكتوراه (غير منشورة) كلية التربية - جامعة عين شمس.

(٢) محمد نسيم رأفت وآخرون، ١٩٦٧، دراسة مقارنة عن شخصية المتفوقين والعاديين من طلبة وطالبات المدارس الثانوية العامة - المجلة الاجتماعية القومية - المجلد الرابع - العدد الثانى.

- البعد الاقتصادي للأسرة^(١).

ويرى عبد السلام عبد الغفار وإبراهيم زكي قشقوش إن أهم المؤشرات التي تستخدم للدلالة على المستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة هي :

- وظيفة الوالدين

- المستوى التعليمي للوالدين.

- إجمالي دخل الأسرة.

- عدد أفراد الأسرة^(٢).

ويرى محمود منسى أن المستوى الاجتماعي الاقتصادي يتضمن الجوانب والأبعاد التالية:

- وظيفة الوالدين.

- مستوى تعليم الوالدين.

- دخل الأسرة.

- عدد الأخوة والأخوات .

- ظروف الأمرة السكنية^(٣).

ويتضح من الدراسات السابقة وجود تقارب أو اتفاق بينهم في تحديد الأبعاد التي تقيس المستوى الاجتماعي الاقتصادي، وقد ساعدت هذه الدراسات الباحثة في تحديد بنود الاستمارة الحالية، وقد صممت هذه الاستمارة على التعريف الإجرائي الذي وضع في البحث الحالي عن

(١) محمد جليل منصور. ١٩٧٣، دراسة تحليلية للقيم المرتبطة بالعمل لدى المراهقين المصريين - رسالة دكتوراه (غير منشورة) - كلية التربية - جامعة عين شمس.

(٢) عبد السلام عبد الغفار. إبراهيم قشقوش، ١٩٧٨، دليل تقدير الوضع الاجتماعي الاقتصادي للأسرة المصرية - مجلة التربية - المجلد الأول - العدد الأول.

(٣) محمود عبد الحليم منسى، ١٩٨٣، دليل استمارة المستوى الاجتماعي الاقتصادي، الإسكندرية: دار النشر الجامعي.

المستوى الاجتماعي الاقتصادي، وقد حدد بأنه المستوى الذي يقيس وضع الفرد من عدة أبعاد هي:

- درجة تعليم الفرد.
- وظيفة الفرد.
- درجة تعليم الوالدين.
- وظيفة الوالدين.
- الحالة السكنية للفرد أو أسرته.
- الدخل الاجمالي للفرد فى الشهر أو أسرته .
- عدد أفراد أسرة الفرد.

أولاً - تقنين الاستمارة :

بعد تحديد الأبعاد تم بعد ذلك تحديد المفردات فى ضوء الأبعاد السابقة والتي يعتقد أنها تقيس المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأفراد.

قامت الباحثة بعرض هذه الأبعاد ومفرداتها على مجموعة من المحكمين من اساتذة علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، الأنثروبولوجيا، الادارة، التربية، علم النفس، الصحة النفسية.

كان عدد هؤلاء المحكمين ١٣ محكماً جميعهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة (جامعة الإسكندرية، الأزهر، عين شمس)، وقامت بتعديل بعض المفردات لبنود معينة وفقاً لتعديلاتهم ولكن لم يتم تعديل بند بأكمله وهكذا كانت البنود كما اقترحتها الباحثة في بادئ الأمر.

ثانياً - تصحيح الاستمارة :

بعد تكرين الصورة النهائية للاستمارة قامت الباحثة مرة أخرى بعرضها على المحكمين لتقدير الدرجة المعطاة لكل سؤال، وكانت الباحثة

قد افترضت الطريقة معينة عرضتها علي المحكمين وكانت الصورة النهائية لتعديلاتهم مفتاح التصحيح التالي:

أولاً : وظيفة الفرد . وتكون من مقياس متدرج يشمل ٧ درجات :

الدرجة	الوظيفة
٧	إدارية عليا
٦	إدارية تنفيذية
٥	إدارية مهنية
٤	إدارية متوسطة
٣	عمال مهرة
٢	مهن حرة
١	حرفيين

وقد اعتمدت الباحثة علي تقسيمات الحكومة الواردة في شئون العاملين للوظائف المهنية مضاف إليها بند المهن الحرة.

٢ - مستوي تعليم الفرد وتشمل مقياس متدرج في ٧ درجات :

الدرجة	المستوي التعليمي .
١	أمية
٢	يقرأ ويكتب
٣	تعليم ابتدائي
٤	تعليم متوسط/عام/فني
٥	تعليم فوق المتوسط (ما بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها)
٦	تعليم جامعي (عال)
٧	تعليم بعد الجامعي (درجة علمية أكاديمية)

٣ - وظيفة الوالد :

الوظيفة	الدرجة
إدارية عليا	٧
إدارية تنفيذية	٦
إدارية مهنية	٥
إدارية متوسطة	٤
عمال مهرة	٣
مهن حرة	٢
حرفيون	١

٤ - وظيفة الوالدة :

الوظيفة	الدرجة
إدارية عليا	٣ر٥
إدارية تنفيذية	٣ر٠
إدارية فنية	٢ر٥
إدارية متوسطة	٢ر٠
عمال مهرة	١ر٥
مهن حرة	١ر٠
مهن حرفية	٠ر٥

٥ - درجة تعليم الوالد :

الدرجة	المستوى التعليمي
١	أمي
٢	يقرأ ويكتب
٣	تعليم ابتدائي
٤	تعليم متوسط
٥	تعليم فوق المتوسط
٦	تعليم عال جامعي
٧	تعليم بعد الجامعي

٦ - مستوى تعليم الوالدة :

الدرجة	المستوى التعليمي
٥ر	أمية
١	تقرأ وتكتب
١ر٥	تعليم ابتدائي
٢	تعليم متوسط
٢ر٥	تعليم فوق المتوسط
٣	تعليم عال جامعي
٣ر٥	تعليم بعد الجامعي

٧ - الحالة السكنية :

بيانات عن السكن:

(أ) نوع السكن :

الدرجة	السكن
٤	ملك
٣	إيجار
٢	شقة مفروشة
١	قاطن عند أقاربه

(ب) اسم الحي :

وهو مقياس متدرج من خمس فئات بخمس درجات حسب توزيعات المحافظة ووصفها للأحياء :

الدرجة	اسم الحي
٥	حي راقى
٤	حي متوسط
٣	حي فوق المتوسط
٢	حي دون المتوسط
١	حي فقير

وقد اكتفت الباحثة في الاستمارة بذكر اسم الحي، وكانت تقوم هي بحساب الدرجة حسب التصنيفات السابقة وجدول الأحياء الذي حصلت عليه من محافظة الإسكندرية.

(ج) عدد حجرات المسكن :

الدرجة	عدد الحجرات
١	حجرة
٢	حجرتان
٣	ثلاث حجرات
٤	أربع حجرات
٥	خمس حجرات
٦	أكثر من ذلك

٨ - عدد أفراد الأسرة :

الدرجة	عدد الأفراد
٧	٢
٦	٣
٥	٤
٤	٥
٣	٦
٢	٧
١	أكثر من ذلك

٩ - إجمالي الدخل الشهري :

الدرجة	الدخل
٧	أكثر من ٥٠٠ جنية
٦	من ٤٠٠ - ٥٠٠ جنية
٥	من ٣٠٠ - ٤٠٠ جنية
٤	من ٢٠٠ - ٣٠٠ جنية
٣	من ١٠٠ - ٢٠٠ جنية
٢	أقل من ١٠٠ - ٥٠ جنية
١	أقل من ٥٠ جنية

حساب صدق الاستثمار :

طبقت الاستثمار بعد تحديد بنودها ومفرداتها ووضع مفتاح التصحيح الخاص بكل بند، على عينة قوامها خمسمائة وخمسون (٥٥٠) فرداً من العاملين فى الشركات والمؤسسات الحكومية، المستشفيات، الجامعة، البنوك، المهن الحرة من جميع المستويات الوظيفية، ومن جميع الأحياء فى مدينة الإسكندرية، ثم بعد ذلك باستخدام مفتاح التصحيح الخاص بالاستثمار تم تقدير درجة كل استثمار، كما طبقت أيضاً استثمار المستوى الاجتماعى الاقتصادى إعداد عبد السلام عبد الغفار وزكى قشقوش.

تم حساب معامل الارتباط بين درجات الأفراد على استمارتين (استثمار الباحث للحالية، واستثمار قشقوش) كما حسب أيضاً قيمة « ت » لدلالة الفروق بين الاستمارتين وكانت النتائج كما توضحها الجداول التالية:

جدول رقم (٣٨) يوضح قيمة « ت » دلالة الفروق

بين استمارتى المستوى الاجتماعى الاقتصادى

(استثمار الباحث واستثمار قشقوش)

المقياس	م	ع	ن	ت	دالتها
استثمار مستوى اجتماعى / اقتصادى للباحث	٢٠٢٧	١٠٠٥	٥٥٠	١٠٠٩١	غير دالة
استثمار مستوى اجتماعى / اقتصادى لقشقوش	١٩٠٠٩	١٠٠٧	٥٥٠		

وكانت قيمة (ت) غير دالة عند مستويين الدلالة ٠٠١ ، ٠٠٥ .

وهذا يوضح عدم وجود فروق بين الاستثمارين لقياس المستوى الاجتماعي
الاقتصادي، وكانت نتائج حساب معامل الارتباط بين الاستثمارين
باستخدام معادلة سبيرمان/ براون كما يوضحها جدول رقم (٣٩).

جدول رقم (٣٩) يوضح قيمة معامل الارتباط بين الاستثمارين
باستخدام معادلة معامل الارتباط للقيم الخام

ن	س	ص	س ^٢	ص ^٢	س ^٢	ص ^٢	س ص	ر
٥٥٠	٩٠٩	٤٢٠	١٤٨١٩	٨٥٠٠	٣٧٠٨٨١	١٧٦٤٠٠	٩٠٨٥	٢٥٥٧٨٠
٨٠١								

ويتضح من الجدول السابق أن معامل الارتباط دال احصائياً وذو
دلالة عالية:

معايير الاستثمار :

بعد عرض درجات بنود الاستثمار على المحكمين والموافقة على
صورتها النهائية السابق عرضها، قامت الباحثة بناء على توجيهاتهم
الى تقسيم المستوى الاجتماعي والاقتصادي الى مستويات كالاتى (تمثل
إحدى عشر مستوى):

- المستوى الأول الحاصلون على درجات من ٨ - ١٢
- المستوى الثانى الحاصلون على درجات من ١٣ - ١٧
- المستوى الثالث الحاصلون على درجات من ١٨ - ٢٢
- المستوى الرابع الحاصلون على درجات من ١٩ - ٢٣
- المستوى الخامس الحاصلون على درجات من ٢٤ - ٢٨
- المستوى السادس الحاصلون على درجات من ٢٩ - ٣٣
- المستوى السابع الحاصلون على درجات من ٣٤ - ٣٨
- المستوى الثامن الحاصلون على درجات من ٣٩ - ٤٣

المستوي التاسع الحاصلون على درجات من ٤٤ - ٤٨

المستوي العاشر الحاصلون على درجات من ٤٩ - ٥٣

المستوي الحادى عشر الحاصلون على درجات من ٥٤ درجة فأكثر.

ويمثل المستوى الأول أدنى مستوى اجتماعى اقتصادى ، ثم يأخذ فى الارتفاع حتى يصل إلى المستوي الحادى عشر وهو أعلى مستوى.

تصحيح الأدوات :

استخدمت الباحثة المفاتيح الخاصة بالاختبارات بالنسبة للاختبارات التالية:

١ - الذكاء المصور .

٢ - اختبار الشخصية المتعدد الأوجه.

٣ - استبيان مستوى الطموح.

٤ - المفتاح الخاص باستمارة المستوى الاجتماعى والاقتصادى.

راعت الباحثة قواعد تصحيح اختبارات القدرة على التفكير الابتكارى الخاص بكل اختبار، وتقدير الدرجات وفقاً لها.

صدق وثبات الأدوات :

١ - بالنسبة لاختبار الذكاء المصور:

اعتمدت الباحثة على النتائج التى أوردها د/ أحمد زكى صالح من أن الاختبار له معامل ثبات وصدق عال، إذ تراوح معامل الثبات ما بين ٠.٧٥ ، ٠.٨٥ بطريقة التجزئة النصفية، كما أن معامل الصدق كان ٠.٦١.

٢ - بالنسبة لاستبيان مستوى الطموح :

اعتمدت الباحثة على دراسة د/ كاميليا عبد الفتاح، وغيرها من

الدراسات التي استخدمت الاستبيان وأوضحت صدقه وثباته وكانت معاملات الثبات ٨ر والصدق ٥٦ر .

٣ - بالنسبة لاختبار الشخصية المتعدد الأوجه:

اعتمدت الباحثة على صدق الاختبار الكلي وثباته على دراسات لويس كامل مليكة والتي أثبتت أن الاختبار له معامل صدق وثبات لا بأس به إذ يتراوح معامل ثبات الاختبار من ٧١ر الى ٨٣ر وكذلك تبين الصدق العملي للمقياس وقدرته على التميز.

وقد قامت الباحثة بحساب الصدق والثبات للمقاييس التي استخدمتها بعد تحويلها إلى اللغة العامية، وكانت مقاييس الصدق والثبات مرتفعة بالنسبة لجميع المقاييس كما أوضحتها الباحثة فيما سبق عند شرحها للاختبار وكانت دالة جميعها احصائيا وقد استخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية (معادلة رولون المختصرة) لحساب الثبات.

٤ - بالنسبة لاختبارات القدرة على التفكير الابتكاري ، اعتمدت الباحثة في صدق الاختبارات التي استعملتها على الصدق المنطقي الذي أوردته د/عبد السلام عبد الغفار في اختباره.

ولكن بالنسبة للثبات قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية مستخدمة معادلة رولون المختصرة بالنسبة للاختبارات الثلاثة وكانت كلها معاملات ثبات مرتفعة ودالة احصائياً:

بالنسبة للطلاقة الفكرية ٩١ر

بالنسبة للمترتبات ٩ر

بالنسبة للاستعمالات ٩٠١ر

إجراءات البحث :

الاجراء :

الدراسة الميدنية:

قامت الباحثة بإجراء هذه الدراسة لأهداف منها :

- ١ - حصر أماكن تواجد العينة (التجريبية ، الضابطة).
- ٢ - التعرف على مدى صلاحية هذه الأماكن فى إتاحة الفرصة للباحثة لمقابلة المبحوثين والانفراد بهم ، أكثر من مرة.
- ٣ - حصر عدد الحالات التى ستأخذها الباحثة من كل جهة وأخذ عناوين سكنهم وأماكن تواجدهم باستمرار .
- ٤ - التأكد من صلاحية الأدوات للتطبيق فى هذا البحث .
- ٥ - التعرف على ظروف العينة التعليمية والاجتماعية .
- ٦ - الاستفادة فى تصميم استمارة المقابلة.

وقد قامت الباحثة بمقابلة خمسة من مدمني المخدرات مقابلة حرة فى مستشفى شرق المدينة وقد ساعدتها هذه المقابلة فى تصميم استمارة المقابلة وصياغة الكثير من بنودها وقد طبقت الباحثة أدوات بحثها جميعاً على هذه الحالات الخمس وتبين لها من هذا التطبيق ما يلى :

- ١ - ضرورة تصميم استمارة لقياس المستوي الاجتماعى والاقتصادى تناسب وطبيعة العينة.

- ٢ - أن معظم أدوات البحث سهلة لغوياً أو مصاغة باللغة العامية نظرا لظروف العينة التعليمية.

- ٣ - أن تكون المقابلة مقننة (مقيدة) لصعوبة الاحتفاظ بالمعلومات ولإسهاب الحالات فى شرح كثير من الموضوعات بعيدة الصلة عن البحث، وتداخل الموضوعات عند الحالات.

٤ - أن الباحثة ستقوم بتطبيق الاختبارات بصورة فردية وستتولى هي تسجيل الاجابات .

٥ - إن تطبيق الادوات سيتم على مرتين أو ثلاث مرات.

٦ - أن تتم المقابلة فى مكان مغلق حيث لا يكون هناك أمر من الأمور التى تساعد على تشتيت ذهن الحالة.

اجراءات البحث الحالى (الدراسة الأساسية):

قامت الباحثة بتطبيق جميع أدوات البحث الحالى على جميع المفحوصين فى فترة تطبيق تجاوزت سبعة أشهر متتالية على المجموعتين (التجريبية والضابطة) بدأت فى يناير ١٩٨٣ وانتهت فى أواخر اغسطس ١٩٨٣ .

وقد ترجع طول الفترة الزمنية فى التطبيق إلى صعوبة الالتقاء بالحالات وطول الأدوات المستعملة وكثرتها.

وقد تم التطبيق بالصورة التالية :

■ كانت الباحثة تلتقى بالمفحوصين فى الصباح وذلك بالنسبة لمجموعة المفحوصين المدمنين الذين جمعتهم من مستشفى شرق المدينة ومكاتب مكافحة المخدرات وتبدأ معهم التطبيق باختبار الذكاء المصور وذلك قبل أن يصاب المفحوص بالتعب أو الملل فيؤثر ذلك على أدائه العقلى، ويلي ذلك تطبيق استمارة المقابلة حيث كانت تجذب ثقة الحالات، وبعدها استمارة المستوى الاجتماعى والاقتصادى فى الفترة الأولى أو المقابلة الأولى.

■ تقوم الباحثة بمقابلة الحالة مرة أخرى بعد يومين أو ثلاثة أيام وتلتقى بها أيضاً فى الصباح وتطبق عليه اختبارات القدرة على التفكير الابتكارى. ثم يطبق استبيان مستوى الطموح وفى بعض الحالات كان

يطبق اختبار الشخصية المتعدد الأوجه ولكن معظم الحالات كانت تضطر الباحثة لمقابلتهم مرة ثالثة لتطبيق هذا الاختبار.

■ أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فقد كان يتم تطبيق جميع الأدوات على مرتين لخلو الأدوات من استمارة المقابلة الخاصة بمدمنى المخدرات والتي كانت تستغرق وقتاً يقرب من الساعة وأكثر.

■ أما بالنسبة لباقي الحالات التي تم جمعهم بطرق مختلفة من أماكن متفرقة من مدينة الإسكندرية فكانت تلتقى بهم الباحثة مرات قبل إجراء البحث لشرح الغرض من البحث ولكسب ثقتهم ، وبعد ذلك تحدد معهم الموعد الذي يناسبهم والذي يكونوا فيه في غير حالة التخدير أو الخمر، وكان التطبيق يبدأ أيضاً كما ذكر سابقاً، وكان يحتاج التطبيق لقاء المفحوصين أكثر من ثلاث مرات.

ملحق رقم (٩)

استمارة جمع بيانات عن المخدرات

اعداد / عفاف محمد عبد النعم - قسم علم النفس

كلية الآداب - جامعة الاسكندرية

١ - بيانات أولية :

١ - الاسم:

٢ - السن:

٣ - الحالة التعليمية: أمي ، يقرأ ويكتب ، تعليم ابتدائي ، تعليم متوسط : فنى / عام ، تعليم جامعى ، تعليم ما بعد الجامعى .

٤ - الحالة الاجتماعية: أعزب ، متزوج ، ~~مطلق~~ ، أرمل .

٥ - عدد مرات الزواج : ١ ٢ ٣ ٤ أكثر من ذلك .

٦ - عدد الزوجات الحالى : ١ ٢ ٣ ٤

٧ - عدد مرات الطلاق : ١ ٢ ٣ ٤ أكثر من ذلك .

٨ - السبب فى الطلاق .

٩ - مهنة الزوجة الحالية .

١٠ - عدد الأولاد : ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ أكثر من ذلك .

١١ - سن الأولاد : فى سن المدرسة ، بعد سن التعليم ، دون سن التعليم .

١٢ - تعليم الأولاد : لا يعرف / ابتدائي / متوسط / عام / فنى / جامعى / بعد الجامعى .

١٣ - عدد الأولاد فى كل مرحلة : ابتدائي / متوسط / جامعى / بعد الجامعى

١٤ - مهنة الأولاد الذين يعملون .

١٥ - عدد الأفراد الذين يعولهم : ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ أكثر
من ذلك .

١٦ - عنوان السكن : اسم الحى .

١٧ - عدد حجرات السكن .

١٨ - الدخل الشهري بالجنينة المصرى .

٢ - بيانات عن المخدر وبداية الإدمان :

١٩ - اب. هى المخدرات التى انت استعملتها من يوم ما عرفت
المخدرات:

حشيش ، أفيون ، هيروين ، كوكايين ، كوداين ، حبوب مهدئة ، حبوب
منبهة ، مخدرات أخرى .

٢٠ - وايه هو المخدر اللي بتأخذه دلوقتى :

حشيش ، أفيون ، هيروين ، كوكايين ، كوداين ، حبوب مهدئة ، حبوب
منبهة ، مخدرات أخرى .

٢١ - وايه السبب الللى خلاك تستمر فى هذا المخدر بالذات دون غيره .

٢٢ - طيب كان عندك كام سنة فى أول مرة أخذت فيها المخدرات .

٢٣ - طيب والكمية الللى أخذتها كانت قد ايه .

٢٤ - وايه السبب الللى خلاك تاخذ المخدر فى أول مرة .

أصحاب . حب استطلاع . الم أو مرض . الجنس . مناسبة اجتماعية .
للسهر . القدرة على العمل . أسباب أخرى

٢٥ - طيب يا ريتك تحكى لى حسيت بايه فى أول مرة أخذت فيها
المخدر .

- ٢٦ - وايه هى بقى الطريقة اللو أخذت بيها المخدر فى أول مرة.
- ٢٧ - طيب والكمية اللي بتكفى مزاجك زمان كنت بتشتريها بكام.
- ٢٨ - طيب ودلوقتى الحتة دى بتدفع فيها كام.
- ٢٩ - وكنت بتأخذ المخدر كام مرة فى اليوم... الأسبوع ... الشهر... فى أول ما أبتديت.
- ٣٠ - طيب ودلوقتى بتأخذ كام مرة فى اليوم... الأسبوع..... الشهر.
- ٣١ - طيب وايه هى الطريقة اللو بتأخذ بيها المخدر دلوقتى .
- ٣٢ - طيب وايه هى احسن طريقة تخلص أثر المخدر بيبان بسرعة ويبقى غال.
- ٣٣ - قولى بصراحة عمرك فكرت فى انك تبطل المخدرات.
- (إذا أجاب بنعم يسأل :٣٤)
- ٣٤ - وخاولت فعلاً وبطلتها بالفعل.
- ٣٥ - طيب بطلتها كام مرة.
- ٣٦ - والمدة التى بطلت فيها المخدرات كانت أد ايه.
- ٣٧ - وايه السبب اللو خلاك تفكر تبطل المخدرات.
- ٣٨ - ولما بطلتها حسيت بايه.
- ٣٩ - وايه السبب اللو خلاك ترجع للمخدرات تانى. م
- ٤٠ - ولو حصل فى مرة كنت عاوز المخدر ومش قادر تحجبه لأى سبب من الاسباب ، بتعمل ايه. وتتحس بايه
- بدور على مخدر ثانى ألم فى كل جسمي
يستلف مخدر من واحد صاحبي بضيق ونفزة

بجيب فلوس بأي طريقة وش في دماغى
أى طرق أخرى تذكر مش قادر اقف على رجلية
أى احساسات أخرى تذكر .

٤١ - طيب وبتجيب المخدرات منين (يعني الحى اللي بتشتري منه
المخدر اسمه ايه)

٤٢ - طيب بعد كام مرة أخذت فيها المخدر حسيت بعدها إنك
متقدرش تستغني عنه.

٣ - بيانات عن آثار المخدرات على المدمن :

٤٣ - لما بتأخذ المخدر تبدأ تحس بآثره بعد أد ايه .

٤٤ - طيب وأنت حاسس بآثر المخدر تقدر تقولى الوقت ساعتها
بتحس إنه بيفوت بطئ ولا سريع ولا عادى.

٤٥ - برضه وأنت حاسس بآثر المخدر بتحس أن المسافات (يعنى
الاماكن أو الحاجات اللي قصادك) ببعيده قوي - ولا قريبة قوى ولا
عادية.

٤٦ - وبتحس ساعتها إن الاصوات (يعنى لما يكون واحد بيتكلم أو
بتسمع راديو أو تليفزيون) بتكون واطية قوي، ولا عالية قوي ولا عادية.

٤٧ - ولما يكون فيه بني آدم واقف اداك يبقى باين لك واضح ولا
عادي ولا مهزوز (يعنى زي ما يكون عليه غشاوة).

٤٨ - طيب ولما تشوف حاجة ملونة بتبقى الألوان اداك، بهتانة ولا
مزهة ولا عادية.

٤٩ - طيب طريقتك فى التفكير بتبقى هي وانت واخذ المخدر ولا
بتتغير نعم لا

إذا اجاب بنعم يسأل (٥٠)

٥٠ - طيب بتغيير ازاى.

٥١ - وأنت واخذ المخدر بتجيك فكرة ملحة وتزن فى دماغك على طول لدرجة أنك ما تقدرش تتخلص منها؟

(لو أجاب بنعم يسأل (٥٢)) .

٥٢ - طيب زى أية.

٥٣ - وانت واخذ المخدر بتحس إنك تقدر تحل مشاكلك نعم لا

٥٤ - يعنى المخدر بيساعدك على إنك تشوف مشاكلك على حقيقتها ولا بتخليك تهرب منها.

٥٥ - وأنت من غير مخدر بتكون متأريف ولا مفرفش ولا عادى.

٥٦ - طيب وأنت واخذ المخدر.

٥٧ - طيب وأنت من غير مخدر بتبقى متردد فى تصرفاتك ولا متسرع ولا عادى.

٥٨ - طيب وأنت واخذ المخدر .

٥٩ - وانت من غير مخدر بتبقى هادى ولا متوتر ولا عادى.

٦٠ - طيب وانت واخذ المخدر.

٦١ - وأنت من غير مخدر بتفرض رأيك على الناس ولا ممكن تتنازل عنه بسهولة؟

٦٢ - طيب وانت واخذ المخدر .

٦٣ - وانت من غير مخدر بتفتكر كل حاجة ولا بتبقى ذاكرتك ضعيفة.

٦٤ - طيب وانت واخذ المخدر

٦٥ - وانت من غير المخدر لو كان نفسك فى حاجة ومش قادر تجيبها فى ساعتها ممكن تأجلها من غير ما تضايق، ولا بتضايق ومتقدرش تأجلها.

٦٦ - طيب وانت واخذ المخدر .

٦٧ - قولى بقى وانت من غير المخدر بتشتغل كتير ولا قليل ولا عادى.

٦٨ - طيب وانت واخذ المخدر.

٦٩ - وأنت من غير المخدر بتحب تقعد مع الناس ولا بتحب تبقى لوحدهك وتقعده مع نفسك؟

٧٠ - طيب وانت واخذ المخدر.

٧١ - لو حد ضايقك أو نرفذك وأنت من غير مخدر ممكن تضربه؟

٧٢ - طيب وأنت واخذ المخدر بتعمل ايه؟

٧٣ - يعنى بتحصل مشاكل كتيرة بينك وبين أهلك وأصحابك وأنت من غير المخدر؟

٧٤ - طيب وانت واخذ المخدر.

٧٥ - بتحط رأسك على المخدرة وتروح فى النوم على طول وانت من غير مخدر بتبقى قلقان ؟

٧٦ - طيب وأنت واخذ المخدر.

٧٧ -بيحصل إنك بتحس وأنت من غير مخدر إنك متأريف ومتضايق وحاسس زى ما يكون فيه مصيبة هتحصل لك؟

٧٨ - طيب وانت واخذ المخدر.

٧٩ - طيب وانت بتأكل كويس فى العادة؟

- ٨٠ - طيب قولى بتحس إنك نفسك مفتوحة للأكل وتأكّل كثير وأنت من غير المخدر؟
- ٨١ - طيب وأنت واخذ المخدر بقى؟
- ٨٢ - قولى بصراحة: تفتكر أن البني آدم اللي متعود على المخدرات ممكن يرتكب جرائم أكثر من الشخص اللي مالوش دعوة بالمخدرات؟
(إذا أجب بنعم يسأل ٨٣)
- ٨٣ - طيب ايه هى الجرائم اللي ممكن يرتكبها:
- ١ - قتل ٢ - سرقة.
- ٣ - يعتدى على حريم ٤ - ينصب على الناس
- ٥ - يتهجم على الناس فى الطريق علشان يهددهم وياخذ فلوسهم.
- ٦ - أية جرائم تانية يذكرها تكتب.
- ٨٤ - هو الواحد وهو واخذ المخدر يبقى خواف قوى ولا عادى ولا جرى؟
- ٨٥ - طيب وهو من غير المخدر.
- ٤ - الإدمان وأثره على الجنس:
- ٨٦ - طيب قولى بصراحة أنت لك علاقات جنسية مع حريم؟
(إذا كان متجوز يسأل عن هذه العلاقة مع الست بتاعته)
- ٨٧ - ريتحس إنك تقدر تقوم بالعملية دى احسن وأنت واخذ المخدر ولا وانت من غير مخدر؟
- ٨٨ - طيب وأنت واخذ المخدر تقعد فى العملية دى مدة طويلة ولا قصيرة ولا عادىة.
- ٨٩ - يعنى المخدرات بتخلّى مدة الاتصال بالحریم أطول من العادى ولا عادى ولا أقصر؟

٩٠ - طيب تقدر تحدد لى تقريباً المدة اللى بتقعدها مع الست فى العملية دى بتبقى اد أيه وأنت واخذ المخدر ؟

٩١ - طيب وأنت من غير المخدر بتبقى أد ايه؟

٩٢ - يعنى تقدر تقول لى المخدرات بتأثر على العملية الجنسية مع الحريم؟

(إذا اجاب بنعم يسأل)

٩٣ - طيب ايه هو تأثيرها؟

٩٤ - يعنى اذا لك للعملية الجنسية بيختلف وأنت مخدر عنه وأنت مش مخدر؟

(إذا اجاب بنعم يسأل)

٩٥ - بيختلف ازاي.

٩٦ - طيب بتحس برغبة أكثر فى الحريم عنه وأنت مش مخدر ولا وأنت واخذ المخدر؟

٩٧ - ويتحس أن الست راضية ومتجاوبة معاك وأنت مش واخذ المخدر اكتر ولا وانت مخدر أكثر؟

٩٨ - هل إدمان المخدرات يؤدى للضعف الجنسى؟

٥ - بيانات عن حياة المدمن ومشكلاته:

٩٩ - طيب قولى أنت عندك مشاكل؟ نعم لا (زي ايه؟)

(إذا اجاب بنعم يسأل ١٠٠)

١٠٠ - طيب قولى المشكلات دى مين السبب فيها؟

١٠١ - طيب تقدر توصف لى ايه هى المشكلات اللى تخلى الواحد ياخذ مخدرات؟

١٠٢ - طيب قول لى علاقتك بوالدك شكلها ايه؟

كويسه وحشة عادية

١٠٣ - طيب وعلاقتك بوالدتك؟

كويسه وحشة عادية

١٠٤ - طيب العلاقة اللي بين والدك ووالدتك شكلها ايه؟

١٠٥ - طيب لو فيه مشكلة بينك وبين واحد من عيلتك (أخوك ولا
ابنك ولا زوجتك مثلاً) بتحلها أزاى؟

١٠٦ - قوللى يا ترى فيه حد فى عيلتك بياخذ مخدرات؟

١٠٧ - طيب لو لقيت ابنك أو أخوك بياخذ مخدرات تعمل له ايه؟

١٠٨ - ولو كان لك بنت أو أخت توافق على إنها تتجوز واحد بيدمن
مخدرات؟

الفصل الخامس

نتائج البحث

■ اختبار صحة الفروض،

- اختبار صحة الفرض الأول

- اختبار صحة الفرض الثاني

- اختبار صحة الفرض الثالث

■ نتائج المقابلة الشخصية

■ سمات المدمن كما أوضحتها المقابلة الشخصية

إختبار صحة الفروض :

وتعرض الباحثة فى هذا الفصل النتائج التى توصلت إليها من بحثها مع توضيح مدي إتفاق هذه النتائج مع الفروض أو تعارضها.

ولإختبار صحة الفرض الأول القائل بأن إنخفاض بعض القدرات العقلية أكثر شيعاً لدي مدمنى المخدرات عن غيرهم من غير المدمنين، فقد تم قياس بعض القدرات العقلية منها الذكاء والقدرة على التفكير الابتكاري، كما تناولت استمارة المقابلة بعض من هذه القدرات لدي المدمنين سنعرض لها بعد. وكانت نتائج هذه الاختبارات كما يلى:

لقد قامت الباحثة بتطبيق اختبار الذكاء المصور من اعداد أحمد زكى صالح على مجموعتين البحث التجريبية والضابطة، وكانت نتائج التطبيق كما توضحها الجداول التالية:

جدول رقم (٤٠) يوضح المتوسط الحسابى والانحراف المعياري

لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة فى اختبار الذكاء المصور

المجموعة الضابطة			المجموعة التجريبية			المقياس
ن	ع	م	ن	ع	م	
٤٨	٩ر٥٥	١٠٤ر٨٧	٤٨	١٦ر٥٩	٨٦ر٨١	اختبار الذكاء المصور

وتوضح النتائج إنخفاض المتوسط الحسابى للمجموعة التجريبية عن المتوسط الحسابى لدرجات المجموعة الضابطة فى الذكاء كما يقبسه الاختبار المستخدم فى الدراسة، ومقارنة نتائج المتوسط الحسابى للمجموعة التجريبية لمعايير الذكاء والنسب المئوية التى يوضحها الاختبار المستخدم وجد أنهم ينتمون إلى فئة ذكاء دنيا.

وقد تم حساب تحليل التباين للمجموعتين للوقوف على قيمة «ف» ودالاتها وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٤١):

جدول رقم (٤١)

يوضح قيمة «ف» للمجموعتين في اختبار الذكاء المصور

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	التباين	قيمة ت	دالاتها
بين المجموعات	٧٨٢٧,٩٢	١	٧٨٢٧,٩٢	٣٩,٨٥	دالة
داخل المجموعات	١٨٤٦٦,٥٦	٩٤	١٩٦,٤٥		

وكانت قيمة «ف» دالة عند مستوى ثقة ٠,١، ثم حسب بعد ذلك قيمة «ت» لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات المجموعتين في الذكاء وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٤٢):

جدول رقم (٤٢)

يوضح دلالة الفروق (ت) بين المجموعتين في الذكاء

المقاييس	المجموعة الضابطة			المجموعة التجريبية			ت	دالاتها
	١م	١ع	١ن	٢م	٢ع	٢ن		
الذكاء المصور	١٠٤,٨٧	٩,٥٥	٤٨	٨٦,٨١	١٦,٥٩	٤٨	٥,٩٦	دالة

وكانت قيمة «ت» دالة عند مستوى دلالة ٠,١، مما يوضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة الضابطة، وأن هناك عدم تجانس بين العينتين في الذكاء، وتدل نتائج المجموعة التجريبية على إنخفاض مستوى الذكاء لديهم عن مستوى الذكاء لدى المجموعة الضابطة.

وأيضاً بصدر التحقق من صحة الغرض الأول تم تطبيق بعض اختبارات القدرة على التفكير الابتكاري وكانت:

■ اختبار الطلاقة الفكرية.

■ اختبار الاستعمالات.

■ اختبار المتربات.

وكانت النتائج كما يلي:

■ الطلاقة الفكرية :

وقد قامت الباحثة بتطبيق اختبار الطلاقة الفكرية من اختبارات القدرة على التفكير الابتكاري وحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة كانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٤٣).

جدول رقم (٤٣) يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمجموعتين على اختبار الطلاقة الفكرية

المقياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة		
	م	ع	ن	م	ع	ن
الطلاقة الفكرية	٢٠.٢٥	٩.٣٨	٤٨	٣٥.٨٨	١٧.٠٩	٤٨

وقد تم حساب قيمة «ف» للمجموعتين وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٤٤).

جدول رقم (٤٤) يوضح قيمة «ف» ودالاتها

للمجموعتين في اختبار الطلاقة الفكرية

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	التباين	قيمة ف	دالاتها
بين المجموعات	٥٧٨٨,٥٣	١	٥٧٨٨,٥٣	٢٩,٢٦	دالة
داخل المجموعات	١٨٢٢١,٢٨	٩٤	١٩٣,٨٤		

وكانت قيمة «ف» دالة عند مستوى دالة ٠.١. وقد تم حساب قيمة «ت» لمعرفة دلالة الفروق بين المجموعتين في نفس الاختبار، وكانت النتائج كما يوضحها لمعرفة دلالة الفروق بين المجموعتين في نفس الاختبار، وكانت كما يوضحها الجدول التالي رقم (٤٥):

جدول رقم (٤٥) يوضح قيمة «ت» دلالة الفروق

بين المجموعتين في الطلاقة الفكرية

الاختبار	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة			ت	دالاتها
	٢م	٢ع	٢ن	١م	١ع	١ن		
طلاقة فكرية	٢٠,٢٥	٩,٣٨	٤٨	٣٥,٨٨	١٧,٠٩	٤٨	٥,٦٦	دالة

وكانت قيمة «ت» دالة عند مستوى دلالة ٠.١.

■ الاستعمالات :

وبحساب قيمة المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل من المجموعتين كانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٤٦):

جدول رقم (٤٦) يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري

لدرجات المجموعتين في اختبار الاستعمالات

المقياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة		
	م	ع	ن	م	ع	ن
الاستعمالات	٧٦٥	٤٩	٤٨	١٤٠٨	٣٨	٤٨

ثم قامت الباحثة بتحليل التباين للمجموعتين لمعرفة مدى تجانسها أو عدمه في نفس السمة وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٤٧):

جدول رقم (٤٧) يوضح قيمة «ف» ودالتها

للمجموعتين في اختبار الاستعمالات

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	التباين	قيمة ف	دالتها
بين المجموعات	١٢١٦٦٦	١	١٢١٦٦٦		
داخل المجموعات	١٧٨٦٠٨	٩٤	١٩٠٠١	٦٤٠٣	دالة

وكانت قيمة ف دالة عند مستوي ثقة ٠.٠١.

ولمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات المجموعتين تم حساب قيمة «ت» وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٤٨):

جدول رقم (٤٨) يوضح دلالة الفروق «ت»

لمجمعتي البحث في اختبار الاستعمالات

المقياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة			ت	دالاتها
	٢م	٢ع	٢ن	١م	١ع	١ن		
استعمالات	٧٦٥	٤٩٤	٤٨	١٤٠٨	٩٣٨	٤٨	٨٧٢	دالة

وكانت قيمة «ت» دالة عند مستوى دلالة ٠.١.

وبالنظر إلى النتائج الموضحة في الجداول السابقة (٤٦، ٤٧، ٤٨) نجد أن هناك فرقاً بين المتوسطات والانحرافات المعيارية للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار الاستعمالات وهذا الفرق لصالح المجموعة الضابطة، وأن هذا الفرق جوهري ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠.١، مما يشير إلى عدم تجانس العينتين في سمة الابتكارية كم يقيسها الاختبار المستخدم، وإلى ضعف هذه السمة لدى المجموعة التجريبية بالمقارنة بالمجموعة الضابطة (الغير مدمنى للمخدرات).

■ المرتبات :

وقد تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات كل من المجموعتين التجريبية والضابطة، وكانت كما يوضحها الجدول التالي رقم (٤٩):

جدول رقم (٤٩) يوضح قيمة المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات المجموعتين في اختبار المرتبات

المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة			المقياس
م	ع	ن	م	ع	ن	
٥٩٦	٤٧٤	٤٨	١٢١٣	٨٧	٤٨	مترتبات

ولمعرفة تجانس العينتين من عدمه بالنسبة لذا الاختبار تم حساب قيمة «ف» وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٥٠):

جدول رقم (٥٠) يوضح قيمة «ف» ودالتها

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	التباين	قيمة ف	دالتها
بين المجموعات	٩١٣٫٧٥	١	٩١٣٫٧٥	١١٫٧٥	دالة
داخل المجموعات	٧٢٥٠٫٣٦	٩٤	٧٧٫١٣		

وكانت «ف» دالة عند مستوي دلالة ٠٫١ ر.

وبحساب قيمة «ت» لدلالة الفرق بين المجموعتين كانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٥١):

جدول رقم (٥١) يوضح دلالة الفرق (ت) على اختبار المرتبات

المقياس	المجموعة الضابطة			المجموعة التجريبية			ت	دالتها
	١م	١ع	١ن	٢م	٢ع	٢ن		
المرتبات	١٢٫١٣	٨٫٧	٤٫٨	٥٫٩٦	٤٫٧٤	٤٫٨	٥٫١٤	دالة

وتشير نتائج التحليلات الاحصائية السابقة لجميع أدوات قياس القدرات العقلية على صحة الفرض الأول - بإنخفاض القدرات العقلية لدي مدمني المخدرات عن غيرهم من غير المدمنين - حيث جاءت نتائج التحليلات جميعها ذات دلالة ٠٫١، وهذا يؤكد صحة هذا الفرض.

ولاختبار صحة الفرض الثاني القائل بأن هناك علاقة طردية بين الإدمان على المخدرات وانخفاض المستوى الاجتماعي الاقتصادي، فقد تم تصميم استمارة خاصة لقياس هذا المستوى وتناولت الاستمارة

مجموعه من البود التي اتفقت فيها معظم الدراسات العربية والاجنبية على انها تعيس المستوى الاجتماعي الاقتصادي وكذلك تأييد معظم
 ١ حكمين للاستمارة على صحة هذه البنود وملاءمتها لقياس المستوى الاجتماعي الاقتصادي فقد تم تطبيق استمارة المستوى الاجتماعي الاقتصادي من إعداد الباحثة على جميع أفراد البحث، بهدف تقدير الوضع الاجتماعي الاقتصادي للاقتصادى للعينة، وحساب المتوسط الحسابى والانحراف المعياري للمجموعتين كانت النتائج كما يوضحها الجدول التالى رقم (٥٢)

جدول رقم (٥٢) يوضح المتوسط الحسابى والانحراف المعياري للمجموعتين فى المستوى الاجتماعي والاقتصادي

المقياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة		
	م	ع	ن	م	ع	ن
مستوى اجتماعي اقتصادي	١٤٠.٢	٢٤٥	٤٨	١٤٠.٨	٢٧٦	٤٨

وتدل نتائج حساب المتوسط الحسابى للمستوى الاجتماعي الاقتصادي على انتماء العينتين إلى نفس الفئة من المستوى الاجتماعي والاقتصادي كما يدل على ذلك جدول اجتماعي اقتصادي منخفض كما تشير بذلك المعايير.

وقد قامت الباحثة بحساب قيمة «ف» للتأكد من تجانس العينتين فى هذا المستوي حيث أن الباحثة قد قامت بتثبيت هذا المتغير من متغيرات البحث وكانت نتائج قيمة «ف» كما يوضحها الجدول التالى رقم (٥٣):

جدول رقم (٥٣) يوضح قيمة (ف) ودلالاتها للمجموعتين

فى المستوى الاجتماعى الاقتصادى

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	التباين	قيمة ف	دالاتها
بين المجموعات	١٨,١٢	١	١٨,١٢	٢,٥٢	غير دالة
داخل المجموعات	٦٧٦,٣٥	٩٤			

وكانت قيمة ف غير الدالة عند مستوى ٠,١، ٠,٥.

وللتأكد من عدم وجود فروق بين العينتين فى نفس المستوى تم حساب قيمة «ت» لدلالة الفروق وكانت كما يوضحها الجدول التالى رقم (٥٤):

جدول رقم (٥٤) يوضح دلالة الفروق (ت)

للمستوى الاجتماعى الاقتصادى

المقياس	المجموعة الضابطة			المجموعة التجريبية			ت	دالاتها
	١م	١ع	١ن	٢م	٢ع	٢ن		
مستوى اجتماعى اقتصادى	١٤,٠٨	٢,٥٢	٤٨	١٤,٠٢	٢,٧٦	٤٨	١١	غير دالة

وكانت قيمة «ت» غير دالة عند المستويين ٠,١، ٠,٥ مما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة بين المجموعتين فى المستوى الاجتماعى الاقتصادى كما يقيسه الاستمارة المستخدمة فى الدراسة، وتشير معايير هذه الدراسة إلى انتماء المجموعتين إلى فئة دنيا فى هذا المستوى. وهذا يدحض صحة الفرض الثانى القائل بوجود علاقة طردية بين الإدمان على المخدرات وانخفاض المستوى الاجتماعى الاقتصادى حيث كانت المجموعتين ينتميان إلى مستوى اجتماعى اقتصادى واحد ولكن لم

تشتركا معاً في سمة الإدمان إلا أن هذه التناقض تشير إلى انتماء المدمنين لمستوي اجتماعي منخفض

نتائج خاصة باختبار الشخصية المتعدد الأوجه :

لاختبار صحة الفرض الثالث الفائل بأن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين مدمني المخدرات وغيرهم من غير المدمنين في بعض سمات الشخصية، فقد تم تطبيق بعض مقاييس من اختبار الشخصية المتعدد الأوجه وهي (مقاييس توهم المرض، الهستيريا، الاكتئاب، والانحراف السيكيوباتي) وطبق أيضاً استبيان مستوي الطموح وقد عمل التحليلات الإحصائية لكل مقياس فقد قامت الباحثة بحساب للمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس توهم المرض، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٥٥).

جدول رقم (٥٥) يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري

لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس توهم المرض

المقياس	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة	
	م	ع	م	ع
توهم المرض	١٩ر٤٦	٤ر٤٥	١٠ر٤٠	٤ر٠٦
العينة	٤٨		٤٨	

حيث م = قيمة المتوسط الحسابي.

وحيث ع = قيمة الانحراف المعياري.

وقامت الباحثة بعد ذلك بحساب تحليل التباين لمعرفة دلالة قيمة ف للمجموعتين التجريبية والضابطة للتأكد من تجانس العينة أو عدمه على مقياس توهم المرض، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٥٦):

جدول رقم (٥٦) يوضح قيمة «ف» على مقياس توهم المرض
للمجموعتين التجريبية والضابطة

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	التباين	قيمة ف	دالتها
بين المجموعات	١٩٦٩ر٩٢	١	١٩٦٩ر٩٢	١٠٧٧	دالة
داخل المجموعات	١٧٣٦ر١٦	٩٤	١٨ر٢		

وكانت ف دالة عند مستوي ثقة ٠.٠١ .

وبحساب قيمة «ت» لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة، كانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٥٧):

جدول رقم (٥٧) يوضح دلالة قيمة «ت»
للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس توهم المرض

المقياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة			ت	دالتها
	م	ع	ن	م	ع	ن		
توهم المرض	١٩ر٤٦	٤ر٤٥	٤٨	١٠ر٤٠	٤ر٠٦	٤٨	١٠ر٢٨	دالة

وكانت قيمة ذات دلالة عند مستوي دلالة ٠.٠١ مما يوضح فروق ذات دلالة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في سمة توهم المرض، وهذا الفرق يوضح شيوع هذه السمة بين مدمني المخدرات من عينة البحث الحالي.

٢ - مقياس الهستيريا :

وبحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات المجموعتين

على مقياس الهستيريا كانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٥٨):

جدول رقم (٥٨) يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس الهستيريا

المقياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة		
	م	ع	ن	م	ع	ن
هستيريا	٢٧,٧٣	٦,٠٧	٤٨	١٩,٩٢	٦,٠٤	٤٨

وحسب تحليل التباين بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس الهستيريا وكانت كما يوضحها الجدول التالي رقم (٥٩)

جدول رقم (٥٩) يوضح قيمة «ف»

بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس الهستيريا

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	التباين	قيمة ف	دالتها
بين المجموعات	١٤٦٣,٩١	١	١٤٦٣,٩١	٣٩,٧	دالة
داخل المجموعات	٣٥١٣,١٢	٩٤	٣٧,٣٧		

وكانت قيمة «ف» دالة عند مستوى ٠,٠١.

ثم أخيراً تم حساب قيمة «ت» لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس الهستيريا، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول رقم (٦٠):

جدول رقم (٦٠) يوضح قيمة «ت» لدلالة الفروق

بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة (هستيريا)

المقياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة			ت	دالتها
	٢	٤	٥	٢	٤	٥		
هستيريا	٢٧٧٣	٦٠٧	٤٨	١٩٩٢	٦٠٤	٤٨	٦٢٩	دالة

ويتضح من الجدولين السابقين رقم (٥٩ ، ٦٠) أن هناك فروقاً ذات دلالة احصائية عند مستوي دلالة ٠.١ ر بين العينتين التجريبية والضابطة فى سمة الهستيريا، وكذلك فى الدرجات على المقياس المستخدم فى الدراسة بقياس هذا الغرض. مما يفيد زيادة انتشار هذا النوع من الاضطرابات النفسية لدى أفراد المجموعة التجريبية (وهى المجموعة المدمنة للمخدرات) ويتضح لنا من هذه النتائج ما تتسم به شخصية مدمنى المخدرات من: أفراد عينة هذا البحث، من قابلية للاستهواء والايعاء، وانه متقلب انفعالياً، وأن الاعراض الهستيرية التى يتميزون بها هى وسيلتهم فى التكيف، إذ يعتبر العرض الهستيري على الرغم من شدوذه ضرباً من ضروب التكيف الناقص، ذلك لأن المدمن عاجز عن مواجهة واقعه ونقائصه وقصور شخصيته، فيلجأ دائماً إلى أسباب وأقنعة تكيفيه يحاول بها تغطية ما يبدو عليه من قصور ونقص، وتعتبر الاعراض الهستيرية بمثابة هذه الأقنعة، أو نوعاً من التبرير لسلوكه الشاذ والذي يتمثل هنا فى إدمانه للمخدرات.

٣ - مقياس الاكتئاب :

وقد قامت الباحثة بتطبيق مقياس الاكتئاب من اختبار الشخصية المتعدد الأوجه وتم حساب المتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبية والضابطة وكذلك الانحراف المعياري وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالى رقم (٦١):

جدول رقم (٦١) يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري

لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس

الاكتئاب المستخدم في الدراسة

المقياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة		
	م	ع	ن	م	ع	ن
اكتئاب	٢٨,٤٤	٧,٧٣	٤٨	٢٠,١٩	٥,٦٧	٤٨

وحسب تحليل التباين لدرجات المجموعتين على نفس المقياس وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٦٢):

جدول رقم (٦٢) يوضح نتائج حساب قيمة «ف»

للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس الاكتئاب

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	التباين	قيمة ف	دالتها
بين المجموعات	١٤٧١,٥١	١	١٤٧١,٥١	١٥,١٨	دالة
داخل المجموعات	٤٤١١,٢٠	٩٤	٩٦,٩٣		

وكانت قيمة «ف» دالة عند مستوى ثقة ٠,٠١.

ويوضح هذا عدم تجانس العينتين في سمة الاكتئاب المقيسة، وللوقوف على دلالة الفروق بين متوسطات الدرجات للمجموعتين، قامت الباحثة بحساب قيمة «ت» لدلالة الفروق وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٦٣):

جدول رقم (٦٣) يوضح دلالة الفروق بين متوسطات درجات

المجموعتين «ت» مقياس الاكتئاب

المقياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة			ت	دالتها
	١م	١ع	ن	٢م	٢ع	ن		
اكتئاب	٢٨ر٤٤	٧ر٧٣	٤٨	٢٠ر١٩	٥ر٦٨	٤٨	٥ر٩٧	دالة

وكانت قيمة «ت» دالة عند مستوى ثقة ٠.٠١.

وتوضح النتائج المدونة في الجداول السابقة رقم (٦٢، ٦٣) وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في عرض الاكتئاب، يفيد هذا الفرق شيع الأعراض الاكتئابية بدرجة واضحة بين أفراد المجموعة التجريبية (مدمنة المخدرات) ويشير ذلك إلى ما يعانيه المدمن من اضطرابات في الشخصية يمثلها الاكتئاب بما يصحبه من التعاسة والمشاعر الاكتئابية، وانخفاض الروح المعنوية، والتشاؤمية، والانسجامية وعدم القدرة على التكيف مع ما يحيط به من أشخاص وأشياء، والانطوائية والهروب من الواقع.

٤ - مقياس الانحراف السيكوباتي :

وقد قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة على مقياس الانحراف السيكوباتي وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٦٤):

جدول رقم (٦٤) يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في مقياس الانحراف السيكوباتي

المقياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة		
	م	ع	ن	م	ع	ن
انحراف سيكوباتي	٢٨ر٢١	٥ر٠٧	٤٨	١٧ر٤٤	٤ر٩٣	٤٨

وتم حساب تحليل التباين بين المجموعتين التجريبية والضابطة وقد أسفرت النتائج عما يأتي في الجدول التالي:

جدول رقم (٦٥)

يوضح قيمة «ف» للمجموعتين التجريبية والضابطة

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	التباين	قيمة ف	دالتها
بين المجموعات	٥٧٨٣,٦٢	١	٥٧٨٣,٦٢		
داخل المجموعات	٣٨٣٧,١٢	٩٤	٤٠,٨٢	١٤١,٦٩	دالة

وكانت «ف» دالة عند مستوي ثقة ٠,١ ومما يفيد عدم تجانس العينتين في هذه السمة المرضية.

وقد قامت الباحثة بحساب قيمة «ت» لدلالة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٦٦):

جدول رقم (٦٦) يوضح قيمة «ت» ودلالة الفروق بين المجموعتين

على مقياس الانحراف السيكيوباتي

المقياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة			ت	دالتها
	١م	١ع	١ن	٢م	٢ع	٢ن		
انحراف سيكيوباتي	٢٨,٢١	٥,٠٧	٤٨	١٧,٤٤	٤,٩٣	٤٨	١٠,٤٦	دالة

ويتبين لنا من النتائج السابقة الموضحة في الجداول (٦٥، ٦٦) عدم تجانس عينتي البحث في عرض الانحراف السيكيوباتي، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بينهما في هذا النوع من اضطرابات الشخصية،

وتشير هذه الفروق إلى شيوع اضطراب الانحراف الميكوباتي وانتشاره كسمة مميزة لمجموعة البحث التجريبية وهي المجموعة المدمنة للمخدرات، ويعكس هذا الاضطراب ما تتسم به شخصية المدمن في هذا البحث من اندفاعية في إشباع نزواته العاجلة، وعدم أوضحت معظم الدراسات في هذا المجال، أن معظم مدمني المخدرات ذوو شخصية سيكوباتية، وأن من أهم سمات الشخصية السيكوباتية: الكذب، السرقة، والادمان على المخدرات والخمور، والشذوذ الجنسي، وعدم مراعاة المعايير الاجتماعية، وارتكاب الانفعالات الاجرامية دون تفكير في عواقبها أو دون تجنب انكشاف أمره.

أيضاً بصدد اختبار الفرض الثالث فقد تم تطبيق استبيان مستوي الطموح من اعداد كاميليا عبد الفتاح وحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة على هذا الاستبيان كانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٦٧):

جدول رقم (٦٧) يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري

لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة على استبيان مستوي الطموح

المقياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة		
	م	ع	ن	م	ع	ن
مستوي الطموح	٣٤٦٩	١١٦٣	٤٨	٥٢٧٩	١٤٠٢	٤٨

وقد قامت الباحثة بحساب قيمة «ف» للمجموعتين وكانت كما يوضحها الجدول التالي رقم (٦٨):

جدول رقم (٦٨) يوضح قيمة «ف» ودلالاتها للمجموعتين

التجريبية والضابطة على مقياس مستوي الطموح

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	التباين	قيمة ف	دالاتها
بين المجموعات	٨٢٦٧,٣٦	١	٨٢٦٧,٣٦		
داخل المجموعات	١٠٠٩١,٠٤	١٤٠	١٠٧٣٥	٧٧,٠١	دالة

وكانت قيمة ف دالة عند مستوى دلالة ٠,١ ر، وهذا يؤكد اختلاف العينتين في هذه السمة، ولمعرفة دلالة الفروق بين متوسط درجات المجموعتين، قامت الباحثة بحساب قيمة «ت» لدلالة الفروق، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (٦٩):

جدول رقم (٦٩) يوضح دلالة الفروق

بين المجموعتين (ت) على استبيان مستوي الطموح

المقياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة			ت	دالاتها
	١م	١ع	١ن	٢م	٢ع	٢ن		
استبيان مستوي الطموح	٣٤,٦٩	١١,٦٣	٤٨	٥٢,٧٩	١٤,٠٢	٤٨	٦,٨٠	دالة

وكانت «ت» دالة عند مستوى دلالة ٠,١ ر.

وتشير التحليلات السابقة لنتائج كل من مقياس توهم المرض، ومقياس الاكتئاب، ومقياس الهستيريا، والانحراف السيكوباتي، وأيضاً نتائج التحليلات الاحصائية لاستبيان مستوي الطموح، إلى صحة الفرض الثاني والقائل بشيوع بعض سمات الشخصية لدي مدمني المخدرات عن غيرهم، وكانت هذه السمات الشائعة هي: توهم المرض،

والاكتئاب، والهستيريا، والانحراف السيكوباتي، وأيضاً انخفاض مستوى الطموح - لديهم عن غيرهم من غير المدمنين وهذا يؤكد صحة هذا الفرض.

نتائج المقابلة الشخصية :

(أ) بداية الإدمان والمخدر :

١ - المخدرات التي تناولتها عينة البحث :

قرر أفراد العينة أنهم جربوا مجموعة من المخدرات في بداية تعاطيهم، كما أفرت بعض العينة أنهم قد جربوا جميع أنواع المخدرات، وكانت المخدرات المتداولة في بداية التعاطي كما يبينها الجدول التالي:

جدول رقم (٧٠)

يوضح المخدرات التي سبق تداولها بين أفراد العينة

المخدر	تكراره	نسبته المئوية/
حشيش	٤٣	٨٩,٥٣
أفيون	٣٤	٧٠,٨٣
هيروين	١٠	٢٠,٨٣
كوكايين	٣	٦,٢٥
كوادين	١٩	٣٩,٨٥
حبوب منبهة ومهدئة	٣	٦,٢٥

ويتضح من الجدول أن الحشيش هو أكثر المخدرات تداولاً إذ أقبل على تعاطيه النسبة العظمى من عينة البحث في بداية تعاطيها (٨٩,٥٣٪). ويلي الحشيش الأفيون حيث يعتبر المخدر الثاني بعد الحشيش فنسبة تعاطيه في بداية التعاطي عند أفراد عينة البحث تبلغ حوالى ثلاثة أرباع العينة (٧٠,٨٣٪) ويليه المنبهات والمهدئات وهى أقراص يبيعها التجار تحت أسماء مستعارة تحت المدمنين على شرائها وجميعه أسماء وضعها

لها التجار بغرض ترويج تجارتهم مثل (الحصان، الفانتوم، اسكاي هوك، الحب كله، أمل حياتي.. إلخ) وهى أسماء قد تغري الشباب وصغار السن على تجريب هذه الحبوب، وغالباً ما تسحق أقراص المنبهات والمهدئات معاً ثم توضع فى كوب من الشاي المغلى بدون سكر، ويقلب هذا الخليط ثم يشرب قبل الافطار فى الصباح الباكر. ويعرف تعاطى المهدئات والمنبهات فى كثير من الحضارات الغربية باسم (Sting up) ولكن تختلف طريقة التعاطى باختلاف المكان والثقافة.

المخدر المتداول الآن :

يبين الجدول التالى المخدرات التى يتناولها أفراد العينة والتى اختاروها دون غيرها لتكون مخدرهم المفضل، وهى كما ينعى الجدول التالى:

جدول رقم (٧١) يبين المخدرات المفضلة حالياً لدى عينة البحث

المخدر الحالي	تكراره	نسبته المئوية %
حشيش	٢٢	٤٥ر٨٣
أفيون	١٠	٢٠ر٨٣
حبوب منبهة ومهدئة (مخلوطة)	١٠	٢٠ر٨٣
كوكايين	١	٢ر٠٨
بودرة (بيور) كوداين	٣	٦ر٢٥
هيروين	٢	٤ر١٧
المجموع	٤٨	%١٠٠

ومن الجدول السابق يتضح أن الحشيش هو أكثر المخدرات إدماناً بين أفراد عينة البحث (٤٥ر٨٣ %)، وقد أرجع معظم أفراد العينة سبب إدمان الحشيش إلى أنه المخدر المتوافر حالياً حيث أن معظمهم كانوا مدمنى أفيون وتحولوا بعدها للحشيش لندرة الأفيون وقلة استيراده

وزراعتة، وعلو ثمنه إذ وجد في الاسواق. وقد أدلى معظم أفراد العينة للباحثة أنهم يقومون بخلط الحشيش ببعض الأقراص المهدئة أو المنبهة حتى تزيد من فاعليته، ويرجعون عدم فاعلية الحشيش إلى ما يقوم به خلط الحشيش بكثير من المواد الصناعية التي تفسد فاعليته (مثل الحناء).

السبب في التركيز على مخدرون غيره :

ويسأل أفراد العينة عن السبب الذي جعلهم يستمرون في المخدر الذي يتناولونه حالياً أدلى أفراد العينة بإجابات تختلف باختلاف المخدر، وكانت الاجابات كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (٧٢) يبين السبب في التركيز على مخدر معين دون غيره

(أ) بالنسبة للحشيش :

السبب	ك	%
الأصدقاء	١٠	٤٥ر٤٥
منشط جنسياً	٦	٢٧ر٢٧
لأنه غير محرم	٢٠	٩ر٠٩
لأنه بسيط	٢	٩ر٠٩
مسألة تعود	٢	٩ر٠٩

(ب) الأفيون :

جدول رقم (٧٣)

السبب	ك	%
الأصدقاء	٤	٤٠
تقليد الوالد	٢	٢٠
قوة تأثيره	٢	٢٠
منشط	٢	٢٠

(ج) المهدئات والمنبهات :

جدول رقم (٧٤) يوضح الأسباب فى استمرار

إدمان المهدئات والمنبهات

السبب	ك	%
الأصدقاء	٥	٥٠
سهولة الحصول عليها وتوافرها	٣	٣٠
لتخفيف آلام منع الأفيون	٢	٢٠

(د) باقى المخدرات الأخرى :

جدول رقم (٧٥) يوضح السبب فى التركيز على إدمان

هذه المخدرات (الكوكايين، الكوداين، هيروين) دون غيرها

السبب	ك	%
الأصدقاء	٣	٥٠
وفرة المال	١	١٦٫٦٧
الرغبة فى الفرفشة	١٠	١٦٫٦٧
قوة أثر المخدر (هيروين)	١	١٦٫٦٧

ويلاحظ من الجداول السابقة رقم (٧٣) ورقم (٧٤) ورقم (٧٥) أن من أكثر الأسباب التى أدت إلى الاستمرار فى مخدر بعينه مع تكرار هذا السبب باختلاف المخدر كان مجموعة الأصدقاء، ويوضح هذا ما تنسم به شخصية المدمن من سلبية واتكالية، فهو لا يختار المخدر الذى يدمنه ويركن فى اعتماده على المخدر على مجموعة من الأصدقاء يختارونه له، فهو شخصية منقاد للجماعة. كما أن سيادة الاعتقاد الخاطئ بالنسبة للحشيش بأنه منشط جنسياً قد جعل الأفراد يستمرون فى تعاطيه

ويقبلون عليه دون غيره من المخدرات الأخرى، وعلى الرغم من إثبات عدم صحة هذا الاعتقاد، فقد قرر المتعاطون للحشيش أنه يؤدي إلى الضعف الجنسي، إلا أنهم يختارون من الأسباب ما يبررون به تعاطيهم للمخدر للتخفيف من وطأة الإحساس بالذنب من ارتكابهم لسلوك الإدمان. وقد كان للبيئة أيضاً أثرها في اختيار المخدر، إذ يقوم الفرد بتقليد والده أو أحد أفراد أسرته وذلك كما يتضح من جدول رقم (٧٣) أن ٢٠٪ من مدمني الأفيون في هذا البحث استمروا في تعاطيهم للمخدر تقليد السلوك الأب أو أحد أفراد العائلة، وكذلك للسهولة في الحصول على المخدر وتوافره مما كان له الأثر في استمرار الإدمان وهذا يعكس مؤشرات اجتماعية تتميز بها بيئة المدمن وكذلك عدم احكام الضبط على حركة المخدر وتوافره، وضعف العقوبات للمدمن عليه دفع الكثير إلى الاستمرار في التعاطي.

(ب) التاريخ الإدماني عند المدمن :

■ العمر الزمني عند بداية التعاطي :

ويوضح الجدول التالي رقم (٧٦) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للعمر الزمني لعينة البحث عند بداية تعاطيهم للمخدر:

جدول رقم (٧٦) يوضح المتوسط الحسابي

ي

لسن المجموعة المدمنة عند بداية الإدمان

البيان	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
السن عند بداية التعاطي	١٨٫٢٥	٣٫٦٩
مجن	٤٨	

وقد قسمت أيضاً الباحثة سن المجموعة إلى فئات وكانت كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (٧٧) يوضح فئات السن المختلفة

وتكرارها عند بدايه التعاطى

فئات السن	ت	/
١ - ١٢	٦	١٢ر٥
١٣ - ١٥	٧	١٤ر٥٨
١٦ - ١٨	١٤	٢٩ر١٧
١٩ - ٢١	١٣	٢٧ر٠٨
٢٢ - ٢٤	٢	٤ر١٧
٢٥ - ٢٧	٣	٦ر٢٥
٢٨ - ٣٠	٣	٦ر٢٥

ويتضح من الجدولين السابقين أن المتوسط الحسابى للسن فى بداية الإدمان كان (١٨ر٢٥) لذي عينة البحث، كما أن أكثر فئات السن تكراراً عند بداية التعاطى (١٦ - ١٨)، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه الكثير من الدراسات من أن الإدمان عادة ما يبدأ عند صغار السن والشباب وذلك كـرغبة أي منهم فى تقليد عالم الرجال، ولسد ما يشعرون به من مشاعر عجز واحباط يتلقونها من البيئة التى تحيط بهم، وعجزهم أيضاً عن التكيف مع بيئة الرجولة الجديدة بما تتضمنه من مسؤوليات وأعباء، هذا الفشل فى التكيف يدفعهم إلى الهروب إلى المخدر كوسيلة لراحتهم من آلام العجز والقصور وكوسيلة للتوافق الناقص بينهم وبين متطلبات دافعهم.

■ الكمية المأخوذة فى بداية التعاطى :

ويوضح الجدول التالى الكميات التى بدأ بها المدمنون تعاطيهم للمحدر، وقد أدلى المدمنون بكميات مختلفة تختلف باختلاف المخدر.

جدول رقم (٧٨) يوضح الكميات التي بدأ بها

المدمنون تعاطيهم للمخدر

الكمية/حشيش	ك	%	أفيون ك	%
فرش كامل (*)	٣	١٣,٣٧	٢	٢٠
فرش ١	٩	٤٠,٩١	٢	٢٠
فرش ٤	٤	١٨,١٨	٤	٤٠
أقل من ذلك	٦	٢٧,٢٧	٢	٢٠

ويوضح الجدول التالي كمية المنبهات والمهدئات التي كانت تؤخذ في بداية التعاطي.

جدول رقم (٧٩) يوضح كمية المهدئات والمنبهات

التي بدأ بها المدمنون تعاطيهم

عدد الأقراص	ك	%
٣	٤	٤٠
٥	٣	٣٠
٧	٣	٣٠

وقد قرر المدمنون أن هذه الكمية قد استمرت لمدة طويلة ثابتة عند بداية تعاطيهم، ولكنهم اضطروا إلى زيادة هذه الكمية بعد ذلك وقد أرجعوا هذه الزيادة إلى غش المخدرات بمواد أخرى تجعلها تفقد قدرتها التأثيرية، ولكن هذه الزيادة قد يكون سببها الاطاقة النفسية والجسمية التي تدفع الفرد إلى زيادة كمية المخدر نتيجة لتعوده عليه مما يجعل آثار الجرعة الأولى تخف بعد التعاطي بمدة فيضطر المدمن إلى زيادة الجرعة ليصل إلى نفس الأثر.

(*) يزن الفرش حوالي $\frac{1}{4}$ غرام تقريبا.

٢ = السبب في تعاطي المخدر في أول مرة :

ويوضح الجدول التالي الأسباب التي دفعت المدمن لتعاطي المخدر في المرة الأولى لتعاطيهم:

جدول رقم (٨٠) يوضح الأسباب التي أدت بالمدمن

إلى تعاطي المخدر في أول مرة

السبب	ك	%
الأصدقاء	٢٣	٤٩٫٩٢
التنشيط الجنسي	٧	١٤٫٥٨
حب الاستطلاع	٧	١٤٫٥٨
التخلص من آلام مرضية	٤	٨٫٣٣
لنسيان الحزن	١	٢٫٠٨
الاتجار في المخدر	٣	٦٫٢٥
توافر المال	٣	٦٫٢٥

وبالنظر إلى الجدول السابق يتضح لنا أيضاً أن جماعة الأصدقاء هم أكثر نسبة محروسة على تعاطي المخدر في المرة الأولى (٤٩٫٩٢) وهذا يؤكد النظرة الانتشارية (الوبائية) لتعاطي المخدر والتي تقول بأن وجود مدمن واحد يعتبر خطراً على البيئة الموجودة فيها ، فقد تنتقل عدوي إدمانه إلى من هم أصغر منه سناً إما بقوة إبحائه عليهم باخبارهم عما يجلبه المخدر من آثار مفرحة ، أو لمن هم في سنه كمحاولة منهم لتقليد ما يقوم به ، وكذلك انتشار هذه العدوي بين من لديهم الاستعداد للإدمان ، ويلي الأصدقاء حب الاستطلاع والسلوك الجنسي كدافعان لتعاطي المخدر في المرة الأولى (١٤٫٥٨) ، وهذا يبين مدى انتشار الاعتقادات الخاطئة في مجتمعات المدمنين ، فهي اعتقادات تحقق لهم ظاهرياً الاحساس بالقدرة والتفوق والتخلص من الآلام عن طريق شعورهم بهذا الاقتدار الوهمي الذي يمنحه لهم المخدر .

■ الآثار الناتجة عن التعاطى فى أول مرة :

قررت نسبة كبيرة من العينة أنهم سشعروا من جزاء تعاطيهم للمخدر فى المرة الأولى بتنميل ورعشة فى الجسم، وعدم القدرة على الوقوف ودوخة وزغللة، مع فقدان فى الوعي وتعب فى الجسم، ورغبة فى القيء والشعور بصداق شديد مع رغبة فى الجنس، والشعور كأن شيئاً يقف فى الزور، وزيادة فى النشاط، وعدم القدرة على النوم، وهذا بالنسبة للأنثى الجسمية، أما بالنسبة للآثار النفسية، فقد قرروا الشعور بالفرفة والانيساط، إلا أن هذه الآثار لم تبدأ مع كل المخدرات ولكن اختص بها الحشيش فتط وكل ما تختص به المخدرات الاخرى هو الشعور بالنوم العميق والذي قد يستمر يومين كاملين.

■ أسلوب التعاطى عند بداية الإدمان، والآن، وأفضل طرق التعاطى :

ويسأل العينة عن الطريقة التى بدأوا بها التعاطى للمخدر، ثم الطريقة التى استمروا فيها حالياً فى التعاطى، وأفضل الطرق جميعاً التى تسبب استمتاع أكثر بالمخدر كانت إجاباتهم كما يوضحها الجدول التالى:

جدول رقم (٨١) يوضح طرق التعاطى المختلفة

فى بداية الإدمان و حالياً وأفضل الطرق للتعاطى

الطريقة	عند بداية التعاطى		حالياً		أفضل الطرق	
	ك	%	ك	%	ك	%
بلغ	٥	١٠.٤٢	٥	١٢.٥	٦	١٢.٥٠
استحلاب	٥	١٠.٤٢	٥	١٢.٥	٧	١٤.٥٨
جوزة	١٧	٣٥.٤٢	١٧	٣١.٥	١٥	٣١.٢٥
لف فى سيجارة	٩	١٨.٧٥	٩	١٤.٥٨	٧	١٤.٥٨
مذاب فى مشروب ساخن	٨	١٦.٦٧	٨	٢٠.٨٣	٩	١٨.٧٥
الشم	٢	٤.١٧	٢	٤.١٧	٢	٤.١٧
الاكل بمفرده	٢	٤.١٧	٢	٤.١٧	٢	٤.١٧

وقد اتضح للباحثة أن هناك بعض المدمنين يستخدمون أكثر من طريقة للتعاطي، والأسلوب الشائع هو الأسلوب الفموي بشتى محوره، وقد بلغت نسبة التعاطي عن طريق النجم في بداية التعاطي حوالي (٩١٪) بترقيد المخترلفة، وحيالياً يشكل التعاطي الفموي نفس النسبة. كسأ أنه يسأل المدمنين عن أفضل الطرق للتعاطي قرروا أنها الطريقة التي يستخدمونها حالياً والمتمركزة معظمها في التعاطي الفموي. وقد أوضح هذا سمة مميزة لسلوك مدمني المخدرات الذي يتصف بالجمود والصلابة وعدم القدرة على التغيير، فهو يري أن ما يفعله دائماً هو أفضل سلوك ولا يسعى لتعديله.

■ المنصرف على المخدر عند بداية التعاطي، والآن :

ويوضح الجدول التالي كمية ما يصرف من دخل الفرد على الجرعة اليومية للمخدر عند بداية التعاطي وحيالياً:

جدول رقم (٨٢) يوضح المنصرف يومياً

على جرعة المخدر حالياً وعند بداية التعاطي

المنصرف على المخدر حالياً		المنصرف على المخدر بالجنيه	عند بداية التعاطي		المنصرف على المخدر بالقروش
			٪	ك	
١٠.٤٢ر	٥	١ جنيه	٢.٨٣ر	١٠	١٠ قروش
٨.٣٣ر	٤	١.٥ جنيه	١٤.٥٨ر	٧	٢٥ قروش
١٠.٤٢ر	٥	٢ جنيه	١٢.٢٥ر	٦	٤٠ قروش
٨.٣٣ر	٤	٣ جنيه	١٠.٤٢ر	٥	٥٠ قروش
١٤.٥٨ر	٧	٤ جنيه	١٠.٤٢ر	٥	٦٠ قروش
١٤.٥٨ر	٧	٥ جنيه	٢.٨٣ر	١٠	٧٥ قروش
٢.٨٣ر	١٠	٧ جنيه	١٠.٤٢ر	٥	١٠٠ قروش
١٢.٢٥ر	٦	١٠ جنيه			

وبالنظر إلى الجدول السابق نلاحظ التفاوت والارتفاع الرهيب في أسعار المخدرات حالياً بمقارنتها بما كان يصرف على الجرعة عند بداية التعاطي، فقد كان أقل ما يصرف على المخدر عند بداية التعاطي ١٠ قروش وكانت أعلى نسبة من المتعاطين تصرف هذا المبلغ على العقار (٢٠٨٣)، يقابلها نفس النسبة حالياً (٢٠٨٣) مع الاختلاف في المبلغ المنصرف على الجرعة ٧ جنيهات وهي أعلى مبلغ يصرف على المخدر لدى عينة البحث. وكان أقل مبلغ يصرف حالياً واحد جنيه (١٠٤٢). ويعكس هذا الارتفاع الرهيب في أسعار المخدرات وإصرار مدمنيها على تعاطيها وقد قررت نسبة من المتعاطين أنه قد تدفعه حاجته الرهيبة للمخدر إلى بيع أثاث منزله أو حتى التخلي عن أحد أبنائه لأنه لا يطيق تحمل آثار المنع الناجمة عن غياب المخدر، ومن الجدول السابق رقم (٨٢) يتضح لنا أن متوسط ما يصرف بالجنيه على الجرعة اليومية للمخدر هو (٤٩٢) جنيه، وهذا الدخل يفوق بكثير أعلى دخل يومي للفرد العادي، وللمدمن من أفراد هذا البحث، لذلك يهمل المدمن كل حاجاته الشخصية ومسؤولياته الأسرية لكي يحصل على المخدر، فقد انحصرت طموحات المدمن وآماله وأهدافه في مجرد الحصول على الجرعة اليومية للمجدر، فالمخدر هو مركز اهتمامه وتفكيره.

■ عدد مرات تعاطي المخدر عند بداية التعاطي والآن :

وبسؤال المدمنين عن عدد مرات تعاطيهم للمخدر في بداية التعاطي وحالياً كانت اجاباتهم كما يوضحها الجدول التالي:

بجدوله رقم ٨٢، يوضح عدد مرات التعاطي اليومي

عندما يتعدى الأسبوعي وعدده المرات أسبوعياً

عدد مرات التعاطي يومياً	ك	%	عدد مرات التعاطي أسبوعياً	ك	%
مرة واحدة	١٦	١٢ و ٣٣	مرتان	١	١٧ و ٤
مرتان	٦	٤ و ١١	ثلاث مرات	٥	١٠ و ١٢
ثلاث مرات	٤	٢ و ٤٤	أربع مرات	٢	٣ و ٨
أربع مرات	٤	٢ و ٥١	خمس مرات	١	٨ و ١٠
أكثر من ذلك	-	-	أكثر من ذلك	٥	٢ و ١٠

بجدوله رقم (٨٤)

يوضح عدد مرات التعاطي اليومي المستعمل حالياً

عدد مرات التعاطي يومياً	ك	%	عدد مرات التعاطي أسبوعياً	ك	%
مرة واحدة	٣	٥ و ٦	مرتان	٢	١٧ و ٤
مرتان	٤	١٠ و ٤٢	ثلاث مرات	٣	٥ و ٦
ثلاث مرات	٧	٨ و ٤٤	أربع مرات	٥	٢ و ١٠
أربع مرات	٦	٤ و ١١	خمس مرات	٤	٣ و ٨
خمس مرات	٦	٤ و ١١	ست مرات	١	١٧ و ٤
أكثر من ذلك	٥	١ و ١٠	أكثر من ذلك	-	-

ويستخرج من الجدولين السابقين رقم (٨٣)، رقم (٨٤) زيادة عدد مرات التعاطي للمخدر بزيادة مدة تعاطيه، وقد يرجع هذا إلى ما يحدثه المخدر من اعتياد جسدي وتبعية يدفع المدمن إلى زيادة الجرعة المتعاطاها أو

زيادة عدد مرات التماس إلى المؤسسة حتى يحدث حشد نفسه في الأمر الذي
أثار الخدر عند بداية التعاطي.

(ب) الامتناع عن المخدر :

أ- نهاية الامتناع عن المخدر :

وقد قوت نسبة كبيرة من المتعاطين أنهم فكروا جيداً في منع المخدر
لأنهم من مرة واحدة فكروا في الاستمرار في الامتناع نتيجة لأسباب
متعددة.

وفي الجدول التالي يوضح عدد الأفراد الذين فكروا في الامتناع عن المخدر:
بجدول رقم (٨٤) يوضح على فكر الممنوع في الامتناع عن المخدر أم لا

المحاولة	ك	%
نعم	٣٣	٦٨ و ٧٤
لا	١٥	٣١ و ٢٤

ويوضح الجدول التالي عدد مرات الامتناع عن المخدر ونسبة عدد
المتنعين.

جدول رقم (٨٥) يوضح عدد محاولات الممنوعين الامتناع عن المخدر

عدد مرات الامتناع	عدد المتنعين	%
١	٤	١٢ و ١٢
١	٥	١٨ و ١٨
٢	٣	٩ و ٩
٤	٢	٩ و ٩
٥	٤	١٢ و ١٢
أكثر من ذلك	١٤	٢٩ و ٢٩

■ المدة التي استمر فيها المدمن ممتنعاً عن المخدر كالآتي:

يوضح الجدول رقم (٨٧) مدة الامتناع الفعلية

عن المخدر بالنسبة لعدد المدمنين الممتنعين

المدة	ك	%
يوم واحد	٤	١٢ر١٢
ثلاثة أيام	٥	١٨ر٨
سبعة أيام (اسبوع)	٤	١٢ر٢
شهر	٥	١٨ر٨
ثلاثة اشهر	٦	١٨ر٨
اربعة اشهر	٧	٢١ر٢١
سنة	٢	٦ر٠٦

■ السبب الذي دفع إلى الامتناع :

وعن الأسباب التي دفعت المدمنين إلى التفكير في الامتناع كانت

إجاباتهم كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (٨٨) يوضح الأسباب التي دفعت المدمنين

إلى الامتناع عن المخدر

السبب	ك	%
غلو ثمن المخدر	١٥	٤٥ر٤٥
التعب الصحي من المخدر	٨	٢٤ر٢٤
اتضايقت من نفسي	٢	٦ر٠٦
المسؤولية	٥	١٥ر١٥
عدم توافر المخدر	٣	٩ر٠٩

■ الآثار الناجمة عن المنع :

وقد أوضح المانون في إجاباتهم أن المخدر يسبب لهم أعراضاً جسمية مثل: وجع في كل أجزاء الجسم، آلام، عدم القدرة على الوقوف، مفص وألم شديد في البطن، صداع شديداً، ضيق في التنفس، تعذب في المعدة فقدان في الشهية، رشح في الأنف، دوخة، دموع مستمرة. وأعراض نفسية:

نرفزة وضيق وعدم على التحمل، تهور وغضب لأتفه الأسباب، توهمان وفقد الوعي، وعدم قدرة على النوم، مع وجود كوابيس وأحلام مزعجة أثناء الفترات المتقطعة من النوم، رؤية أخيلة وأشخاص وسماع أصوات وخوف شديد ورهبة من أقل شيء.

وبالنظر إلى الجداول السابقة رقم (٨٦)، ورقم (٨٧)، ورقم (٨٨) والتي توضح خبرة الامتناع عن المخدر والمحاولة للامتناع، وعدد مرات الامتناع والسبب في الامتناع، نجد أن نسبة كبيرة من أفراد العينة (٦٨٧٥) قد حاولوا فعلاً الامتناع عن المخدر، وقد قرروا أن محاولتهم كانت بالبعد فقط عن مكان التعاطي والأصدقاء المتعاطين وأخذ عهد على النفس بعدم تعاطي المخدر مرة أخرى، وبلغت أكبر مدة للامتناع عن المخدر سنة واحدة وأقل مدة يوم واحد، وكانت أعلى نسبة من الممتنعين (١٢١٢) قد امتنعوا لمدة أربعة أشهر. وبالسؤال عن سبب الامتناع قرروا أن ضعف الإيراد المادي وغلو ثمن المخدر (٤٥٤٥) هو السبب الأكثر تردداً، ويليه ما سببه المخدر من تدهور في صحة المدمنين (٢٤٢٤). ومن هذه النتائج يتضح لنا أن شخصية المدمن شخصية سلبية لا تملك القرار، فهو لم يفكر في منع المخدر إلا عندما فرض عليه هذا بطريقة غير مباشرة عن طريق إرتفاع سعر المخدر والتدهور الصحي المصاحب للتعاطي، وهذه أسباب قهرية دون إرادته دفعته للامتناع عن المخدر. ويعكس هذا ما تتسم به شخصية المدمن من نفسية ضعيفة واتكالية وسلبية وانقيادية، تنقاد دائماً لثلة الاصدقاء حيث قررت نسبة

منهم (٤٥,٦٩) أنهم رجعوا لتناول المخدر مرة أخرى نتيجة لمقابلتهم
لثلاثة الاصدقاء المتناولين والتواجد في أماكن يتوافر فيها المخدر، ونسبة
قليلة قررت أن يرجعهم للمخدر ناتج عن آثار المنع التي خبروها أثناء
منعهم للمخدر (٢٤,٢٤) وهذا يؤكد نظرية التعلم في نظرتها للإدمان،
حيث قالت أن رؤية مكان التعاطي أو الاصدقاء يعتبر بمثابة مثير شرطى
يدفع الفرد إلى تكرار السلوك، وكذلك آلام المنع تعتبر بمثابة تعزيز سلبى
للرجوع لعادة الإدمان، ولم يفكر المدمن فى طريقة تخلصه من الآلام إلا
محاولته تحريب قطعة من المخدر مرة أخرى، وبمجرد زوال آثار المنع
بتعاطى المخدر يعتبر هذا تعزيزاً إيجابياً يدفع المدمن إلى تكرار التعاطي
للحصول على هذا التعزيز. كما يوضح هذا أن شخصية المدمن عاجزة عن
التفكير فى حل بديل أو معالجة المشكلة معالجة موضوعية جديدة، فكل
معالجته تنصب على المخدر وخبرته به، كما أن اهتماماته أصبحت كلها
متمركزة حول المخدر فقد أصبح وسيلته فى حل مشاكله، فالمخدر هو
مركزاً اهتمامه وتفكيره ووسيلته فى التوافق أو إعادة التوازن. وقد قررت
نسبة أخرى ان الدافع الجنسى (٧٠,٢٪) هو السبب فى العودة للمخدر
مرة أخرى ذلك لأن منع المخدر سبب لهم سرعة فى القذف وهذا الاتجاه
الجنسى هو الاتجاه السائد لدى أفراد هذه المجموعة إلى جانب ما يتصفون
به من اضطرابات شخصية وسلوكية أخرى.

■ تعرض المدمن لخبرة عدم توافر المخدر :

ويسؤال المدمنين عن سلوكهم أثناء تعرضهم لخبرة عدم توافر المخدر
كانت إجاباتهم كما يوضحها الجدول التالى:

جدول رقم (٨٩) يوضح «ملاك المدمن» في حالة عدم توافر المخدر

السلوك المتبع في حالة عدم توافر المخدر	ك	%
أبحث عن مخدر بديل	١٠	٢٠ر٨٣
أبحث عن أحد الأصدقاء استلّف منه المخدر	٢٠	٤١ر١٧
أبيع أثاث البيت	٩	١٨ر٧٥
أبحث عن نقود حتى ولو بالسرقة والقتل	٢	٤ر١٧
	٧	١٤ر٥٨

ويوضح الجدول التالي الآثار التي خبرها المدمنون في حالة عدم توافر المخدر:

جدول رقم (٩٠) يوضح آثار الامتناع عن المخدر

الأثر	ك	%
نرفزة وضيق نفسى	٢٥	٥٢ر٠٨
عدم قدرة على العمل	١٠	٢٠ر٨٣
آلام جسمية	١٥	٣١ر٢٥
احساسات اخري (رشح وصدايح ووجع فى المفاصل... إلخ من الآثار الجسمية).	١٥	٣١ر٢٥

وبالنظر للجدولين السابقين رقم (٨٨)، ورقم (٨٩) نجد أن خبرة عدم توافر العقار تسبب للمدمن الاحساس بأعراض المنع السابق توضيحها في جدول (٩٠)، وتكون هذه الاعراض عنيفة بالنسبة للمجموعة غير الراغبة في المنع، فيتحول المدمن بكل كيانه للتفكير في كيفية الحصول على المخدر، فقد يبيع أثاث منزله ويتخلى عن مسؤولياته أو يرتكب جريمة قتل أو سرقة، فالمخدر والحصول عليه هما كل ما يشغلان المدمن ولا يفكر

المدمن فى عاقبة سلوكه لأنه يكون قد هدأ ما يشعر به من آلام، فالمخدر هو دائرة تفكيره سواء فى حالة التخدير أو غيرها.

■ مكان شراء المخدر من مدينة الاسكندرية :

وقد أجاب الافراد عن مجموعة من الاحياء المختلفة فى مدينة الاسكندرية يقومون بشراء المخدر منها، وكانت إجاباتهم كما يوضحها الجدول التالى:

جدول رقم (٩١) يوضح أحياء بيع المخدر فى مدينة الاسكندرية

اسم الحى	ك	%
كوم الدكة	٩	١٨٫٧٥
جبل ناعسة	٣	٦٫٢٥
بحري (المنشية، حارة بأطرية، حارة اليهود،		
حارة أبنتجاية، الجمرك)	١٠	٢٠٫٨٣
محرم بك (نادي الصيد)	٨	١٦٫٦٧
مينا البص (الليان - راغب)	٨	١٦٫٦٧
العامرية (العجمى - والدخيلة)	٧	١٤٫٥٨
باكوس	٣	٦٫٢٥

وقد ظهر للباحثة من جداول تصنيف الاحياء بمحافظة الاسكندرية أن معظم هذه المناطق تعتبر فى تقسيمها من المناطق دون المتوسط فى مستواها الايكولوجى والبيئى، وقد أوضحت قوائم أسماء المتاجرين والمدمنين للمخدرات التى اطلعت عليها الباحثة من مكاتب المكافحة أن معظمهم قد أتوا من هذه الاحياء، وأحياء أخرى متشابهة لها فى المستوى الايكولوجى والاجتماعى وهذا يؤكد ما أشارت إليه معظم الدراسات من أن مدمنى المخدرات يأتون من بيئات منحلّة اجتماعياً سواء بالتوزيع

الايكولوجى أو بالسمات المميزة لهذه البيئات، فهم يسكنون أماكن حقيرة.

■ بداية ظهور الإدمان :

وقد قررت الفينة فى السؤال الخاص بالمدة التى شعر بعدها بعدم القدرة على الاستغناء عن المخدر إجابات مختلفة وكانت كما يوضحها الجدول التالى:

جدول رقم (٩٢) يوضح المدة اللازمة لحدوث الإدمان وعدد مرات التعاطى اللازمة لهذا الحدوث كما قررها أفراد عينة البحث

المدة وعدد المرات	ك	%
٣ مرات متتالية (ثلاثة أيام)	٤	٨٣٣
شهر من التعاطى المتتالى	٦	١٢ر٥
ثلاثة شهور تعاطى متتالى	١٥	٣١ر٢٥
٧ أشهر من التعاطى المتقطع	١١	٢٢ر٩٢
سنة من التعاطى المتقطع	١٢	٢٥

ويتضح من الجدول السابق أن أقل عدد مرات التعاطى وأقل مدة للشعور بعدم الاستغناء عن المخدر هى ثلاثة أيام متتالية، وثلاث مرات من التعاطى، وأن أطول مدة للشعور بعدم الاستغناء عن المخدر هى سنة من التعاطى المتقطع، وأكثر المدد تكراراً لدى أفراد العينة هى ثلاثة أشهر (٣١ر٢٥) وقد يرجع التفاوت فى عدد المرات للمدد اللازمة لحدوث الإدمان والشعور بعدم القدرة على الاستغناء عن المخدر إلى الفروق الفردية لدى عينة البحث فى الارجاعات الفسيولوجية، وكذلك اختلاف خصائص التعاطى ونوع المخدر، والاختلاف فى سمات شخصية المدمن ومدي الاضطراب فيها ونوعه.

(د) أثر الإدمان على بعض النواحي العقلية والمعرفية :

■ الآثار الادراكية :

ويسؤال المدمنين عن المدة اللازمة للاحساس بأثر المخدر بعد تعاطيه
أجابوا إجابات مختلفة كانت كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (٩٣) يوضح المدة اللازمة لدي

عينة البحث للاحساس بأثر المخدر

المدة	ك	%
خمس ٥ دقائق	٥	١٠,٤٢
عشر ١٠ دقائق	١٨	٣٧,٥
خمس عشرة ١٥ دقيقة	١٢	٢٥
ثلاثون ٣٠ دقيقة	١١	٢٢,٩٢
خمس وأربعون ٤٥ دقيقة	٢	٤,١٧

ويتضح من الجدول السابق أن أقل مدة لازمة للاحساس بأثر المخدر
هى خمس دقائق وأعلى مدة خمس وأربعون دقيقة، وقد يرجع هذا
التفاوت في المدة إلى الاختلاف في طريقة التعاطي ومدة الإدمان
وطبيعة المخدر وجودته، والفروق في الارجاجات النفسية والجسمية لدي
المتعاطين.

■ الاحساس بالوقت :

ويسؤال المدمنين عن إدراكهم للوقت وهم تحت تأثير المخدر كانت
إجاباتهم كالآتي:

جدول رقم (٩٤) يوضح إدراك المدمنين للوقت وهم في حالة التخدير

الإدراك	ك	%
سريع	٣٠	٦٢٫٥
بطيء	١٠	٢٠٫٨٣
عادي	٨	١٦٫٦٧

■ الاحساس بالمسافات :

ويسؤال المدمنين عن إدراكهم للمسافات وهم تحت تأثير المخدر كانت إجاباتهم كالآتي:

جدول رقم (٩٥) يوضح إدراك المدمنين

للمسافات وهم في حالة التخدير

إدراك المسافات	ك	%
قريبة أو صغيرة	١٠	٢٠٫٨٣
عادية	١٥	٣١٫٢٥
كبيرة أو بعيدة جداً	٢٣	٤٧٫٩٢

■ الاحساس بالاصوات :

ويسؤال المدمنين عن إدراكهم للاصوات وهم تحت تأثير المخدر كانت إجاباتهم كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (٩٦) يوضح إدراك المدمنين

للاصوات وهم تحت تأثير المخدر

الاحساس بالصوت	ك	%
عال (واضح جداً)	٢٤	٥٠
منخفض، واطئ (غير واضح)	١٠	٢٠.٨٣
عادي	١٤	٢٩.١٧

■ الاحساس البصري :

ويسؤال المدمنين عن إدراكهم البصري وهم تحت تأثير المخدر كانت إجاباتهم كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (٩٧)

يوضح إدراك المدمنين للرؤية وهم تحت تأثير المخدر

الرؤية	ك	%
واضحة جداً	٧	١٤.٥٨
عادية	٣٠	٦٢.٥
مهزوزة	١١	٢٢.٩٢

■ إدراك الألوان :

ويسؤال المدمنين عن إدراكهم للالوان وهم تحت تأثير المخدر كانت إجاباتهم كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (٩٨)

يوضح إدراك المدمنين للالوان وهم تحت تأثير المخدر

الإدراك	ك	%
بهتانة (غير واضحة)	٨	١٦٫٦٧
مزهوة (أوضح من العادية)	١٥	٣١٫٢٥
عادية	٢٥	٥٢٫٠٨

(هـ) الآثار على التفكير :

ويسؤال المدمنين هل تتغير افكارهم تحت المخدر أم تظل كما كانت
 وإجاباتهم كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (٩٩) يوضح التغيرات في الافكار

أو عدمها لدى المدمنين وهم تحت تأثير المخدر .

الافكار	ك	%
هى هى (لم تتغير)	١٨	٣٧٫٥
تتغير	٣٠	٦٢٫٥

■ كيفية التغير في التفكير كما قررها المدمنون :

ويسؤال المدمنين عن ماهية التغيرات التي تطرأ على أفكارهم كانت
 إجاباتهم كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (١٠٠) يوضح أنواع التغيرات
التي تحدث لتفكير المدمنين وهم تحت تأثير المخدر

التغير	ك	%
أفكر كويس جداً	١٧	٣٥ر٤٢
أبقى تايه ومش قادر أفكر أبداً	١١	٢٢ر٩٢
أبقى شايف الدنيا جميلة جداً	١٣	٢٧ر٠٨
يبقى تفكيري بطيء جداً	٥	١٠ر٤٢
أكره المخدرات وأفكر أبطلها	٢	٤ر١٧

■ وعن وجود أفكار ملحة :

لحة كانت إجاباتهم كالآتي: ٣٣ فرداً^{٨٨} ويسألهم عن وجود فكرة م (٦٨ر٧٥) قرروا وجود أفكار ملحة لديهم في أثناء حالة التخدير. والباقي ١٥ فرداً (٣١ر٢٥) قرروا أنه لا توجد هذه الأفكار الملحة لديهم.

■ طبيعة هذه الأفكار الملحة :

ويسأل المدمنين عن طبيعة هذه الأفكار الملحة كانت إجاباتهم كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (١٠١) يوضح الأفكار الملحة

التي تسيطر على المدمنين أثناء حالة التخدير

الفكرة	ك	%
أفكار جنسية	٥	١٥ر١٥
خوف من عدم وجود المخدر بعد ذلك	١٧	٥١ر٥٢
أفكر في منع المخدر	٦	١٨ر١٨
أفكر في الموت للتخلص من الآلام	٢	٦ر٠٦
أفكر أضرب أو أعتدي على واحد لي معه خلاف	٣	٩ر٠٩

■ المخدر وحل المشاكل :

ويؤيد الادمنين عن تأثير المخدر على فهم المشاكل كانت إجاباتهم (٦٦ر٦٧) يساعد المخدر على المبرور من المشكلة واغفالها دون حلها بينما قرر (٣٣ر٣٣) منهم أن المخدر يساعد على حل المشاكل.

وبالنظر إلى الجدول السابق والمخاصة بالاعتماد على التوزيع أرقام (٩٩، ١٠٠، ١٠١) نلاحظ أن نسبة كبيرة قد قررت على التفكير بتغيير نتيجة لتعاطي المخدر (٦٢ر٥) وأن هذا التغيير يختلف حسب طبيعة الشخص وتكوينه، وأن طبيعة آثار المخدر على المدمن لا يعتمد على التأثير الفارماكولوجي للمخدر بقدر اعتماده على معتقدات الفرد وما يتوقعه من المخدر، فقد بينت (٣٥ر٤٢) أن قدرتهم على التفكير تكوين أفضل في حالة التخدير بينما قرر (٢٢ر٩٢) أن المخدر يجعلهم يفقدون وعيهم، وهذا يتوقف على طبيعة شخصية المدمن. وعن وجود أفكار ملحة قررت نسبة (٦٨ر٧٥) وجود هذه الأفكار التي يتركز معظمهم حول الخوف من عدم الحصول على المخدر (٥١ر٥٢). فالفكرة الملحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتكوين الكلي للشخصية، وتكون شخصية المدمن يعتمد اعتماداً كلياً على المخدر، فجميع أفكاره ترتبط بالمخدر وما يجلبه له من آثار.

فقد قررت أيضاً نسبة (٦٦ر٣٢) إن المخدر يساعدهم على الهروب من مشاكلهم وقد يكون هذا الأثر في حد ذاته دافعاً للتعاطي لكي يتناسى المدمن مشاكله، ودافعاً للانتظام في التعاطي نظراً لوجوه المشكلة وعدم حلها.

■ أثر المخدر على الذاكرة :

ويوضح الجدول التالي رقم (١٠٢) أثر المخدر على الذاكرة كما قررها أفراد البحث من حيث التذكر والنسيان في حالة التخدير وبدونها:

جدول رقم (١٠٢)

الحالة		المخدر		بدونه	
		ك	%	ك	%
أفتكر كل حاجة (قوي الذاكرة)		٣٦	٧٥	٣٦	٤١,٦٧
أنسى (ضعيف الذاكرة)		١٢	٢٥	١٢	٥٨,٣٣

ومن الجدول السابق يتضح أن نسبة (٥٨,٣٣) قد قرروا أنهم ينسون بسرعة فى حالة عدم تعاطى المخدر، بينما قرر (٧٥٪) أنهم يكونون أقوياء الذاكرة فى حالة التخدير، وقد يرجع هذا إلى أن المدمن فى حالة عدم وجود المخدر يكون تفكيره منصباً على الحصول عليه وتعاطيه ولا يهتم سوى بالمخدر، بينما تختلف حالته فى حالة عدم وجود المخدر، فالفرق هنا راجع إلى الاهتمامات الفكرية (الحاجة العقلية) فى كل من حالتى التخدير وعدمه.

(و) أثر المخدر على بعض النواحي السلوكية :

■ أثر المخدر على المزاج :

وعن إحساس المدمن بالانسياس أو عدمه فى حالتى وجود المخدر وغيابه كانت إجابات المفحوصين كما يوضحها الجدول التالى:

جدول رقم (١٠٣) يبين أثر المخدر وعدمه على مزاج المدمنين

الاحساس		المخدر		بدونه	
		ك	%	ك	%
مفرش		٤٣	٨٩,٥٨	١	٢,٠٨
مهموم		١	٢,٠٨	٣٩	٨١,٢٥
عادي		٤	٨,٣٣	٨	١٦,٦٧

■ طريقة التصرف :

وعن أسلوب التعامل والتصرف من حيث التردد أو التسرع فى التصرفات وهم تحت تأثير المخدر وبدونه كانت إجاباتهم كما يوضحها الجدول رقم (١٠٤):

جدول رقم (١٠٤) يبين طريقة المدمنين فى حالتى التخدير وعدمه .

أسلوب التعامل		المخدر		بدونه	
		ك	%	ك	%
متروك متسرع عادي	متروك	٢٥	٥٢ر٨٨	٢٠	٤١ر٦٧
	متسرع	٣	٦ر٢٥	١٠	٢٠ر٨٣
	عادي	٢٠	٤١ر٦٧	١٣	٤٧ر٠٨

وعن أسلوب التعامل من حيث فرض الرأي أو عدمه فى حالتى التخدير وعدمه كانت إجاباتهم كما يوضحها الجدول التالى رقم (١٠٥):

جدول رقم (١٠٥)

يوضح أسلوب التعامل فى حالتى التخدير وعدمه

أسلوب التعامل		المخدر		بدونه	
		ك	%	ك	%
يتمسك بالرأي يتنازل عن رأيه بسهولة	يتمسك بالرأي	١٣	٢٧ر٠٨	١٥	٣١ر٢٥
	يتنازل عن رأيه بسهولة	٣٥	٧٢ر٩٢	٣٣	٦٨ر٧٥

■ الحالة الانفعالية للمدمنين فى حالتى التخدير وعدمه :

وبين الجدول التالى رقم (١٠٦) الحالة المزاجية للمدمنين وهم تحت تأثير المخدر وبدونه:

جدول رقم (١٠٦)

الحالة		المخدر		بدونه	
		ك	%	ك	%
هادي	٦	١٢ر٥	٤١	٨٥ر٤٢	
متوتر	٣٥	٧٢ر٩٢	٢	٤ر١٧	
عادي	٧	١٤ر٥٨	٥	١٠ر٤٢	

وكانت إجاباتهم عن قدرة المدمن على أرجاء ومتطلباته إلى وقت لا حق لعدم تناسبها مع الوقت الحالي دون أن يصيبه ضيق من هذا الأرجاء وذلك في حالتى التخدير وعدمه كما يبينها الجدول التالى رقم (١٠٧):

جدول رقم (١٠٧) يوضح قدرة المدمنين

على أرجاء متطلباتهم وذلك في حالتى التخدير وعدمه

الحالة		المخدر		بدونه	
		ك	%	ك	%
يمكن أأجلها من غير ضيق	١٨	٣٧ر٥	١٣	٢٧ر٠٨	
لا يمكننى تأجيلها (هكون متضايق)	٣٠	٦٢ر٥	٣٥	٧٢ر٩٢	

وبالنظر للجداول السابقة أرقام (١٠٦، ١٠٣) نجد أن معظم الحالات قد قررت أنهم يشعرون بالهموم والكدر فى حالة غياب المخدر (٨١ر٣٩) ذلك لأن المخدر يخدر شعورهم بالعجز ويجلب لهم السعادة الوقتية بنسيان المشاكل أو الهروب منها، كما قرر (٨٩ر٥٨) أنهم يكونون فى حالة سعادة وفرشة، وهم تحت تأثير المخدر ذلك أن المخدر يمنحهم قوة إقتدار يشعرون بالتفوق على عجزهم وواقعهم.

وعن أسلوب التردد فى التصرفات أو التسرع أجاب نسبة من العينة

(٤١٦٧) أنهم يترددون فى تصرفاتهم بدون مخدر، ونسبة (٥٢ر٠٨) أنهم يترددون أيضاً فى حالة وجود المخدر وهذا يوضح لنا ما تتسم به شخصية المدمن من عجز على مواجهة الواقع والتردد فى التصرفات والخوف والتشكك فيما حوله والافتقار إلى انبذاة.

ويوضح جدول رقم (١٠٦) أن نسبة كبيرة منهم (٧٢ر٩٢٪) يشعرون بالتوتر فى حالة عدم وجود المخدر، ويوضح هذا أن المدمن أصبح متعمداً على المخدر فى تغيير حالته السلوكية والانفعالية التى لا يملك هو القدرة على تغييرها.

وأوضح جدول رقم (١٠٧) أن مجموعة كبيرة من المدمنين لا يستطيعون تأجيل رغباتهم الملحة لوقت آخر وهم فى حالة التخدير (٦٢ر٥) ونسبة (٧٢ر٩٢) أيضاً لا يستطيعون تأجيل نفس الرغبات فى حالة عدم وجود المخدر، وهذا يعكس ما تتسم به (أنا) المدمن من عدم قدرة على تحمل الواقع، وكذلك مدى قصور شخصيته وعجزها الذى يجعله غير قادر على تأجيل رغباته الملحة إلى وقت آجل لعدم تناسبها مع الوقت الحالى، ومن خلال هذا نستطيع أن نحدد بعض السمات فى شخصية المدمن، فهى شخصية سلبية، إنكالية، منصاعة للجماعة، تفتقد للمبادأة ومواجهة الواقع، عاجزة عن تأجيل رغباته أو التوفيق بينها وبين الواقع، غير قادرة على التكيف مع الواقع ومشكلاته، مترددة منسحبة من الواقع الذى تعيش فيه.

■ أثر المخدر على الناحية الانتاجية :

ويسؤال المدمنين عن قدرتهم على العمل وهم فى حالتى التخدير وعدمه كانت إجاباتهم كما يوضحها الجدول التالى:

جدول رقم (١٠٨) يوضح قدرة المدمن الحالية

على أداء العمل فى حالتى التخدير وعدمه

الانتاج		المخدر		بدونه	
		ك	%	ك	%
قليل	٩	١٨٠٧٥	٣٣	٦٨٠٧٥	
كثير	٣٤	٧٠٠٨٣	٤	٨٠٣٣	
عادي	٥	١٠٠٤٢	١١	٢٢٠٩٢	

ويوضح الجدول السابق قدرة المدمن على العمل فى حالة التخدير ومن غير التخدير، وقد أوضح (٧٠٠٨٣) منهم أن إنتاجهم يكون وثيراً فى حالة تعاطى المخدر، وفى حقيقة الأمر أن إنتاجهم هذا الذى يصفونه بالكثرة فى حالة تعاطى المخدر يقل كثيراً عن إنتاج الشخص العادي الذى لا يتناول المخدر أبداً ولكن المقارنة هنا هى مقارنة بين القدرة على العمل من عدمه، وأن ما يقرره المدمنون من قلة إنتاج أو أن إنتاجهم عادي هو الحقيقة إشارة إلى عدم القدرة المطلقة على العمل.

وكذلك بينت النتائج أن معظم المدمنين يفضلون الوحدة فى حالة عدم وجود المخدر (٧٢٠٩٢)، بينما يفضلون أن يكونوا مع الناس فى حالة تعاطيهم المخدر وذلك كما قرر (٨٢٠٥) من أفراد البحث.

وقد أوضح معظم أفراد البحث أنهم لا يتصرفون فى المواقف الضاغطة حسب ما يملية الموقف، ولكن وفق الحالة التخديرية لهم، إذ قرر (٨٢٠٩) منهم أنهم إذا اعتدي عليهم أحد أو سبب لهم ضيقاً وهم فى حالة عدم وجود المخدر، إعتدوا عليه بالضرب وإنهالوا عليه سباً، بينما قرروا أنهم فى حالة تعاطيهم المخدر يتركون هذا الشخص وشأنه بقولهم (أنا بكون متكيف ومش عاوز حاجة تأريفتنى، وأنسى كل المشاكل علشان أتمتع

بالمخدر) وذلك كما قرر (٩١ر٩) من أفراد البحث. ويوضح هذا حرص المدمن على التمتع بحالة التخدير، وما تجلبه له من نشوة ولذة، ويتعامل من خلال هذه الحالة بما يتلاءم وحفاظه عليها وإبقاها لأكبر فترة ممكنة.

وكذلك قرر (٨٩ر٥٨) من أفراد البحث أنه لا تحدث بينهم خلافات ومناقشات وبين أي فرد في حالة تعاطيهم المخدر، وبينما قرر (٩١ر٥) من أفراد العينة إنه تحدث بينهم وبين الآخر مشاكل وخلافات سواء في المنزل أو الأصدقاء أو العمل في حالة عدم تعاطي المخدر.

أثر المخدر على النوم :

قرر (٩٢ر٣) من المدمنين أن نومهم يكون متقطعاً وتخلله فترات أرق طويلة ومتكررة، وقد يضل الأرق إلى حد التواصل طوال الليل في حالة عدم وجود المخدر، بينما قرر جميعهم أنهم ينامون دون أي تقطع طوال فترة النوم في حالة تعاطي المخدر.

أثر المخدر على الشهية للطعام :

ويوضح الجدول التالي رقم (١٠٩) أثر المخدر على الشهية للطعام كما قررها أفراد البحث.

جدول رقم (١٠٩) يوضح أثر المخدر على شهية

المدمن للطعام في حالة التخدير وعدم التخدير

الحالة		المخدر		بدونه	
ك	%	ك	%	ك	%
٤٠	٨٣ر٣٣	٦	١٢ر٥	٨	٨٧ر٥
٨	١٦ر٦٧	٤٢			

وبين الجدول أن (٨٣ر٣٣) من أفراد العينة يأكلون بشهية في حالة تعاطيهم للمخدر، وأن نسبة (٨٧ر٥) تنعدم شهيتهم للطعام في حالة

غياب المخدر، وهذا يؤكد ما سبق أن وجدته الباحثة من نتائج من أن المدمن لا يهتم بأي سلوك - يربى تناوله المخدر - قط - يعمل كل شيء - في سبيل الحصول عليه حتى وإن كانت صحته، وإذا يعاني معظم المدمنين من الهزال والشحوب والتضعف العام والنفافة.

أثر المخدر على الميل لارتكاب الجرائم :

قرر (٦٦٦٧٪) من أفراد العينة إن مدمن المخدرات أكثر ميلاً لارتكاب الجرائم دون غيره من غير المدمنين، وقد حدد المدمنين الجرائم التي يرتكبها المدمن كما يوضحها الجدول التالي رقم (١١٠):

جدول رقم (١١٠) يوضح نوع الجرائم التي يقوم المدمن بارتكابها

نوع الجريمة	ك	٪
سرقة	٤٣	٩٣٫٧٥
إغتصاب	٢٠	٦٢٫٥
نصب	٤٠	٨٣٫٣٣
قتل	٣٥	٧٢٫٥
ضرب	٣٥	٧٢٫٥

وكان المدمنون يجيبون بأن هناك أكثر من جريمة من الممكن للمدمن أن يرتكبها، وتزداد حدة هذا الارتكاب في حالة عدم وجود المخدر، إذ أن المدمن - تحت وطأة أعراض منع المخدر، وما يشعر به من هم وكدر نتيجة لعدم قدرته على الحصول على جرعته من المخدر - قد يضرب أمه وأفراد أسرته، أو يبيع الأثاث في منزله، وقد يسرق صاحب العمل، أو يأخذ رشوة أو ينصب على أحد معارفه وأصدقائه.

فارتكاب الجرائم عند المدمن هي حالة ضاغطة، تفرضها الرغبة في الحصول على المخدر، أما جرائم الإغتصاب فإن ما يثيره المخدر من نشاط جنسى ورغبة جنسية بالإضافة إلى ما يعتقده الشخص وما يتوقعه من

المخدر فى زيادة نشاطه الجنسى وإيقاظ غرائزه يزيد من رغبته الجنسية ويدفعه دائماً للتفكير فى إشباع هذه الرغبة بأي طريقة.

الإدمان وأثره على السلوك الجنسى :

أجاب (٨٢ر٥) من أفراد المجموعة أن لهم علاقات جنسية مع الجنس الآخر، بينما أجاب (١٧ر٥٪) من أفراد العينة أنه لم يمارس أي علاقات جنسية طوال حياته، وقد يرجع هذا إلى حداثة سن هذه المجموعة، أو لعدم إتاحة الفرصة لديها فقد قال معظمهم أنهم لم يتعرفوا على إناث يرغبن فى إقامة مثل هذا النوع من العلاقات ولكن (١٥ر٥٪) منهم يقومون بممارسة العادة السرية.

وكانت النتائج تدل على أن (٥٤ر٥٪) من أفراد العينة متزوجون ولهم علاقات جنسية مع نساء أخريات ممن يزاولن البغاء. وأن النسبة الباقية منهم كانت علاقاته الجنسية مقصورة على زوجته.

وعن أداء المجموعة للعملية الجنسية فى حالة التخدير وعدمه كانت إجاباتهم كما يوضحها الجدول التالى رقم (١١١):

جدول رقم (١١١) يوضح أداء المجموعة التجريبية

للعلمية الجنسية فى حالة التخدير وعدمه

الأداء		المخدر		بدونه	
		ك	٪	ك	٪
أفضل غير ذلك	٢٩	٨٢ر٨٦	٥	١٤ر٢٩	٨٥ر٧١
	٦	١٧ر١٤	٣٠		

وقد قرر (٧٢ر٩٢٪) من أفراد العينة أنهم يقضون وقتاً أطول من العادي فى أداء العملية الجنسية وهم تحت تأثير المخدر، وقد قرر (٨٣ر٢٠٪)

منهم أن المخدر يسبب لهم سرعة فى القذف مما يؤدي إلى قصر المدة عن الحال وهم يدون المخدر.

ويسؤال المدمنين عما إذا كان باستطاعتهم تحديد الوقت الذي يقضونه فى العملية الجنسية وهم تحت تأثير المخدر ويدون المخدر، فكانت إجاباتهم أنهم يشعرون أنهم يمضون ساعات طويلة فى حالة وجود المخدر ولم يستطيعوا تحديد الوقت ولا بالتقريب فى حالة التعاطى، أما فى حالة عدم تعاطى المخدر فقد كان قولهم أن العملية لا تستغرق ثوانى معدودة. ويوضح ذلك ما سبق من نتائج خاصة بالآثار الإدراكية، فالإدمان يفسد الإدراك عند المدمن، كما أن العملية الجنسية تنطوي على مشاعر تتراوح فى اللذة والسعادة والنشوة والمدمن يرغب دائماً أن يظل فى هذه الإحساسات لا يخرج منها قط، فيشعر كأن الوقت يمر ساعات أثناء هذه العملية.

ويسؤال المدمنين عن أثر المخدر على الأداء الجنسي كانت إجاباتهم كما يوضحها الجدول التالى رقم (١١٢):

جدول رقم (١١٢) يوضح أثر المخدر على العملية الجنسية

الأثر	ك	%
زيادة النشاط والمتعة	١٥	٣١٫٢٥
يعطى قوة جنسية	٦	١٢٫٥
ملاطفة الست والتجاوب معها	١٠	٢٠٫٨٣
يطيل مدة الإتصال	٢٠	٤١٫٦٧
يسبب سرعة القذف	٥	١٠٫٤٢
كراهية العملية الجنسية	١٠	٢٠٫٨٣
يسبب الضعف الجنسي	٥	١٠٫٤٢

ويوضح الجدول السابق الآثار التى حددها المدمنون وقد كان الفرد الواحد يجيب بأكثر من أثر، ولكن هناك تناقض فى إدلاء المدمنين لهذه

الآثار بالنسبة للفرد الواحد، فيقول أن المخدر يعطيه قوة جنسية وأيضاً سرعة قذف وضعف جنسى فى وقت واحد.

وقد أجاب (٧٩٪) أن أداءهم للعملية الجنسية يختلف وهو فى حالة التخدير عن حالته العادية (بدون مخدر)، وقد قرروا أن مظاهر الاختلاف كانت كما يوضحها الجدول التالى رقم (١١٣):

جدول رقم (١١٣) يوضح مظاهر الاختلاف

فى العملية الجنسية فى حالة التخدير وبدونه

المظهر	ك	٪
قوة فى الأداء	١٤	٢٩ر١٧
زيادة فى المتعة	١٣	٢٧ر٠٨
تجاوب مع الست	٤	٨ر٣٣
طول فى المدة	١٥	٣١ر٢٢
يخفى الحياء	٣	٦ر٢٥
عدم وعى	٦	١٢ر٥
برود وسرعة قذف	٤	٨ر٣٤
ملاطفة الأنثى ومداعبتها	٥	١٠ر٤٢

وقد أجاب (٨٩٪) منهم أنه يوجد تجاوب من السيدة التى يمارس معها العملية فى حالة تعاطيه للمخدر، ويقل هذا التجاوب فى حالة عدم التعاطى. وأجاب (٩١٪) أنهم يشعرون برغبة أكثر فى الإتصال الجنسى فى حالة تعاطيه المخدر، بينما تقل هذه الرغبة فى حالة عدم تعاطى المخدر.

كذلك أجاب (٧٧ر٠٨٪) أن إدمان المخدرات يؤدي إلى حدوث الضعف الجنسى، بينما أجاب (٢٢ر٩٢٪) أنه لا يؤدي لذلك بل يسبب قوة جنسية.

ومن النتائج السابقة الخاصة بأثار الإدمان على الناحية الجنسية والموضحة في الجدول من رقم (١١١) إلى رقم (١١٣) يتضح لنا أن أقوال المدمنين فيما يتعلق بأن تعاطى المخدر يسبب إطالة مدة الجماع والشعور بلذتها، إنما هي محاولة من قبل المدمنين لتغطية واقعهم النفسى الأليم بما فيه من قلق وإنقباض، ولما كانت فترة الإتصال الجنسي من الفترات التى تسبب له السعادة والشعور باللذة وتخدير مشاعر القلق والاكتئاب والعجز فإنه يسعى لإطالتها بأي وسيلة حتى يخفف بها ما يعانيه من مشاعر ضاغطة.

وفيما يتعلق بأثر المخدر على العملية الجنسية فقد أجابوا من ضمن الآثار أن السيدة تشعر بتجاوب ولذة وملاطفة أكثر عندما يكون هو تحت تأثير المخدر، وهذه الإجابة تعتبر نوعاً من التبرير الذي يلجأ إليه الفرد لتغطية سلوكه بغطاء منطقي ومحاولة منه للدفاع عن نفسه، فيعزي السبب فى تناول المخدر إلى رغبة السيدة التى معه لا إلى رغبته هو فيكون الدافع للتعاظم هو المرأة وليس هو ولو كان هذا صحيحاً لكان الإدمان منتشرأ بين كل المتزوجين من كل الطبقات والأعمار ك رغبة منهم فى التوافق الجنسي والوصول إلى مرتبة عليا من النشوة، ولكن الواقع لا يؤيد ذلك لأن الإدمان منتشر بين المتزوجين وغير المتزوجين من طبقات معينة، وسمات معينة لهؤلاء المدمنين.

■ مشكلات المدمنين :

أجاب (٨٢٫٥٪) من أفراد عينة البحث أنهم يعانون من المشكلات التى لم يستطيعوا تحديد سبب لها، بل أكد معظمهم أنهم وجدوا أنفسهم غارقين فى هذه المشكلات بدون أي إرادة منهم وكأنهم ولدوا بها.

وعن المشكلات التى تدفع الناس إلى تعاطى المخدرات كانت كالاتى كما قررها أفراد عينة البحث: الأمراض، مشكلات مع الأهل، نسيان

الهموم، الجنس، الفقر، أصدقاء السوء، مشكلات فى العمل، البيئة المحيطة، إدارة النقص، التقليد.

علاقة المدمن بأسرته :

■ العلاقة بالوالد :

أجاب (١٥٪) من أفراد العينة أنهم لم يروا آباءهم وذلك لوفاة الأب منذ صغرهم. بينما أجاب (٣٥٫٤٪) أن والدهم منفصل عن والدتهم ومتزوج بغيرها وليس لهم أية علاقة بالدهم. وأجاب الباقيون بأنه لا يوجد أي تفاعل عاطفى بينهم وبين والدهم، فيما عدا (٨٪) من أفراد البحث أجابوا بأن علاقاتهم بالدهم يشوبها كل حب وأظهروا ذلك الحب بقولهم (ده أبريا هو اللي بيخيب لى المخدرات) فأصبح موضوع الحب والإهتمام لديهم هو المخدر.

■ العلاقة بالوالدة :

أجاب (١٧٪) منهم أنهم لم يروا والدتهم ولم يتعاملوا معها، بينما أجاب (٢٩٪) أن والدتهم منفصلة عن الوالد ولا يراها لزواجها من غير أبيه، وقد أوضح الكثيرون ضيقهم بسبب زواج أمهم من آخر وعبروا عن ضيقهم هذا برغبتهم فى التخلص منها. بينما أجاب ٥٠٪ منهم أن علاقاتهم بالدهم عادية جداً.

طريقة معالجة المدمن للمشاكل التى تقابله :

وقد قرر أفراد العينة إجابات مختلفة فيما يتعلق بمعاملاتهم للمشكلات التى تصادفهم وذلك بقولهم: (أنا ماليش دعوة بالمشاكل، أحاول أنساها وأن آخذ مخدر يبعدنى عنها، أنا مش بستحمل المشاكل، أفكر وأحاول أحلها، أخلى واحد كبير يحلها لى، لو السبب فى المشكلة أبنى هضربه ولا حتى أموته، ولو شخص كبير زي والدي هأخذه على أد عقله).

ويتضح من الإجابات السابقة الخاصة بالتعامل مع المشكلات، ما يتميز به المدمن من إنسحابية وتعامل سلبي مع الواقع الذي يعيش فيه، وعدم قدرة على تحمل المشاكل والمتاعب والظروف الضاغطة، وإستخدام المخدر كوسيلة تكيفية بدلاً من إقتحام الواقع ومحاولة التكيف معه والشعور بالدونية والعجز وعدم القدرة على مواجهة الواقع بما فيه من متاعب فيلجأ إلى المخدر كوسيلة دفاعية.

وقد قرر (٧٥٪) من أفراد العينة أن والدهم أو أحد أقاربهم يتناولون المخدرات المختلفة.

سمات شخصية المدمن كما توضحها نتائج المقابلة :

■ الاتقياد والانصياع لأوامر الجماعة.

■ السلبية فى التعامل مع الواقع.

■ الاتكالية.

■ الجمود.

■ عدم القدرة على تحمل الآلام والمتاعب والظروف الضاغطة.

■ عدم القدرة على إرجاء رغباته وغرائزه ومطالبه.

■ وجودهم فى بيئات تتميز بالانحطاط الإجتماعى، والتفكك الأسري، وانتشار العادات السلوكية الشاذة.

■ تشوش الإدراك وفساد بعض العمليات العقلية كالذكر والإحساس البصري، السمعى، والذوقى... إلخ.

■ إضطراب التفكير وجموده، وإنحطاطه.

■ إضطرابات الذاكرة.

■ التردد فى التصرفات والخوف والتشكك والافتقار إلى المبادرة.

■ التوتر وعدم القدرة على التوفيق بين رغباته وواقعه.

- الإنسحاب من الواقع والهروب.
- ضعف قدرته على العمل وإنعدامها فى بعض الأحيان.
- الأرق والهزال وفقد الشهية للطعام.
- الميل إلى ارتكاب الجرائم.
- الاضطراب الجنسى.
- التفكك الأسري وإنعدام القيم فى بيئته الأسرية، وخروجهم من بيئات تتميز بالفقر، وإمتهان مهن لا تحتاج إلى مهارة فنية.
- الشعور بالعجز والنقص والدونية واستخدام الحيل الدفاعية لمدارة ما يقوم به من سلوك شاذ.
- عدم القدرة على إقامة علاقات إجتماعية سليمة.
- عدم القدرة على التعامل بإيجابية مع من حوله.

الفصل السادس

تفسير النتائج

■ تفسير نتائج الفروض:

- تفسير النتائج الخاصة بالفرض الأول.
- تفسير النتائج الخاصة بالفرض الثاني.

■ أثر الإدمان على السلوك:

- أثر الإدمان على بعض مظاهر السلوك العقلي.
- أثر الإدمان على إنتاجية المدمن.
- أثر الإدمان على السلوك الجنسي.
- أثر الإدمان على السلوك الإجرامي.
- أثر الإدمان على بعض أوجه السلوك الانفعالي.
- خاتمة البحث.
- ملخص البحث.

تعرضت الباحثة فى هذا الفصل لتفسير النتائج التى توصل إليها البحث فى ضوء الفروض الخاصة بالبحث، ثم يلى ذلك وصف لأنوار الإدمان على بعض النواحي السلوكية كما أظهرها البحث الحالى والبحوث السابقة، ثم خاتمة البحث متضمنة سمات شخصية المدمن فى هذا البحث، وما يسفر عنه البحث من البحوث مستقبلية وأخيراً ملخص البحث.

أولاً - تفسير النتائج على ضوء الفروض :

(أ) بالنسبة للفرض الأول والقائل بأن انخفاض بعض القدرات العقلية أكثر شيوعاً لدى مدمنى المخدرات عن غير المدمنين، فقد تبين من النتائج أن المدمنين فى هذا البحث يعانون من ضعف الذكاء وكان متوسط درجات ذكائهم (٨٦ر٨١) بانحراف معياري قدره (١٦ر٠٩) (جدول رقم ٤٠). ويدل هذا المتوسط على مستوي ذكاء منخفض وأدنى من المتوسط وذلك كما يوضحه مبيان المعايير الخاصة بالاختيار المستخدم فى الدراسة. وقد يرجع هذا الانخفاض فى الذكاء إلى عوامل أخرى غير الإدمان منها إنتماء عينة المدمنين إلى بيئات اجتماعية دنيا، وامتنانهم لوظائف لا تحتاج إلى مستوي عال من الذكاء، وكذلك معاناة كل أفراد العينة من الأمية، وكان متوسط العمر الزمني لأفراد العينة المدمنة (٤١ سنة) أي أن نسبة الذكاء لديهم بدأت فى التدهور نتيجة لتقدمهم فى العمر، ولذا كانت لمقارنة المجموعة المدمنة بمجموعة أخرى غير مدمنة توازيها من حيث الجنس والسن والمستوي الاجتماعى والاقتصادي أثره فى توضيح صحة هذه النتائج، وقد أبدت نتائج المقارنة صحة هذا الفرض أيضاً، حيث كان متوسط نسبة ذكاء المجموعة الضابطة وهى مجموعة غير مدمنة على المخدرات (٨٧ر١٠٤) بانحراف معياري قدره (٩ر٥٥) درجة، وقد أوضحت نتائج التحليل الاحصائى وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوي

ثقة ١٠٠، بين نسبة ذكاء المجموعة التجريبية والضابطة، لصالح المجموعة الضابطة. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات مثل فوجل ومارينيس واندرويدج حيث أكدوا في بحوثهم أن الإدمان يسبب تدهوراً في كفاءة الوظائف العقلية، وأيضاً تتفق معهم النتائج التي ذهب إليها كوبرا وكوبرا Copera & Copera في دراستهما لمجموعة من مدمني الحشيش في الهند، حيث وجدوا أن الغالبية من مدمني المخدرات يتصفون بالغباء والضعف العقلي. وكذلك دراسة روزنبرج Rozenberg وايفنسون Evenson حيث أكدوا أن مدمني المخدرات ينتمون إلى فئات ذكاء القومى للبحوث الاجتماعية والجناائية، ودراسة سعد المغربي عن سيكولوجية تعاطي المخدرات إلا أن الباحثة ترى إنه ليس من المستطاع تعميم هذه النتيجة على كل مدمني المخدرات، وذلك لعدة أسباب منها:

١ - أن نسبة ذكاء مدمني المخدرات كانت مجهولة للباحثة قبل بداية الإدمان.

٢ - إنتماء معظم المدمنين في عينة بحثها إلى فئات اجتماعية دنيا، وكذلك إلى فئات تعليمية دنيا إذ كانت كل العينة تعاني من الأمية، وقد أثبتت الكثير من الدراسات عن وجود علاقة كبيرة بين الذكاء والتحصيل.

٣ - بالرغم من نتائج الدراسات التي تؤكد أن مدمني المخدرات ينتمون إلى فئات ذكاء دنيا إلا أنه لا توجد بحوث تناولت العلاقة بين الإدمان والذكاء وذلك من حيث العلاقة بين نسبة ذكاء أشخاص آخرين لديهم استعداد للإدمان.

٤ - لا توجد دراسات تناولت العلاقة بين الذكاء والإدمان من حيث ما تسببه الإدمان من تلف في الجهاز العصبي المركزي ونسب ذكاء أشخاص آخرين لديهم استعداد للإدمان.

٥ - هناك الكثير من الدراسات التي أكدت على انتشار إدمان

المختبرات بين إناس يتعمّن إلى فئات ذكاء عليها ومنها طلاب الجامعة، والأطباء، والذين يعملون في المهن العليا ولذلك لا تستطيع الباحثة تعميم حجة فرضها في أن الإدمان مرتبط بضعف الذكاء، ولكن تستطيع أن تقصر هذه النتيجة على المدمنين في مدينة الإسكندرية والتي تشملهم عينة البحث الحالي.

(ب) بالنسبة لسمة القدرة على التفكير الابتكاري :

نتائج الأصالة :

وكانت نتائج اختبار الأصالة كأحد الاختبارات التي تقيس القدرة على التفكير الابتكاري، قد أوضحت النتائج أن المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية على اختبار الأصالة الذي يقيس هذه القدرة (٥٩٦) مقابل (١٢١٣) للمجموعة الضابطة جدول رقم (٤٩) ويعمل التحليلات الاحصائية لهذه النتائج أوضحت نتائج تحليل التباين وقيمة «ت» وجود فروق ذات دلالة احصائية بين المجموعتين عند مستوي دلالة ٠.١ (جداول ٥١٥) ولم تجد الباحثة أية دراسات قد تناولت هذه القدرة في علاقتها بالإدمان، ولكن أشارت معظم الدراسات إلى أن الإدمان يفسد الوظائف العقلية عامة، وإصابة المدمنين بتدهور عقلي. ولما كان الابتكار أو القدرة على التفاعل السوي مع البيئة والوثام مع النفس. ومن سمات الشخص الذي يتميز بالقدرة الابتكارية عموماً أنه يستطيع أن يحيا متعاوناً على أساس المساهمة المتبادلة مع الآخرين، ويجد في ذلك إرضاء لحاجاته العديدة وتحقيقاً لتطلعاته والابتكار هو أسمى ما يسعى إليه الفرد من أهداف. فقد وجدت الباحثة من نتائج تطبيقها لاستمارة المقابلة ومقاييس الشخصية، انعدام سمات الشخص المبتكر وعدم توافرها لدى المدمن فالمدمن منسحب من الواقع الذي يعيش فيه غير قادر على التعاون مع الآخرين ولا يساهم معهم في شيء منصرف عنهم إلى دنياه التي خلقها له المخدر وكل ما يطمع المدمن في تحقيقه هو

الوصول إلى المخدر والحفاظ على استمراره بأية وسيلة. وهو يتفاعل مع بيئته تفاعلاً شاداً من خلال المخدر فهو لا يعمل وينتج إلا في حالة تعاطيه للمخدر. وتري الباحثة أن هذا الانخفاض في القدرة الابتكارية قد يكون سمة مميزة لهم قبل إدمانهم المخدرات، حيث أنهم ينتمون إلى بيئات عاجزة عن تحقيق رغباتهم، كما أنهم يعانون من الأمية حيث أثبتت الدراسات وجود علاقة بين الابتكار والتحصيل، ونتيجة لما يعانونه من اضطرابات في شخصياتهم، مثل انخفاض مستوى الطموح وانعدام الهدف في الحياة، إلى جانب أن الإدمان يؤدي إلى ضعف الوظائف العقلية، وخلل في أداء الجهاز العصبي المركزي.

(ج) نتائج المرونة التلقائية :

وقد أوضحت النتائج أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية على اختبار الاستعمالات الذي يقيس المرونة التلقائية (٧ر٦٥) مقابل (١٤ر٠٨) للمجموعة الضابطة جدول رقم (٤٦) والتي تماثل المجموعة التجريبية من حيث السن والجنس والمستوي الاجتماعي الاقتصادي، وقد أوضحت نتائج التحليلات الاحصائية وجود فروق جهرية ذات دلالة احصائية بين المجموعتين في هذه القدرة عند مستوى دلالة ٠.١.

(د) نتائج الطلاقة الفكرية :

فقد أوضحت النتائج أن المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية على اختبار الطلاقة الفكرية كانت (٢٠ر٢٥) مقابل (٣٥ر٨٨) للمجموعة الضابطة (جدول رقم ٤٣) وقد أوضحت نتائج التحليلات الاحصائية (جدول رقم ٤٤، ٤٥) وجود فروق جهرية ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة ٠.١ بين المجموعتين. وبذلك تشير النتائج إلى وجود فروق في القدرة على التفكير الابتكاري بين المدمنين على المخدرات وغيرهم من غير المدمنين، نتيجة لما يسببه لهم الإدمان من اضطرابات وظيفية تسبب خللاً في وظائف المخ، وما في شخصياتهم من اضطرابات

تحول بينهم وبين التكيف والتفاعل السوي مع البيئة المحيطة بهم، وما ينتمون إليه من بيئات تساعد على ظهور هذه الاضطرابات النفسية الكامنة، لما تحويه من عجز وفقير حرمان وصور الانحرافات السلوكية المختلفة.

وفيما يتعلق بالفرض الثانى والقائل بأن هناك علاقة طردية بين إنخفاض المستوى الاجتماعي الاقتصادي وإدمان المخدرات، فقد أوضحت الدراسة من خلال نتائج المقابلة ونتائج تطبيق الاستمارة التى تقيس هذا المستوى ما يأتى:

- ١ - معاناة معظم مدمنى البحث من الأمية.
 - ٢ - معظمهم يمارسون مهن يدوية بسيطة ودنيا.
 - ٣ - إنخفاض الدخل الشهري.
 - ٤ - ارتفاع معدل التزاحم لديهم.
 - ٥ - ولدوا لآباء وأمهات يعانون من الأمية.
 - ٦ - ينتمى أبائهم إلى مهن يدوية دنيا.
 - ٧ - يسكنون فى أحياء تتسم بالفقراء والازدراء.
 - ٨ - يتزوجون من زوجات تعانين من الأمية وانخفاض المستوى الاجتماعي.
 - ٩ - لا يهتمون بتعليم أولادهم ولا توجيههم للمهن العليا.
 - ١٠ - يزداد بينهم تعدد الزوجات والطلاق والهجر لمسكن الزوجية.
 - ١١ - ينتمون إلى أسر يزداد فيها التفكك والانفصال.
- وقد أوضح هندن Henden فى دراسته أن للفقر أثراً على حدوث الإدمان ، ويرى أن الإدمان ما هو إلا عملية تكيفية مع الواقع الاجتماعي الاقتصادي. وكذلك أشارت دراسة جيزنجر لمجموعة من مدمنى المخدرات

أنهم ينتمون إلى أسر من الطبقة العاملة التي تعاني من الفقر والحرمان وقد أوضحت دراسة سعد زغلول المغربي، ودراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناائية إنتماء مدمنى المخدرات إلى بيئات تعاني من الأمية والجهل والفقر والحرمان. وأوضح راثود Rathod فى دراسته أن نسبة كبيرة من المدمنين لهم وضع خاص فى الأسرة كأن يكون الطفل الوحيد أو المدلل، كما أن هذه الأسرة ليس لها آباء، وإن وجدوا فهم مطلقون أو سكيرون أو مرضى عقليين(١)، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك الكثير من الدراسات التى أشارت إلى الإدمان بين الطبقات الاجتماعية المختلفة وعدم اقتصاره على طبقة معينة أو دنيا، ومنها دراسة ونك Wi-nick التى أثبتت انتشار الإدمان على العقاقير بين الأطباء وقد عزا هذه النتائج إلى ما يعانيه الأطباء من آلام ناجمة عن العمل الزائد، والأرق، ومستوى الطموح، والزوجات. كما أوضح هريوت هندن فى بحثه على الطلاب الدراسات العليا المدمنين للمخدرات أن الصراعات التى يعايشها هؤلاء الطلاب إنما هى صراعات تدور حول المنافسة والنجح والفشل فى الحياة، وأن واقعهم المحيط الملئ بالصراعات والمنافسة والفشل هو الدافع لإدمانهم.

وتري الباحثة أن إدماننا للمخدرات قد بدأ أو ظهر فى الطبقات الاجتماعية الدنيا نتيجة لما تعانيه الطبقات من عجز فى الوصول إلى الهدف، وعدم قدرتها على الوصول إلى الطبقات العليا بما يملكونه من مصادر للثروة وغيرها...، فيصابون بالاحباط والاكتئاب نتيجة لفشلهم والذي يكون دافعاً وراء تسعيهم لشئ يخفف من هذه الآلام المبغضة ويكون طريقهم إلى المخدر، ولما كان الإدمان يرتبط ارتباطاً وثيقاً باضطرابات الشخصية وأن هذه الاضطرابات شائعة بين أبناء الطبقات الدنيا لما يعانونه من عجز وحرمان، فهى موجودة أيضاً فى المجتمعات المتقدمة لما تعاشيه هذه المجتمعات من صراعات تدور حول المنافسة

والفشل والنجاح والطموح تقدم تكنولوجياً يساعد على إتساع هذه الصراعات، وبازدياد التقدم يزداد الصراع والمنافسة، وذلك يؤدي بأبناء هذه الطبقة إلى رفض هذه المشاعر المؤلمة الناتجة من الصراع، ويتجهون إلى ما يحقق لهم الراحة بعد العناء وما يخفف من حدة هذه المشاعر فيلجأون للمخدر كوسيلة في ذلك.

وبذلك يرجع الإدمان إلى اضطراب كامن في شخصية الفرد وأن العوامل الاجتماعية ما هي إلا عوامل مهيئة أو مساعدة لظهور هذه الاضطرابات الكامنة على شكل سلوك شاذ، ويحدد نوع هذا السلوك المجتمع الذي يعيش فيه الفرد فيظهر تأثير البيئة في تحديد نوع الانحراف، فإذا كانت بيئة ينتشر فيها الإدمان على المخدرات إندماج فيها الفرد المحيط والذي يعاني من الاضطرابات فإدمان المخدرات يوجد في معظم المجتمعات ويختلف باختلاف المجتمع والبيئات الثقافية والحضارية من حيث خصائص المخدر ونوعه وطرق تعاطيه وأساليبه.

ثانياً؛ بالنسبة للفرض الثالث الذي يقول بأن هناك فروقاً ذات دلالة احصائية لبعض سمات الشخصية بين مدمني المخدرات وغيرهم من غير المدمنين، وقد تم قياس بعض المتغيرات هي:

(أ) بالنسبة لمتغير السيكوباتية: فقد أوضحت النتائج أن متوسط المجموعة التجريبية على مقياس السيكوباتية (٢٨ر٢١) كان يفوق متوسط المجموعة الضابطة (١٧ر٤٤) وكان هناك فرق ذو دلالة احصائية عند مستوي ٠.١ جدول رقم (٦٥، ٦٦)، وفقاً للاختبار المستخدم في الدراسة، فإن الذين يحصلون على درجات عالية في هذا الاختبار يتصفون بنقص الاستجابة الانفعالية العميقة، وعدم القدرة على الاستفادة من الخبرة، والكذب، والسرقة، وإدمان المخدرات والكحوليات، والاصطدام بالقانون والمعايير الاجتماعية والاخلاقية، ويمرون بفترات من الانتفاض وخاصة بعد وقوعهم في الازمات التي يتعرضون لها.

وإذا كان السلوك السيكوباتي يتسم بالاندفاعية واللا اجتماعية، ويعتمد على أولوية القيم القصيرة الأجل، ولا يستطيع أرجاء مطالبة العاجلة، وعدم الاستفادة من التجارب السابقة، واللامبالاة بمعايير المجتمع وقيمه وعاداته، فقد وجدت الباحثة من نتائج المقابلة أن هذه السمات هي أهم ما يميز سلوك مدمن المخدرات، فكل ما يسعى إليه هو الحصول على المخدر بأية وسيلة فالمخدر هو الموضوع الوحيد الذي يدور حوله تفكيره وسلوكه. ولما كانت شخصية المدمن العائد من الشخصيات التي تتميز بالسيكوباتية فإننا نجد توافر هذه السمة بكثرة لدى مدمني المخدرات، فالمدمن قد ينال عقاباً بالسجن أو الغرامة أو الإيداع في أحد المصحات النفسية ولكنه لا يبالي بهذا العقاب وسرعان ما يرجع للمخدر بعد إنتهاء مدة العقاب وأحياناً في أثنائها إذا توافر له الحصول على المخدر، ولا يفكر المدمن في الامتناع عن المخدر إلا إذا دفع إلى ذلك دفْعاً بأن يصاب بتدهور صحى ومالى. وهناك الكثيرون من المدمنين يرتكبون سرقات وجرائم أخرى لكى يشبعوا رغباتهم فى المخدر دون تفكير فيما سيجلبه عليهم هذا السلوك من عواقب. وبما أن السيكوباتي يلجأ إلى طرق ووسائل خارجية فى تعامله مع صراعاته وحلها، فهو يعمد إلى تغيير البيئة بما يتفق مع رغباته ودوافعه. فإن ذلك يبدو واضحاً فى سلوك المدمن للمخدرات فهو يهرب من مواجهة واقعه إلى المخدرات الذي يمنحه شعوراً بالانبساط والفرشة) ويعكس هذا الشعور رغبته فى التحرر من الواقع الاليم الذي يعيش فيه المدمن بما يتفق ورغباته الخاصة، كما أن المدمن يصب عدوانه على البيئة الخارجية ويتضح ذلك فى هروب المدمن من مسئولياته وأرتكابه لسلوك يتنافى مع قيم المجتمع وعاداته ويسبب هذا السلوك ضروراً مباشراً للمجتمع حيث ينتج عنه ضعف إنتاجية المجتمع وإنهيار القوي البشرية فيه، وخلق جيل ضعيف سيكولوجياً وأخلاقياً متمثل فى أسرته وأبنائه ومن اشخاص يتقادون له

ويقلدون سلوكه، إذ أوضحت الكثير من الدراسات أن وجود شخص مدمن واحد في مجتمع كفيل بنقل عدوي الإدمان إلى الآخرين.

وبذلك يمكن القول بأن الاعراض السيكوباتية أكثر وضوحاً وتميزاً لدى مدمنى المخدرات عن غيرهم وأن سلوك مدمن المخدرات يتسم بالسيكوباتية التي يتميز بها كعرض أساسى فى شخصيته، وقد أكد ذلك نتائج الابحاث التي تؤكد وجود السيكوباتية كسمة مميزة لسلوك مدمنى المخدرات، مثل دراسة «جن سميث» Gen Smith نايت Knight ودراسة هيكيان وجرشون Hekiman & Gershon ودراسة «إيلينود» El-linwood ودراسة إيستون Easton حيث أكدوا جميعاً أن مدمنى المخدرات تشيع بينهم الانحرافات السيكوباتية، وعادة ما يكونوا ذوي شخصية سيكوباتية.

(ب) بالنسبة لمتغير الاكتئاب: فقد أوضحت الدراسة أن المتوسط الحسابى لدرجات المدمنين على مقياس الاكتئاب من اختبار الشخصية المتعدد الوجة (٢٨ر٤٤) مقابل (٢٠ر١١) للمجموعة الضابطة وقد أوضحت النتائج الاحصائية وجود فروق جوهرية وذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة ٠.١ بين متوسطات المجموعتين.

وإذا كان الاكتئاب هو الشعور بالعجز واليأس وعدم القدرة على النظر إلى المستقبل نظرة متفائلة، ونقص فى الثقة بالنفس، وضيق فى الاهتمامات وانطواء، ونزوع إلى القلق، وكذلك ضيق يصيب النفس وكساد فى القوى الحيوية والحركية. فإن نتائج المقابلة فى البحث الحالى قد أوضحت وجود هذه السمات وانتشارها بين مدمنى المخدرات من أفراد البحث إلى جانب نتائج المقاييس السابقة من اختبار الشخصية المتعدد الوجة، فقد أوضحت النتائج أن المدمن يعانى دائماً من عجز عن مواجهة واقعة وتنتابه دائماً مشاعر القلق نتيجة لما يعانیه من عجز وعدم القدرة على العمل فى حالة غياب المخدر. وقد أرجع معظم المدمنين سبب

إدمانهم إلى ما يعانونه من مشاعر إكتئابية تزول بتناول المخدر ولكنها تعاود الظهور مرة أخرى فى حالة غياب المخدر مما يدفع المدمن إلى الاستمرار فى التعاطى لتجنب هذه المشاعر، ويعتبر الاكتئاب سمة مميزة لمدمنى المخدرات، وقد يكون هذا الاكتئاب ملازماً له قبل تعرضه لخبرة الإدمان ويكون ناتجاً عن الاستمرار فى إدمان المخدرات حيث ينتاب المدمن نوبات من اليأس والقلق نتيجة لما يقوم به من سلوك. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الكثير من البحوث والدراسات حيث أوضح سعد المغربى فى دراسته عن تعاطى الحشيش شيوع الأعراض الاكتئابية لدى مدمنى الحشيش ووصف المدمن بأنه يعاني من انخفاض الروح المعنوية مع الشعور باليأس والعجز عن النظر إلى المستقبل نظرة عادية متفائلة وذلك من واقع تطبيقه لمقياس الاكتئاب من اختبار الشخصية المتعدد الأوجه، ودراسة لتاريخ حالة بعض المدمنين والتي أوضحت خلو حياتهم من المعنى والخطوة والهدف الواضح المرسوم، واتسامهم بالتشاؤم واليأس وضعف البصيرة. وقد اتفق معه فاروق عبد السلام فى دراسته عن بعض المتغيرات النفسية لمدمنى الأفيون . وكذلك أوضح رشاد كغافى فى دراسته عن سيكولوجية حال اشتهاار المخدر لدى مدمنى المخدرات أن البناء النفسى لمتعاطى الحشيش قريب من البناء النفسى لمرضى الاكتئاب وعدم قدرة المدمن على التعامل مع الواقع وإقامة علاقات إنسانية ناجحة ودراسات كل من فوجل Vogel وماري نيسواندر Mary Nyswander وديهل Dihell حيث وصفوا شخصية مدمنى المخدرات بالانهيباطية والاكتئاب وضعف الإرادة . وقد وصف إيستون Easton المدمنين فى دراسته بأنهم يعانون من نوبات اكتئابية مشاعر الملل . وفى الدراسة التى أجراها إيفينسون Evenson على عينة من المسجونات المدمنات للمخدرات وطبق عليهن اختبار الشخصية المتعدد الأوجه، وقارن أداء المسجونات المدمنات بأداء المسجونات غير المدمنات بعد ضبطه لمتغيرات السن والجنس والذكاء، أثبتت الدراسة شيوع الأعراض

الاكتئابية لدى المسجونين المدمنين وشعورهن بالانقباض وانهباط الروح المعنوية. ركزا ذلك أكد هيكيتمان وجرشون Hikiman and Greshon إن معنى المخدرات المختلفة مضطربون إنفعالياً ويعانون من الاكتئاب، وتناول المخدر عادة ما يكون رغبة منهم في التخلص من هذه المشاعر الاكتئابية. وقد بين لاسكوتز Laswitz في دراساته عام ٦١، ٦٣، ٦٥، أن المراهقين المدمنين للمخدرات ذوي شخصية إنعزالية اجتماعياً، ويعانون من مشاعر عنيفة من عدم الاتساق، وعدم القدرة على إقامة علاقات اجتماعية ناجحة.

وبذلك يكون الاكتئاب وما يتضمنه من أعراض مختلفة من أكثر السمات المميزة لشخصيات مدمنى المخدرات وتنتشر بينهم هذه السمة بدرجة تفوق وجودها لدى الأشخاص العاديين.

(ج) بالنسبة لتغير الهستيريا :

فقد أوضحت نتائج البحث أن متوسط درجات المجموعة المدمنة على المخدرات في هذا المقياس (٢٧٧٣) مقابل (١٩٩٢) للمجموعة غير المدمنة جدول رقم . وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي وجود فرق ذي دلالة احصائية عند مستوي دلالة ٠١ ر بين العينتين في هذه السمة، مما يشير إلى شيوع هذا النوع من الاضطرابات العصابية لدى مدمنى المخدرات في هذا البحث. ولما كانت الهستيريا هي: الصراع الانفعالي المتميز بنقص النضج والاندناع والاتكالية، والقابلية للإحباط والتقلب الانفعالي، فقد أوضحت نتائج المقابلة والمقاييس الأخرى من هذا الاختبار (الشخصية المتعدد الأوجه) شيوع هذه الأعراض لدى مدمنى المخدرات في هذا البحث، فالمدمن يعاني من عدم النضج الانفعالي وتغير حالته الانفعالية تبعاً لوجود المخدر أو عدمه فهو يشعر بالمرح والانبساط نتيجة لتعاطي المخدر وتغيب هذه المشاعر بزوال الحالة التخديرية، كما تتميز شخصيته بالانصياع والاتكالية فقد أوضح كثير من المدمنين أن السبب

فى إدمانهم هو أصدقائهم، كما أنهم السبب أسوأ فى الاستمرار فى التعاطى. والمدمن غير المكيف مع الواقع ولكنه يتخذ من المخدر وسيلة للتوفيق بينه وبين هذا الواقع إلى جانب إتخاذ الأعراض الهستيرية كوسيلة للتكيف إذ يعتبر العرض الهستيري على الرغم من شدوذه ضرباً من ضروب التكيف الناقص مع الواقع.

وبذلك يدل البحث الحالى على شيوع الاعراض الهستيرية كسمة مميزة لمدمنى المخدرات فى هذا البحث ولكن الباحثة لا تستطيع الجزم بذلك نتيجة لما يأتى:

- قد تكون هذه الأعراض بينهم ناتجة عن تواجدهم فى بيئات يشيع فيها الانحرافات والاضطرابات النفسية، ونتيجة لما فى نفس المدمن من قصور وعجز وقابلية للإيحاء والاستهواء فهو يندفع فى تقليد سلوك إقرانه من هذه البيئات وقد يتسم سلوك البعض منهم بالهستيريا أو أعراضها أو أي اضطراب نفسى آخر.

- استمرار الفرد فى تعاطيه للمخدر يسبب له الإدمان الذي يزيد من نسبة شدوذه فيصبح الأنا لديه أكثر تدهوراً وضعفاً ويزداد سلوكهم اعتمادية واتكالية ونهار يبنياهم الشخصى، وقد أكدت ذلك ماري نيسواندر بقولها «إن إحساس المدمن الزائف» بالقوة والاقتدار الناتج من تأثير المخدر الذي يسهم بشكل خطير فى زيادة انهيارهم وانحرافهم وشدة بعقلهم بالعقار. ولم تجد الباحثة من الدراسات ما يشير إلى وجود هذا السوء من الاضطراب النفسى لدى مدمنى المخدرات ولكن أشارت الدراسات إلى شيوع الاضطرابات العصبية بوجه عام لدى مدمنى المخدرات ومن هذه الدراسات دراسة سعد زغلول المغربى حين أوضح أن عيبة المتعاطين للحشيش قد حصلت على درجات عالية فى مقياس الهستيريا. وكذلك دراسة فاروق عبد السلام الذى أكد فى نتائج بحثه على وجود مظاهر السلوك السيكوباتى والميول العصبية لدى مدمنى

الأفيون. ولكن الدراسات الاجنبية معظمها أوضح وجود ميول عصابية عامة وعلمت وجود هذه الأعراض بوجود السمات السوسيوبياتية وأكدت هذه الدراسات على ارتباط السمات العصابية لدى المدمنين ارتباطاً وثيقاً بالسمات السوسيوبياتية (*) المتعلقة بالإدمان.

(د) بالنسبة لتغير توهم المرض:

فقد أثبتت النتائج أن متوسط درجات المجموعة التجريبية (١٩٤٦)، مقابل (١٠٤٠) متوسط درجات المجموعة الضابطة وقد أوضحت نتائج التحليلات الاحصائية (جدول رقم ٥٦، ٥٧) وجود فروق ذات دلالة ٠.١ بين المجموعتين في هذه السمة. ولما كان توهم المرض هو القلق الزائد على الصحة والذي لا يستند إلى سبب، فيشكو الفرد غالباً من آلام واضطرابات يصعب تبينها، ولا يوجد لها أساس عضوي واضح. ومن خصائص الشخص المتوهم للمرض أن يكون غير قادر على معالجة مشكلات الراشدين ولا يستجيب لها باستبصار كافى. ولم تجد الباحثة أيأ من الدراسات التي تشير إلى وجود هذه السمة بصفة خاصة لدى المدمنين ولكنها أشارت إلى وجود الاضطرابات العصابية بصفة عامة دون تحديد لهذه الاضطرابات. وقد أثبت البحث الحالي وجود هذه السمة لدى عينة البحث من مدمنى المخدرات إستناداً على نتائج المقياس المستخدم في ذلك إلى جانب نتائج المقابلة. إذ كان المدمن دائماً ما يشير إلى أن إستمراره في تعاطى المخدر ناتج عن ما يشعر به من آلام مختلفة فكان دائماً يشكو من آلام غير واضحة مثل الآلام الصدرية وصداع مستمر وآلام فى العظام والمفاصل ونزلات البرد المستمر. إلخ. إلا أن هذه الأمراض لم تكن إلا بمثابة قناع زائف لتبرير ما يقومون به من سلوك

(*) السوسيوبياتية : هي الشخصية المريضة اجتماعياً والتي تنحصر اضطراباتها في مجال علاقاتها الاجتماعية، وخاصة الشخصية اللااجتماعية أو المعادية للمجتمع أو الشاذة جنساً.

يرفضه المجتمع، ومحاولة للتكيف مع هذا الواقع الذي يعيشون فيه. كما أوضحت نتائج المقابلة أن المدمن لا يستجيب لواقعه وما يعتره من مشكلات استجابة ناضجة ولكنه منسحب من هذا الواقع ودائم الهروب من مشكلاته ومثيراتها وأجداً في المخدر وسيلته في ذلك.

ولذلك تجد الباحثة أن توهم المرض سمة من سمات شخصية المدمن في هذا البحث، فقد يكون هذا العرض موجوداً لديهم من قبل الإدمان ونتيجة لضعف الأثنا لديهم ونقص نضجهم فإنهم يلجأون للمخدر كوسيلة للقضاء على هذه الآلام، أو قد تنتج هذه السمة بعد الإدمان لما يعانيه من أعراض عندما ينقطعون عن المخدر ويغالون في وصف هذه الأعراض لتكون بمثابة تبرير لعودتهم لسلوك تعاطي المخدرات.

(هـ) بالنسبة لتغير مستوي الطموح:

فقد جاءت نتائج الدراسة توضح أن متوسط درجات المجموعة التجريبية على استبيان مستوي الطموح المستخدم في الدراسة (٣٤ر٦٩) مقابل (٥٢ر٧٩) للمجموعة الضابطة (جدول رقم ٦٧). وقد أوضحت نتائج التحليلات الاحصائية عن وجود فروق بين المجموعتين وكانت هذه الفروق دالة عند مستوي دلالة ٠.١ ولما كان مستوي الطموح هو السمة التي تميز بين الأفراد في الوصول إلى مستوي معين يتفق والتكوين النفسي للفرد ويتحدد حسب خبرات النجاح والفشل التي مر بها، فقد أوضحت نتائج المقابلة للمجموعة التجريبية إنهم ليس لهم هدف في الحياة وأن خبراتهم تتراوح بين الفشل والاحباط نتيجة لعجزهم عن التكيف مع الواقع المحيط بهم، لما يحتويه الواقع الاجتماعي من حرمان وفقر إلى جانب إتمامهم بالاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب الذي ينطوي على التشاؤم وعدم القدرة على النظر إلى المستقبل نظرة تفاؤلية وانخفاض الروح المعنوية بينهم، وكذلك الأعراض الهستيرية من اتكالية وقابلية للإيحاء، فالباحثة ترى أن هذه الاضطرابات بمثابة عوامل مساعدة

على انخفاض مستوي الطموح لديهم، وقد يكون هذا الانخفاض فى مستوي الطموح موجوداً قبل الإدمان نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكدت كاميليا عبد الفتاح فى كتابها مستوي الطموح والشخصية على أن دراسات جولد Gold قد أظهرت أن للظروف الاجتماعية والاقتصادية المقبولة نسبياً تأثيراً على مستوي طموح الأفراد، فقد كانت درجات اختيارهم للأهداف ضعيفة نسبياً (سواء سلبية أو موجبة) وذلك بمقارنتهم بأولئك الذين يحصلون غالباً على درجات عالية موجبة. أما الأفراد الذين أعطوا درجات اختيار أهداف منخفضة كانت لديهم فروض طيبة، فقد كان دخل الآباء متناسباً وكافياً بحيث استطاعوا الالتحاق بالجامعة والتفرغ للدراسة، وعدم الالتحاق بعمل خلال الدراسة وفى هذا الصدد قد يلعب طموح الوالدين دوراً خطيراً فى زيادة طموح الأبناء، فالآباء الذين قد يتعرضون فى حياتهم للفشل الشديد فى تحقيق بعض أهدافهم، قد يعرضون عنها بتحقيقها فى أبنائهم فيدفعون دفعاً إلى ذلك، ويوفرون لهم من الوسائل المختلفة ما يوصلهم إليها.

وقد أكد هذه النتيجة سعد المغربى فى دراسته عن سيكولوجية تعاطى المخدرات حيث أشار إلى أن شخصية متعاطى المخدرات تقوم على محور واحد وهو كف العدوان، وأن هذا الكف ينسحب عن بقية نواحي الشخصية من ضعف الذات واختبارها، وانخفاض مستوي الطموح والسلبية. وكذلك أوضحت الدراسة التى قام بها الطبيبان ماركوفتش ومايرز Marecovitz and Mayers أن السمات العامة لمدمنى المخدرات هى الفشل المتكرر فى القيام بأي عمل أو واجب.

عقار الإدمان على السلوك :

حين يتأثر الانسان بالبيئة ويستجيب لها، فإنه لا يستجيب لها بجسمه فقط ولا بنفسه وعقله فقط، إنما يستجيب لها بأجمعه أي بنفسه

وجسمه فى آن واحد فالإنسان وحدة جسمية ونفسية متكاملة لا تتجزأ إن تأثير جانب منها أو اضطراب تأثرت له الوحدة كلها أو اضطربت. وقد سبق فى الفصل الثانى من هذا البحث أن أوضحنا ما تسببه المخدرات من آثار جسمية مختلفة تختلف باختلاف المخدر وطبيعته والكمية المتعاطاه وطريقة التعاطى. وسوف نشير هنا إلى آثار المخدرات على جوانب سلوكية أخرى.

١ - أثر المخدرات على بعض مظاهر السلوك العقلى:

هناك الكثير من الدراسات والكتابات التى حرصت على توضيح آثار المخدرات على بعض النواحي النفسية وقد اعتمدت هذه الدراسات على ما يلى:

١ - الملاحظات العامة.

٢ - الملاحظات الاكلينيكية.

٣ - الدراسات التجريبية على الحيوان والإنسان.

٤ - ملاحظات ذاتية.

٥ - دراسة تاريخ الحالة لبعض المدمنين.

٦ - طريقة المقابلة المقننة.

وسنعرض هنا لبعض الدراسات والكتابات التى تعرضت لأثر المخدرات على بعض أوجه السلوك العقلى مثل (الذكاء - التفكير - التذكر.. إلخ). ثم نذكر النتائج التى توصل إليها البحث الحالى.

فقد أوضح وولف Woolf أن التعاطى المزمن حتى ولو كان بكميات قليلة من المخدر فإنه يعود بأسوأ النتائج على الفرد، فالوظفون ورجال الاعمال الذين عرف عنهم النشاط تأثروا فى أخلاقهم وكفاءتهم الانتاجية وتحولوا - بفعل المخدر - إلى أشخاص يفتقدون إلى الحماس والارادة

اللازمة لتحقيق واجباتهم العادية المألوفة، وجعل المخدر منهم أشخاص كسالى سطحيين غير موثوق بهم، ذوي اتجاهات خشنة، ويظهر الاهمال واضحا في سلوكهم كما تنحرف مشاعرهم العادية ومداركهم الأخلاقية وكلها سمات لم تكن معروفة لديهم قبل التعاطي. ويضيف وولف Woolf أن المخدر ينقص من القيمة الاجتماعية للفرد ويقوده إلى التدهور العقلي والجسماني ويقود عند الفرد اتجاهات لا اجتماعية ويدهور قيمه الأخلاقية وينغزه من العمل ويخلق فيه الغفلة والاهمال حتى يصبح غير نافع للحياة الاجتماعية والاقتصادية المنظمة.

وقد توصل كوبرا وكوبرا Coperá and Coperá في دراستهما إلى أن الحشيش له تأثير على الوظائف العقلية، ذلك أن تأثير سموم المخدر تعمل تدريباً على إضعاف قوى المخ ووظائفه وعدة ما تنتهي بحالة ضعف عقلي. وهذا التدهور العقلي يؤدي إلى تدهور آخر في كفاءة الفرد الانتاجية وغيرها من وظائفه. ويشير كوبرا وكوبرا إلى أن المخدر له تأثير واضح على العمليات الذهنية التي تصبح غير منظمة، أو قد تتعطل جزئياً أو كلياً، وهذا يتضمن غيام الشعور أو الخلط العقلي. ويذكر أنه وجد أعراض عدم الترابط اللغوي على (٢٨٠) مائتين وثمانين حالة من الستمئة حالة التي درسها من مرضى الذهان المدمنين على الحشيش، كما يشير أيضاً إلى اضطراب التفكير بقولها «إن الحشيش يفسد أحكام الفرد على الأمور».

ويتفق بورهل Bourhill مع كوبرا وكوبرا في ذلك، من نتائج ملاحظاته الانتاجية التي توصل منها إلى أن الإدمان الطويل يؤدي إلى تدهور تدريجي للوظائف العقلية وأن سموم المخدرات تؤثر على الوظائف العقلية دون إضرار بالجهاز الجسمي.

وكذلك نتائج البحوث التجريبية لآثار الكحول على الكفاية العقلية والحركية والتي لا تدع مجالاً للشك بوجه عامل مهبط Depressant

للنشاط النفسى والجسمى، فحركات القلب والتنفس والتنفس تزداد. كما أن الكحول ينبغي أن يفرز من الجسم كغيره من العقاقير السامة للجسم ما يعادل (١٠سم^٣) تتأكسد كما تتأكسد النشويات والسكريات، ويبدو أن العمل يؤدي بسهولة أكثر إلا أن البيانات الدقيقة تبين نقصاً في الكفاية، وقد أوضحت نتائج بعض البحوث تدليلاً على ذلك منها:

(أ) ذكر كريبلين Kreaplin أن كميات كبيرة من الكحول سببت نقصاً مباشراً ونقصاً طويلاً المدى في العمليات العقلية كالفهم، والذاكرة والحكم.

(ب) ذكر ريفرز Rivers أنه يسبب نقصاً في الكفاءة في بعض العمليات كالكتابة على الآلة الكاتبة وعمليات الضرب العقلى.

(ج) ذكر دودج ويندكت Dodge and Bendict من نتيجة بحث مستفيض قاماً به عن الآثار الفسيولوجية والنفسية للكحول أن تأخر زمن الرجوع في منعكس الركبة قد زاد بمقدار (١٠٪)، وأن سمك العضلة عند انقباضها نقص بمقدار (٤٦٪) بعد تعاطى (٣٠سم^٣) من الكحول، كما أن مدة الكمون (المدة التى تنقضى بين المثير والاستجابة) فى الفعل المنعكس الوقائى لجلفن العين زادت بمقدار (٧٪) ومدى حركة الجفن نقص بمقدار (١٩٪)، والمقاييس الحركية نقصت من حيث الكفاية بعد تعاطى نفس الكمية كما يأتى:

١٤٪	العتبة الحسية لنبه كهربائى
١١٪	سرعة حركة العين
٩٪	حركة الأصبع (النقر)
٥٪	زمن الرجوع للعين
٣٪	زمن الرجوع للكلام

أما الذاكرة والترابط الحر فلم يتأثر إلا قليلاً إذ قلت الكفاية فيها بقدر بسيط بتعاطى (٣٠سم^٣) أو (٤٥سم^٣).

(د) درس هولنجورث Hollingworth زيادة على ذلك آثار الكحول على أوجه النشاط العقلى، وقد وجد أنه لم يحدث أي تسهيل فى الأداء، بتعاطى كميات مختلفة من الكحول. وقد طبق ستة اختبارات لوظائف عقلية مختلفة أثناء فترة العمل التى استغرقت أكثر من ثلاث ساعات صباحاً. وستة اختبارات أخرى طبقت بعد تعاطى الخمور بعد الظهر. وأظهر هولنجورث أن نقص الكفاية عادية يرتبط بكمية الكحول. وأظهر أن للوظائف العقلية المتشابهة تأثيراً متشابهاً، فالنشاط المنعكس، والنشاط الحركى يبدو أنهما يتأثران بدرجات أكبر من العمليات العقلية العليا. ووجد هولنجورث أن استعادة أوجه النشاط الحركى لحالته الأصلية يحدث بسرعة أبداً من أوجه النشاط العقلى كما أن هناك فروقاً فردية فى أثر جميع العقاقير والمنبهات وتدخين التبناك.

وما ينطبق على الكحول ينطبق على باقى المخدرات التى هى من صنف المهبطات كالحشيش وغيره من العقاقير الأخرى.

وقد أوضحت ماري نيسوندار Mary Neyswander أن الإدمان على الحشيش يؤدي إلى تدهور فى كافة الوظائف العقلية، بحيث ينتهى المتعاطى إلى حالة عامة من الغباوة والكلال العقلى. واتفق معها دايهل Dihell ، وفوجل Vogel . فى أن المخدرات تسبب تدهوراً فى وظائف الفرد العقلية.

وأكد ايفنسون ورزنبرج Evenson and Rozenberg أن مدمنى المخدرات ينتمون إلى فئات ذكاء دنيا.

وقد أشار ايمس Ames إلى أن هناك درجة من اضطراب التفكير تصاحب تعاطى المخدر ويشمل هذا الاضطراب الإدراك والذاكرة. وقد

اتفق مع ايمس ما يرجوس Mayer - Gross حين قال بأن الإدمان يؤدي إلى اضطرابات فى التفكير بحيث تبدو الأفكار مفككة، ويصبح الخيال غير مترابط لأن الإدارة تحت تأثير المخدر تفقد قوتها فى توجيه الفكر بالكيفية السليمة، ويعزو ايمس Ames عدم الترابط هذا إلى تدافع الكلمات وكثرة الأفكار على ذهن المتعاطى، هذا بالإضافة إلى رغبته فى التعبير عن هذه الأفكار الكثيرة المتدفقة.

وقد وجد ويكس وكولاينز Weeks and Collins فى بحوثهم عن أثر المورفين على الجهاز العصبى، أنه يحدث نقضاً فى القوى العقلية، ويثير الخيال ويقلل الاستجابة للأحداث الخارجية.

وقد أوضحت دراسة برمسون Abrmason أن عقاير الهلوسة تؤدي إلى اضطراب الإدراك واختلال فى التركيز والانتباه، وعدم القدرة على إدراك العلاقات المكانية، واختلاف فى الأداء الحركى، وتدهور عقلى. وأوضح سعد زغلول المغربى فى دراسته عن «تعاطى الحشيش» أن المدمنين فى عينة بحثه من نزلاء السجون كان يبدو عليهم ببطء الاستجابة وانخفاض مستوى الصفاء الذهنى وضعف القدرة على الاستنتاج والفهم، فضلاً عن ضعف القدرة على التركيز والانتباه، كما أنهم يبدو عليهم القذارة والاهمال لمظهرهم إذا قورنوا بغيرهم من نزلاء السجن.

وأوضحت دراسة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الحشيش يحدث اضطراباً فى الإدراك بحيث تطول المسافات وتختلف الأحجام، وتهتز حدود الأشياء، وتبدو الألوان أكثر نضاعة، ويمر الوقت ببطء، ويقل الانتاج، وتضطرب الذاكرة والانتباه والتركيز، ويضطرب الإدراك السمعى والبصري حيث يميل الإدراك نحو تضخيم المدركات، وأن اضطراب الإدراك السمعى أكثر شيوعاً من اضطراب الإدراك البصري، واختلال الشعور بالزمن والمسافة، واضطراب التفكير المتمركز فى تدفق الأفكار، وتفكك الفكر وعدم ترابطه، وبطء التفكير وصعوبته.

وقد أبدت هذه النتائج الدراسة التي قام بها سريف عن استخدام الحشيش في مضر حيث أشار إلى الإضطرابات التي تنتاب المتعاطى نتيجة للتعاطى المزمن.

وقد وصف أحمد عكاشة الاضطرابات التي تصيب مدمن الحشيش حيث قال « أن الحشيش يسبب زيادة القدرة الحركية مع اضطرابات في القدرة على تعرف الزمان والمكان، وإنعدام الإحساس بمرور الزمن، والاختلاط العقلي، وظهور الهلوسات السمعية والبصرية.

وقد أوضح فاروق عبد السلام أن المدمنين من عينة بحثه ينتمون إلى فئات ذكاء دنيا.

وقد أسفر البحث الحالي أيضاً عن إنتمام مدمنى المخدرات من عينة البحث إلى فئات ذكاء دنيا وذلك من واقع مقارنات متوسط درجات المدمنين على اختبار الذكاء المستخدم فى الدراسة ببيان المعايير الخاصة بهذا الاختبار، وكذلك بمقارنة أداهم بأداء المجموعة الضابطة (غير المدمنة للمخدرات) وقد أوضحت نتائج المقارنة عين وجود فروق بين المجموعتين ذات دلالة احصائية فى متغير الذكاء عند مستوي دلالة ٠.٠١ وجداول رقم (٤١، ٤٢) وكذلك أسفر البحث عن وجود اضطرابات فى التفكير لدى المدمنين أوضحتها نتائج المقابلة متمثلة فى تغير الأفكار نتيجة لتعاطى المخدر وأن هذا التغير «يعتمد بقدر كبير على التأثير الفارماكولوجى Pharmacological effect بقدر ما يعتمد على معتقدات الشخص ما يتوقعه من المخدر. وقد ظهر اضطراب الفكر بشكل واضح فى فساد الإدراك جداول رقم (٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧) حيث كان المدمنون يميلون إلى تضخيم المذكرات، وكذلك فى ضعف الذاكرة وقد اعتمدت هذه الدراسات على الملاحظات الاكلينيكية أو الدراسات التجريبية، وكذلك أوضح البحث الحالي ضعف القدرة على التفكير الابتكاري كواحدة من (القدرات العقلية) لدى عينة المدمنين، وذلك من خلال مقارنة نتائجهم

بنتائج المجموعة الضابطة، حيث أوضحت التحليلات الاحصائية عن وجود فروق ذات دلالة احصائية بين المجموعتين فى هذه القدرة، وأن هذه الفروق جميعاً كانت دالة يفسد الوظائف العقلية ويفسد علاقة الفرد ببيئته ولما كانت القدرة الابتكارية من القدرات التى تتطلب قدراً من الذكاء والسواء العقلى، وكذلك تتطلب أن يكون الشخص متوافقاً مع بيئته، لذا تتأثر هذه القدرة بهذا التدهور الذى يصيب الوظائف العقلية. فالقدرة الابتكارية تحتاج إلى شخص يستطيع أن يحيا متعاوناً ويرى ويتجاوب مع الآخرين، فالابتكار يشيع حاجة الشخص المبتكر فى تحقيق ذاته، وهذه القدرة تتطلب أن يكون الفرد متوافقاً مع بيئته يحيا متعاوناً ويستجيب ويتأثر لكل ما يدور فيها من أحداث قادر على التعاون مع الآخرين لتحقيق تطلعاته وأهدافه. إذ يرى سميث Smith أن التوافق السوي بالنسبة للإنسان هو فى الاسباع العام للشخص وليس فى إشباع دافع واحد وعاجل على حساب دوافع أخرى، فالشخص المتوافق متوافقاً ضعيفاً هو الشخص غير الواقعى والمحبط والمتعجل فى إشباع دوافعه وحاجات، والذي يميل إلى التضحية باهتمامات الآخرين وذلك لإشباع حاجة حالية شديدة. وفى حالة التوافق الانسانى الجيد بين الأفراد، تكون القوة الدافعة وراء الحاجة لتحقيق الهدف أو الادارة، لتحقيق الطاقة والقوة فى حالة توافق مع المجتمع، فهى تتكامل مع الدوافع الاجتماعية، وتؤدي إلى قدر معقول من الشعور بالرضا والارتياح، وذلك من خلال العمل على تحقيق الهدف والمجازة. أما فى حالة سوء التوافق الانسانى، فإن هذه القوة الدافعة التى تكمن وراء الحاجة لتحقيق الهدف تكون فى حالة غير طبيعية، وغير متلائمة مع الواقع، ولا ترتبط بالدوافع الاجتماعية، وتكون منعزلة، ولا تمت لها بصلة، كما أنه يترتب على ذلك شعور بالفشل وسلوك يتسم بعدم التوافق. وعلاوة على ذلك فإننا نجد أنه بينما يحاول التفوق فى الأنشطة التى يشعر بقدرته على التفوق فيها، فإننا على النقيض من ذلك، نجد أن الشخص غير المتوافق يبالغ فى

عملية التعويض هذه، أو يحاول التفوق من حيث يمكن ضعفه في محاولة لأنكار ذلك الضع). وقد أوضح برنارد بوسكا - Beranard Boduska في كتابة قول البورت Allpot بأن الشخص المتوافق « هو الشخص الذي يمكنه أن يواجه تلك العقبات، ولا يستسلم للاجباط، بالإضافة إلى قدرته على ابتكار وسائل مختلفة أقل اجباطاً تصل به إلى النفس الأهداف والأهداف البديلة » ولذلك فإن الأفراد المتمركزون حول أهدافهم يميلون إلى وضع أسلوب حياة من شأنه خفض الحبرات المحبطة إلى مستويات معتدلة ويمكنهم تحقيق ذلك عن طريق مراعاة الأمور التالية:

- قدرتهم على موائمة وتكييف مستويات طموحهم.
- قدرتهم على اختبار وسائل بديلة لتحقيق أهدافهم.
- قدرتهم على إنتقاء واختيار أهداف بديلة عندما يكون ذلك ضرورياً.

ويوضح عدم قدرة المدمن على التوافق مع بيئته نتيجة لما سببه له المخدر من تدهور في كافة وظائفه العقلية والحسوية، وعدم قدرته على تحقيق آماله وأهدافه، ضعف قدراته الابتكارية بشتى صورها ولم تجد الباحثة من الدراسات ما يشير إلى ضعف هذه القدرة لدى المدمنين ولكنها تستند في نتائجها على اتفاق الدراسات جميعها في أن الإدمان يؤدي إلى تدهور عقلي، وكذلك يشوه علاقة الفرد ببيئته، ويحط من أخلاقياته منعزلاً عن واقعه. كذلك أشارت معظم الدراسات إلى وجود علاقة بين القدرات الابتكارية والذكاء، ولما كان ذكاء المدمنين يتأثر بإدمانهم فمن البديهي أن تتدهور هذه القدرات لديهم.

أثر الإدمان على إنتاجية المدمن:

نتيجة لتدهور الوظائف العقلية الذي يصيب المدمن من تعاطيه للمخدر، يحدث تدهور في إنتاجية المدمن، وهذا التدهور يأخذ شكلاً

تدرجياً، حيث يقل الانتاج فى بداية الأمر، كما ينتقل الشخص المدمن إلى أعمال تقل فى مرتبتها الوظيفية عن وظيفته السابقة، ويقل أدائه تدريجياً نتيجة للكسل والاهمال فينتقل من عمل إلى عمل أن يفقد المدمن عمله نتيجة لكثرة التعطل والاهمال الزائد فينخفض الدخل أو ينعدم. وقد ينتهى به الأمر إلى تجارة المخدرات وذلك لسد حاجته ومطالبه ومطالب أسرته الضرورية، كما أن الاتجار فى المخدرات يحقق له رغبته فى الحصول على المخدر دون دفع ثمن لذلك، وهذه النهاية فى حد ذاتها دليل على تدهور إنتاجية المدمن أو انعدامها. وقد أوضحت هذه النتيجة فى جدول رقم (١٠٨) والذي يوضح قدرة المدمن على العمل فى حالة التخدير وعدمها، فقد اتفق جميع المذمنين على أن انتاجهم يكون متفوقاً وكثيراً فى حالة تعاطى المخدر، ويقل فى حالة عدم التعاطى. وهذه القلة التى يشيرون إليها فى الواقع ما هى إلا إشارة إلى إنعدام القدرة المطلقة على العمل أو إنعدام الانتاج كلية وذلك إذا ما قورن انتاج المدمن بانتاج شخص لا تعاطى المخدرات.

وقد قال بوكيه Pouquet فى هذا الصدد من واقع خبرته ودراسته عن الآثار الدائمة للادمان «إن عادة الادمان تنمى عند اصحابها اتجاهات سيئة مختلفة. فالمتعاطون الذين تأصل لديهم الامان - هم فضلاً عن عدم عنايتهم بأنفسهم - يمهلون أبسط قواعد النظافة فمظهرهم قذر غير مرتب، يرضون بأقذر وأسوأ الاماكن مسكناً لهم. كثيراً ما يلجأون إلى التسول» «وأن هؤلاء المدمنون يمثلون عبئاً غير منتج على المجتمع الذى يعيشون فيه، إن ممتلكاتهم ونفوذهم القليلة التى يحصلون عليها تنفق أغلبها على المخدر وتصبح فى خدمته، وإذا ما كانوا يمارسون التجارة فإنهم يمهلون فى واجباتهم المهنية وسرعان ما ينتهون إلى الفقر، ومع ذلك فإنهم لا يكترون بهذا المصير، ولا يترددون فى بيع أثاث منازلهم الضئيل وملابسهم التى يملكونها. وإذا كانوا متزوجين ولهم أبناء فسرعان ما

يصبحون غير قادرين على إعالة أسرهم، بل وقد يهملونها إلى الحد الذي يجعل الأسرة تتضور جوعاً. وإذا كانوا غير متزوجين فإنهم ينفقون كل دخلهم على المخدر. وتذهب تلك الأموال خسارة على المجتمع لأن معظمها ينتهي إلى جيوب المهرين الذين يجلبون المخدر إلى البلد الذي يتعاطاه، وهؤلاء عادة ليسوا مواطنين من نفس هذا البلد. وهؤلاء المدمنون عالة على المجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى يكفلونه مزيداً من النفقات، وذلك لأنهم قليلو العمل أو لأنهم لا يعملون. ومن ثم فهم بحكم دخولهم القليلة يتعرضون إلى سوء التغذية، كما يتعرضون إلى الظروف الصحية السيئة مما يؤدي بهم إلى المرض والتردد على المستشفيات طوال حياتهم - وبهذا يكفلون الدولة والمؤسسات العامة مزيداً من النفقات.

أثر الإدمان على السلوك الجنسي:

إن دراسة هذه النقطة ترتبط بما يشيع بين العامة من أن للمخدرات أثرهم في تنشيط قوي الفرد الجنسية، وأن تعاطى المخدرات يرجع في معظم الوقت إلى رغبة المتعاطى في تحقيق حالة الإشباع الجنسي الذي يتطلب إثارة الرغبة الجنسية وكذلك إطالة مدة العملية الجنسية، وأن تعاطى المخدرات يرجع في معظم الوقت إلى رغبة المتعاطى في تحقيق حالة الإشباع الجنسي الذي يتطلب إثارة الرغبة الجنسية، وكذلك إطالة مدة العملية الجنسية، وقد اتفقت معظم الدراسات أن المخدرات وخاصة المهبطة منها ليس لها علاقة بالجنس، بل تعمل بعكس ما هو شائع عنها، إلى خفض الدافع الجنسي والرغبة الجنسية والقدرة الحيوية وخاصة بالنسبة للمتعاطين المدمنين، وقد ذهبت بعض الدراسات إلى أن إدمان المخدر يؤدي إلى حالة من الضعف الجنسي. ويشير كوير وكوبرا Co-pera and Coperu في بحثهما عن «تعاطى الحشيش في الهند» أن استعمال الحشيش للأغراض الجنسية هو أحد الأسباب والدوافع الشائعة

للمتعاطي وأن هؤلاء الذين يتعاطون المخدرات من أغراض جنسية يغسرون
الاهتمام بالمخدر والجانب النفسي من متعاطي المخدرات تماماً، فبينهم معتقدون
أن تعاطي المخدر يحقق رضاء من القدرة الجنسية عند ذروي الضعف
الجنسي، والبعض الآخر وخاصة عند المتدينين يستخدم المخدر كأداة لحفض
الرغبات الجنسية أو كفها، كما وجدوا من نتائج دراستهما أن الحشيش
ليس له القدرة على الآثار الجنسية، ويؤكدان ذلك بتفسيرهما أن المخدر
يشير حالة غيام جزئي في الشعور قد تكون مصحوبة بصور ذهنية ذات
طبيعة جنسية توجه الفرد نحو الجنس، ومن ناحية أخرى فإن المخدرات
المهبطة تعمل على انهباط Depresses المراكز العليا الدماغية The higher
cerebral center وبالتالي يكف عملها كمراكز ضابطة، فتتطلق الرغبات
البدائية الحيوانية في حرية ومنها الرغبات والأفكار الجنسية، ومن ثم
يشعر المتعاطي الذين يستخدمون المخدر كمثير جنسي وغيرهم من
المتعاطين الذين يستخدمونه كمهبط للرغبة الجنسية بقولهما:

«إنه يمكن تفسير آثار المخدرات على أساس أن الناس ذوو الأخلاق
المنحطة يركزون أفكارهم على المذات وموضوعات الحب الجنسية، بينما
الناس ذوي الاتجاهات الدينية والأفكار المجردة والمعنويات يركزون
أفكارهم على ما هو بعيد عن النواحي الجنسية، وعلى ذلك فآثار المخدر
سواء أكانت انهباطية أم تنبيهية تصبح مجرد ظاهرة نفسية في كلتا
الحالتين». وينتهي الباحثان دراستهما على عينة المتعاطين، بأن المسرفين
منهم في التعاطي لمدد طويلة من حياتهم، يعمل المخدر على انهباط
وظائفهم الجنسية. وقرروا هذه النتيجة بما وجداه من أن نسبة الإخصاب
عند مدمني الحشيش أقل منها عند غير المدمنين، وأن كانت أعلى منها
عند مدمني الأفيون، كما أن نسبة العقم لدى المدمنين المسرفين في
التعاطي أعلى منها لدى غير المتعاطين.

وقد أوضح «بوكيه» Pouquet رأيه فيما يتعلق بأثر المخدر على

الناحية الجنسية، بأن التهيج الشبقي Erotic Excitation الذي يحدث خلال فترة التخدير لا يعدو أن يكون تهيجاً دماغياً -Cerebral Excitation ولا تحدث أي تغيرات فسيولوجية أخرى، وعلى ذلك فإن تعاطي المخدر المزمن يؤدي في النهاية إلى حالة من الضعف والهزال العام نتيجة لضعف شهية المتعاطي التي قد تصل إلى حد عدم تناول الطعام طوال اليوم، وهذه الحالة من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الرغبة الجنسية ثم إلى الضعف الجنسي، وقد تنتهي هذه الحالة إلى الانحراف الجنسي.

وقد وجد بورهل Bourhill في بحثه أن الحشيش يؤدي - مع التعاطي المزمن - إلى انهباط الرغبة الجنسية والوصول بالمتعاطي إلى حالة من العنة الجزئية أو الكلية. وقد أقام نتائج على الاعتبارات التالية:

(أ) أنه لم يجد بين قضايا المذنبين في جرائم جنسية، مذنباً واحداً أثبتت أنه كان متعاطياً لأي مخدر قبل قيامه بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي.

(ب) أشارت نتائج ملاحظاته الاكلينيكية والتجارب التي أقامها على وجود سلبية جنسية قاطعة على عينة بحثه.

(ج) أكد معظم المدمنين للباحث بشكل قاطع إنكار أن المخدر يعمل على الإثارة الجنسية بأية شكل من الأشكال.

(د) ذكر عدد من الحالات أنهم بعد تعاطي المخدر يضبحون عاجزين عن أداء العملية الجنسية.

وقد أورد «فوجل» Vogel نفس النتائج فيما يتعلق بعلاقة المخدر بالجنس وذلك في توضيحه الآثار الإدمان للمخدرات المبهطة والمسكنة بما يلي:

١ - إن التأثير الأساسي للمخدر هو تأثير إنباطي -Depressant effect-

fact وإن اختلفت درجة الانهباط تبعاً لكمية المخدر ودرجة الإدمان وشخصية المتعاطي.

٢ - إن حالة السرور والراحة Euphoria التي يشعر بها المتعاطي وقت التخدير، والتي يرغب في المحافظة عليها، بالإضافة إلى حالة الانهباط التي يحدثها المخدر المخدر، هذه الحالة تعمل على كف Inhibits أي صورة من صور النشاط الجسمي.

٣ - إن مدمني المخدرات المسكنة أو المهيطة عادة ما ينسحبون بعيداً عن الواقع ويعيشون داخل أنفسهم، وهم تدريجياً يتعدون عن أي نشاط طبيعي ليس مرتبطاً بتحقيق حاجاتهم في الحصول على المخدر وإشباع رغبتهم فيه.

٤ - إن هذه المخدرات من شأنها خفض أو إستبعاد الرغبة الجنسية Reduction or Elimination of Sexual Desire إلى الدرجة التي يستبعد فيها مدمني المخدرات من عداد السيكيوياتين الذين ترتكبون جرائم الأعتداء الجنسي.

وقد أوضح لاسكوتز Laskawitz في بحثه أن المدمنين تكون اتصالاتهم الجنسية مضطربة. وقد أيدى ذلك جنزبرج حيث وجد أن المدمنين في عينة بحثه لديهم انحرافات جنسية كبيرة.

وقد أوضح نايت Knight في بحثه أن مدمني المخدرات معظمهم يعانون من الضعف الجنسي وقد أرجع هذا الضعف إلى تعاطي المخدرات.

وقد ذكر د. تايين الماهي Tighan El Mahy أن إدمان المخدرات يؤدي إلى الضعف الجنسي، وأن ما يذكره المدمنين من أن المخدر يزيد من القدرة الجنسية أو الفاعلية، ما هي من وجهة نظر الباحث - إلا نتيجة لاضطراب الإدراك الزماني لدى المدمن فيجعله يتخيل أنه استمر في هذه العملية لمدة طويلة، وما هي إلا دقائق أو ثوان معدودة - وما هذا

الاحساس الأوهم تجمله إضطرابات الحس (خاصة اضطرابات الإدراك الزمنى).

وقد ذكر أحمد عكاشة أن الانتظام فى استخدام المخدرات ينقص هرمون الذكور بنسبة ٣٠٪ مما يؤدي إلى إصابة المدمن بالضعف الجنسي.

وقد وجد شيفرز من بحثه عن أثر المورفين على الناحية الجنسية، أن النشاط الجنسي لدى القردة المدمنة على المورفين يضعف عند منع المخدر.

وقد أوضح سعد المغربى فى بحثه «تعاطى الحشيش كمشكلة نفسية واجتماعية» أن كل ما يدور عن علاقة الحشيش بالجنس لا يعدو أن يكون مجرد شائعات عامة شعبية، لا تلبث أن تتحول بعد التعود على المخدر - إلى أكاذيب وخرافات، وأوهام ليس لها أدنى أساس من الصحة والواقع. كما لا يلبث أن يتحول المخدر من خرافة لذينة إلى حقيقة ضارة أليمة. وقد لخص الباحث نتائجه متبعاً الاعتبارات التالية:

١ - أنه يجب ملاحظة الفرق بين الرغبة والقدرة الجنسية، فقد توجه الرغبة دون القدرة على إشباع هذه الرغبة.

٢ - من الثابت فى الدراسات الفارماكولوجية والفسايولوجية أن الحشيش ليس من مخدرات أو العقاقير المنبهة إنما هو مسكن Sedative مهبط Depressant يعمل على انهباط القوي والامكانيات الحيوية والفسايولوجية للمتعاطى وخاصة فى التعاطى المزمن المسرف.

٣ - اتفقت معظم الدراسات على أن هذا المخدر لا يعمل على إثارة الرغبات الجنسية بل يعمل على كفها وانهباطها والوصول بالمتعاطى - فى حالة التعاطى المزمن - إلى حالة من العته الجزئية أو الكلية.

٤ - يؤدي الحشيش - كما أثبت الباحث والدراسات الأخرى - إلى حالة من ضعف الحيوية ونقص النشاط، مما ينعكس بدوره على النشاط الجنسي.

٥ - أن المدمنين الذين يقولون بأن الحشيش يطيل مدة العملية الجنسية، يمكن أن تفسر خبراتهم في ضوء الحقيقة الثابتة المتفق عليها، إتفاقاً تاماً من كافة الدراسات، وهي أن الحشيش يؤدي إلى إختلال الشعور بالزمن، وبالتالي يمكن أن يشعر المتعاطي بأن الوقت قد طال في أدائه للعملية الجنسية، كما أن يمكن أيضاً أن تفسر هذه الظاهرة في ضوء القابلية للاستهواء ذلك أن هذه الفكرة شائعة بين الناس شبيوعاً كبيراً، بحيث تعمل بالعفل على أن يتأثر بها المتعاطي ويشعر أن العملية الجنسية تطول باستخدام الحشيش.

٦ - أن الحالات التي تقول بأنها تشعر - مع الحشيش - بإثارة للرجبة أو الميل الجنسي، هذه الحالات يمكن أن تكون خبراتها صادقة، ولكنها على أية حال لا تحدث بسبب الحشيش كعامل مباشر من خصائصه إحداث هذه الحالة.

وقد أشار فاروق عبد السلام في بحثه «عن بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالادمان» إلى اضطراب السيادة الجنسية لدى مدمنى الأفيون، وقد بنى تفسيره في ضوء نظرية التحليل النفسى التي تري أن النمو الجنسي يمر بمراحل متتالية هي: المرحلة القمية، ثم المرحلة الشرجية، ثم المرحلة القضيبية، ثم فترة الكمون وأخيراً الجنسية التناسلية. ولما كانت لكل مرحلة من هذه المراحل السيادة في الفترة الزمنية من النمو المناسبة لها، فالمرحلة القمية لها السيادة عند الرضيع ومع النمو تنتقل إلى المنطقة الشرجية.. وهكذا. فقد وجد الباحث أن هناك اضطراباً في السيادة الجنسية لدى مدمن الأفيون، إذ أن الجنسية التناسلية المفترض أن لها السيادة قد تنحت إلى المنطقة القمية، ذلك أن الفم قد أصبح من جديد هو مصدر الاشباع الوحيد الكامل للمدمن. فإذا كان الطفل حديث الولادة لا يجد الرشباع الكامل الأمن خلال الفم، ولا يبدأ في الصراخ والعويل إلا بعد أن يستشعر آلام الجوع ولا يهدأ له بال

إلا من خلال الفم مرة أخرى دون أي قدرة على العطاء، فإن المدمن يعيش هذه المرحلة من النمو طوال فترة إدمانه، ذلك أن الأفيون مقدماً إليه من الفم يصيبه بالأشباع الكامل ويجعله في حالة أقرب إلى السكون منها إلى الحركة، وما أن يستشعر بدايات النقص في آثار الانتشاء وبداية التناقض في الأثر التخديري، حيث يبدأ البحث عن العقار غير مهمتهم بأي ظروف بيئية محيطة وغير قادر على أي تعديل لهذا الجوع الذي أصابه. كذلك فإن ما وجده (هاري هارلو) من أن الاتصال اللمسي للأُم له قيمة إثابية فطرية للطفل تحبّه متحقّقاً لدى المدمنين وذلك في تفضيلهم البقاء في مناطق تواجد الأفيون وحولها على تواجدهم في بيوتهم ووسط أفراد أسرهم. أي بقاهم بالقرب من أماكن تواجد الأفيون موجود تحت رؤوسهم أو في صدور ملابس نومهم، ذلك لأن الأفيون يقوم بدور الأم إذ أنه مصدر الإشباع لدى أفراد لديهم السيادة الجنسية للمنطقة الفموية. وقد ذكر الباحث أن ديناميات البنیان السيكلولوجي لدى مدمن الأفيون تتكون من ذات ضعيفة تتخذ من سلوك الأنسحاب ميكانيزما أساسياً لمواجهة المواقف، ذات تستغل الموضوعات الخارجية كوسائل إشباع، ويشيع فيها عدم الأمن الأنفعالي والاكتئاب السيوكبائية والميل رلى تدمير نفسها، ذات لديها اضطراب في السيادة الجنسية بحيث تحتل الزعامة أكثر المناطق تيكيراً وهي المنطقة الفموية.

وقد أسفر البحث الحالي من واقع أقوال المدمنين في المقابلة فيما يتعلق بأثر المخدر على الناحية الجنسية أن أداء المدمنين للعملية الجنسية يكون أفضل في حالة تعاطى المخدر جدول رقم (١١٢) كما قالوا أن أداءهم للعملية الجنسية يختلف في حالة التخدير عنها في عدم التخدير، وأن هذا الاختلاف يأخذ مظاهر عدة أوضحها جدول رقم (١١٣)، وفيما يتعلق بأثر الإدمان على الناحية الجنسية فقد أجابت نسبة كبيرة منهم أن التعاطى المزمن يؤدي إلى الضعف الجنسي، وكانت هذه الإجابة عامة

بالنسبة لمدنى المخدرات المختلفة، فالمخدر أيا كان نوعه وخصائصه يؤدي إلى تدهور القوى الجنسية وينتهى بهم إلى الضعف الجنسي.

وتؤكد الباحثة ما وجدته الدراسات السابقة من أن ما يذكره المدمنون عن ما يضيفه المخدر من شعور باللذة وإطالة فى مدة العملية الجنسية - ما هى إلا أقوال يحاول بها المدمنون تغطية واقع نفسى أليم يتسم بالقلق والتوتر وتشيع فيه الاكتئابية - ولما كانت فترة الإتصال الجنسي من الفترات التى تسبب لهم السعادة والارتياح، وتخدر مشاعر القلق لديهم، فإنهم يسعون لإطالتها حتى ولو بخداع أنفسهم، وأيضاً محاولة منهم لتبرير ما يقومون به من سلوك، وتغطية هذا السلوك بأسلوب منطقى مقنع يرضى به نفسه. أما عن قولهم بأن المخدر يودي إلى الفاعلية الجنسية والقوة فقد أجمع المدمنون على أن هذه الفاعلية تحدث فى بداية التعاطى وتتلأشى بعد فترة طويلة من الإدمان حتى يصير المدمن إلى الضعف الجنسي. وتري الباحثة أن هذه القوة أو الفاعلية الجنسية التى يقررها المدمنون فى بداية التعاطى لا ترجع بصورة مباشرة إلى المخدر نفسه بل إلى أسباب أخرى غير مباشرة لا ينتبه إليها المدمن وقد لاحظت الباحثة من أقوالهم الاعتبارات التالية:

(أ) إن الإثارة والقدرة الجنسية لدى المدمنين تحدث فى الفترات الأولى من الإدمان حيث يكون الفرد فى سن الشباب (قد أوضح البحث الحالى أن سن المتوسط الحسابى لسن المدمنين عند بداية التعاطى كان ١٨,٢٥ سنة) ومن طبيعة هذه السن الحيوية والنشاط، لذا فقد تكون هذه الإثارة ناتجة عن طبيعة السن وليست من المخدر.

(ب) إن إطالة المدة فى العملية الجنسية لم يستطيع المدمنون إثباتها أو تأكيدها، فهذه الإطالة ترجع إلى إختلال الإدراك لديهم وعدم قدرتهم على الشعور بالزمن شعوراً حقيقياً.

(ج) أضاف بعض المدمنين أن التعاطى المنتظم والزمن يجعل العملية الجنسية عملية عادية لا يحدث فيها أي تغير.

(د) أن شخصية مدمن المخدرات قابلة للإحياء والاستهواء وتتميز بالانصياعية والإتكالية، ومن الشائع خطأ بين العامة أن للمخدرات أثرها على فاعلية العملية الجنسية وقوتها، لذا يتبنى المدمن هذه الفكرة، ويتشبث بها كمحاولة منه لتقوية هذه العملية.

وقد أوضحت الكثير من الدراسات أن التأثير السيكولوجي للمخدر لا يرجع إلى طبيعة المخدر بقدر ما يرجع إلى نفسية الفرد وما يتوقعه من المخدر، والمدمن يتوقع من المخدر حسب آرائه ومعتقداته - أن يزيد من قدرته الجنسية، ولهذا فهو دائماً ما يعتقد في هذه القوة ويؤمن بها.

وبذلك يتبين أن للمخدرات تأثيرها الانهباطى على العملية الجنسية وتضعف قدرة الفرد الجنسية والتي تنتهى به إلى الضعف الجنسى كلية.

أثر الإدمان على السلوك الإجرامى:

أوضحت الكثير من الدراسات وجود علاقة بين الإدمان على المخدرات والجريمة أي أن الإدمان على المخدرات يساعد على إرتكاب الجرائم، ولكن هناك القليل من الدراسات التى نفتت هذه العلاقة.

ففى الدراسة التى قام بها « ميرل » Merrile وجد أن التخدير له آثار فعالة فى خلق الاتجاهات العدوانية وآثارها عند الفرد، بحيث كثيراً ما تدفعه هذه الاتجاهات إلى إرتكاب الجرائم وخاصة جرائم العنف. وقد أوضح كوبرا وكوبرا Copera & Copera فى دراستهما عن « تعاطى الحشيش فى الهند » أن الحشيش تستعمله الطبقات الفقيرة والتى ينتمى إليها أغلب مجرمى الهند، وتعاطى الحشيش بين الفقراء يزيد من فقرهم لأنهم ينفقون جزءاً كبيراً من دخلهم الضئيل على المخدر، وبذلك يواجهون الحاجة للنقود لإشباع حاجاتهم الضرورية الاخرى، وهم تحت تأثير هذا

الضغط يندفعون لإرتكاب جرائم السرقة وغيرها من الجرائم التي تشبهها في طبيعتها، وأن من رأيهما أن الحشيش يقوم بدور المشير والمشجع لاستعدادات إجرامية وعدوانية موجودة أصلاً عند المتعاطي.

وقد أوضح بريشر Brecher أن مدمن الأفيونات يؤدي به الإدمان إلى التوتر الشديد والعصبية والحساسية الزائدة لأي مؤثر مهما كان صغيراً وتغير الأفيونات من أخلاقيات الشخص من سىء إلى أسوأ ويصير سريع التأثير قريب الغضب، ويصيبه التدهور الخلقي، وكلها سمات من شأنها أن تساعد على إرتكاب الجرائم.

وقد ذكر «أحمد عكاشة» إن الإدمان على المورفين يؤدي إلى التدهور الخلقي والاضمحلال الاجتماعي.

وذكر «انسلنجر» Anslinger أن الألام الناتجة عن منع الهيروين تؤدي بالمتعاطي إلى إرتكاب الجرائم مثل السرقة وأعمال العنف، وأن سوء استخدام المنبهات يؤدي إلى خلق نزعات عدوانية وتهجمية لدى المدمن.

وقد إتفق كل من «ذيهيل» Dehill «فوجل» Vogel ، «ومساري نيسواندر» Marynyswander على أن الإدمان على الماريجوانا يؤدي إلى تدهور خلقي وإرتكاب الجرائم.

وقد وجد «ايفنسون» Evenson من دراسته أن المسجونين المدمنين أكثر عدوانية من المسجونين غير المدمنين.

وقد أوضح «فاروق عبد السلام» في بحثه عن بعض المتغيرات النفسية والإجتماعية المرتبطة بالإدمان «أن المدمنين من عينة بحثه كانوا يميلون إلى إرتكاب الجرائم، وذلك كما قرر المدمنون، وكانت هذه الجرائم مثل السرقة والرشوة والتزوير، والنصب والقتل، ويزداد احتمال إرتكابهم للجرائم في حالة عدم وجود المخدر، ويرجع ذلك إلى أنه في حالة الرغبة في الحصول على المخدر وبالتالي للإشباع، وتحت ضغط بزوغ الأعراض

المبكرة لإنسحاب المخدر، ومن واقع خبرة المدمن المتكررة لما يحدث فى حالة غياب العقار - فإن المدمن قد يلجأ إلى مثل هذه الأفعال الإجرامية، فغياب المخدر هو الدافع لهذه الميول الإجرامية، وقد ذكر الباحث أن الدراسات قد أثبتت أن شيوع الجريمة بين المدمنين مساو لشيوعها بين غير المدمنين، ولكنهم يتعرضون لمواقف ضاغطة (محاولة الحصول على المخدر، وسد حاجاتهم منه، وسد المطالب الضرورية الأخرى... إلخ). تزيد من درجة ميلهم إلى ارتكاب العدوان بدرجة كبيرة جداً.

وفى البحث الحالى قررت نسبة كبيرة من الأفراد عينة المدمنين، أن المدمن يميل إلى ارتكاب الجرائم أكثر من غير المدمن (جدول رقم ١١٠) وقد حددوا الجرائم بأنها غالباً ما تكون سرقة وإغتصاب، نصب، قتل، ضرب، وقد ذكروا أن هذه الجرائم يزداد احتمال وقوعها فى حالة عدم توافر المخدر وأثناء الشعور بمتابع المنع النفسية والفسيولوجية الشديدة.

وترى الباحثة أنه مهما اختلفت نتائج الدراسات فيما يتعلق بأثر الإدمان على الميل لارتكاب الجرائم، فإن جميعها قد قررت أن المخدر يسبب تدهوراً فى أخلاقيات الفرد ويقوده إلى الانحلال الاجتماعى، فإذا لم يكن المخدر هو السبب المباشر لارتكاب الجرائم كأن يكون المثير لها. وأن هذا التدهور الأخلاقى والاجتماعى يصاحب تعاطى المخدر ويزداد بتأصيل عادة الإدمان فى الفرد وينشأ نتيجة لما يلى:

١ - يبدأ التعاطى بكميات صغيرة لا تؤثر على دخله فى بادية الأمر، وقد يحصل عليها من أصدقائه أو، ومعارفه.

٢ - بالتوغل فى التعاطى تبدأ حاجته إلى زيادة المخدر وكذا زيادة عدد مرات تعاطيه، وبالتالي يزداد القدرة المنقطع من دخله للاتفاق على المخدر، وفى حالة ذوى الدخول البسيطة التى لا تكاد تفى بالتفقات الضرورية، فإن ما ينفق على المخدر يعنى عدم إشباع حاجات ضرورية له أو لأسرته، ومن ثم يحدث الاضطراب والخلافات بينه وبين أسرته مما

يعرضه إلى التفكير والانهيار الأسري، وغيره من مظاهر التدهور والانحلال.

٣ - بزيادة تعوده على المخدر واهتمامه به، يقل إهتمامه بالعمل نتيجة لما يحدثه المخدر من تدهور في وظائف الجسم الحيوية والوظائف العقلية فتزداد مشاكله إضطراباً، ويعمل المخدر على زيادة شذوذه، ويصبح أكثر حاجة إلى المال، وتسبب حاجته للمال هذه أن يتعرض لإرتكاب الجرائم.

٤ - أوضح البحث الحالي اتفاقاً مع الدراسات السابقة أن الإدمان نتيجة لما يسببه من تدهور وظائف الجسم الحيوية والوظائف العقلية لدى المدمن، وينعكس هذا التدهور على قدرة المدمن الإنتاجية وكفاءته إلى أن يصل إلى حد عدم القدرة المطلق على العمل ويصبح متعطلاً، وفي فترة تعطله عن العمل تضطر بعضهم الظروف الإتصال بمسئولية السيرة والمجرمين وتجار المخدرات. ويصبح أقل عمل إجرامى ممكن أن يقوم به هو الاتجار فى المخدرات، يقوده إلى أعمال إجرامية أخرى.

وبالتالى يمكن أن نقرر أن هناك علاقة وثيقة الصلة بين الإدمان على المخدرات وإرتكاب الأعمال الإجرامية وتنشأ هذه العلاقة فيما يسببه المخدر من آثار سيكولوجية وفيزيولوجية وإجتماعية تتجلى فى:

١ - إن المخدر يعمل على إطلاق وكشف الإتجاهات اللاشعورية والفرائز البدائية كما هى دون تعديل أو تهذيب، وذلك يمكن للمدمن من أن يقوم بأعمال تتعارض مع القيم الاجتماعية والمعايير الاخلاقية، فالتهدير يعمل على تحرير المراكز اللاشعورية من سيطرة المراكز المحيطة الشعورية.

٢ - أن حالة التهدير تؤدي إلى حالة تضخيم والمبالغة فى مشاعر الفرد وميوله وإتجاهاته إلى الحد الذي يجعل الفرد مستعداً للوقوع فى

الجرمة وخاصة إذا كان المدمن أصلاً من نوع الشخصيات التي لديها استعداد للعُدونية.

٣ - أن التخدير يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض مثل اضطرابات الإدراك والهלוسة والقابلية للاستهواء والاتكالية والانصياعية وكلها سمات من شأنها أن تساعد على حدوث الجريمة.

٤ - أن التخدير يثير في الفرد حالة غير عادية من التهيج مما يدفعه بسهولة إلى الوقوع في الجريمة.

وبذلك نجد أن للإدمان على المخدرات أثره السيء الذي يتجلى في كشف الاستعدادات العدوانية، وإطلاقها، ويعمل على زيادة الميول العدوانية لدى المدمنين وقد يخلق هذه الميول نتيجة لما يسببه من ظروف ضاغطة وتدهور في كافة وظائف الفرد.

أثر الإدمان على بعض أوجه السلوك الإنفعالي:

تثير المخدرات في مدمنيها إنفعالات مختلفة، وقد اتفقت جميع الدراسات في هذا الصدد على أن المخدرات تثير في نفوس متعاطيها مشاعر البهجة والمرح والإحساسات اللذيذة والنشوة والمرح. غير أن بعض الدراسات قد أشارت إلى وجود إنفعالات الغضب والخوف مما يؤدي إلى ارتكاب الجرائم ومشاعر من السعادة والسرور واللذة، كما يصف البعض المخدر بقولهم أنه يثير في نفوس متعاطيه حالة من البهجة والنشوة والرضا وهي حالات تشكل جاذبية كبرى عند المدمنين.

وقد أسفر هذا البحث أن المدمنين يشعرون بالفرفشة في حالة التخدير وتختفي هذه الحالة أثناء غياب المخدر (جدول رقم ١٠٣) ويشعرون بالتوتر، وتزول هذه الحالة بتعاطي المخدر.

ويمكن القول في هذا الصدد بأن حالة النشوة التي تحدث أثناء تعاطي المخدر تحدث نتيجة لمثيرات عديدة، بعضها يختص بطبيعة المخدر وما

يجلبه من آثار فسيولوجية تؤثر على الفرد، والبعض الآخر خارجي ينشأ من خلال جلسة التعاطي وماثيره في نفوس المتعاطين، حيث يوجد المدمن مع قلة من أصدقائه المتعاطين المقربين إلى نفسه وينحرف بهم الحديث المسرف في الخيال والطرافة، وهذا النوع من الحديث يثير عندهم حالة من المرح واللذة. كذلك ما يسببه المخدر من اختلال في الإدراك والمشاعر، وما يثيره ذلك من مفارقات تبعث على الضحك، وكذلك تضخيم الاحساسات الذي يصيب المدمن، كل هذا من شأنه أن يبعث عند المتعاطي أثناء التخدير حالة عامة من النشوة والراحة والسعادة وهذه هي السمات الغالبة عند المتعاطين أثناء التخدير. ويصبح المخدر هو أداة المدمن التي يعتمد عليها في تغيير حالته الانفعالية التي لا يملك القدرة على تغييرها. نتيجة لما يتسم به من نفس تفتقر إلى المبادأة وعجز عن مواجهة الواقع، والسلبية في التعامل، والعجز عن إشباع رغباته بصورة سوية. ويؤثر هذا الخلل في الانفعال على وظائف المدمن إذ يؤدي إلى هبوط مستوي النشاط الذهني أثناء الانفعال بحيث يكون أقل تماسكاً وجوده من مستوي نشاط الشخص الهاديء والضابط لنفسه في غير حالة التخدير، لأن الانفعال يؤدي إلى تلاشي مراقبة الإدارة للتفكير والعمل، وإلى تضائل مقدرة الشخص على النقد والتمحيص، وقد يكون التأمل قوياً غير أن الشخص مع شعوره بالنشوة المصاحبة لذلك يعجز عن ضبطها وتوجيهها، كما يعجز أن ينقل إنتباهه إلى مجال آخر، هذا فضلاً عن أن المتعاطي بعد زوال آثار التخدير، وبالتالي زوال هذه الحالة الانفعالية نراه لا يستطيع أن يتذكر تماماً وبدقة الحوادث التي مرت به في الظروف المصاحبة لانفعالات التخدير.

ملخص البحث

يتطلع مجتمعنا اليوم إلى ملاحقة ركب التقدم والتكنولوجيا في مختلف الميادين، وهذا يتطلب إزالة جميع المعوقات التي تحول دون ذلك. وتعتبر مشكلة الإدمان للمخدرات من المشكلات التي تعوق تقدم المجتمع كما وكيفاً. فالإدمان يلحق الأذى بكل من الفرد والمجتمع على السواء، فإلى جانب ما يسببه من تدهور في قوِي الفرد الجسمية، الحيوية، والنفسية بمختلف وظائفها، فإنه من جانب آخر يجعل من هذا المدمن عبئاً ثقيلاً على المجتمع لأنه يمثل فائض بشري يعطل عجلة الإنتاج وتقدم المجتمع.

وقد كانت ظاهرة الإدمان على المخدرات قد حظيت بالكثير من الدراسات التي تناولتها من نواحي مختلفة قانونية، فأرماكولوجية، سيكياترية... إلخ، إلا أن دراستها كمشكلة نفسية إجتماعية لم تحظ بالاهتمام الكافي وخاصة في مصر. فكان من الضروري إقامة دراسة نفسية إجتماعية لبحث جوانب هذه المشكلة المختلفة، كمحاولة عملية للتعرف على أبعادها، وتقديم المساعدة في حلها، والعون لمن وقع ضحية في براثن هذا المرض اللعين، إذ أنه قد قررت معظم الدراسات أن الإدمان على المخدرات شأنه شأن المرض النفسى الذي ينشأ من خلال تجمع مجموعة من العوامل منها ما هو نفسى كامن، ومنها ما هو بيئى يساعد على ظهور هذه الاضطرابات الكامنة فى صورة انحرافات نفسية شتى قد تكون إحدي صورها هو الإدمان على المخدرات.

وقد تناولت الباحثة فى الفصل الأول من هذه الدراسة، مشكلة البحث وقد حددتها فى الشخص المدمن نفسه دون الاهتمام بنوعية المخدر المدمن، ثم تعرضت لأهمية هذه المشكلة والتي انحصرت فى الإجابة على الفروض التالية:

١ - هناك علاقة بين انخفاض المستوى الاجتماعى الاقتصادى والإدمان على المخدرات.

٢ - انخفاض بعض القدرات العقلية أكثر شيوعاً لدى مدمنى المخدرات عن غيرهم من غير المدمنين.

٣ - هناك فروق ذات دلالة إحصائية فى بعض متغيرات الشخصية بين مدمنى المخدرات وغيرهم من غير المدمنين.

وتضمن هذا الفصل عرض لحجم المشكلة على المستوى العالمى مع الإشارة إلى الاتجاهات المختلفة لتعاطى المخدرات فى شتى دول العالم وأيضاً عرض لحجم هذه الظاهرة محلياً (فى مصر).

كما اشتمل هذا الفصل أيضاً على وصف لمتغيرات البحث وتوضيح التعريفات المختلفة لهذه المتغيرات، ثم وضع التعريفات الإجرائية المتخذ بها هذه الدراسة.

وقد قامت الباحثة فى الفصل الثانى من هذه الدراسة، بعرض للدراسة النظرية وقد احتوت هذه الدراسة على تعريف كافة أنواع المخدرات من حيث نشأتها التاريخية وتعريفاتها المختلفة، وآثارها الجسمية والنفسية، وما تتركه من سمات مميزة لدمنيها. كذلك اشتمل هذا الفصل على وصف للاتجاهات السيكولوجية المختلفة وكذلك الواجهة الاجتماعية التى اهتمت بتفسير ظاهرة الإدمان على المخدرات.

وفى الفصل الثالث تم وصف الدراسات السابقة، العربية والاجنبية المرتبطة بموضوع البحث وقدمت دراسة ناقدة لهذه الدراسات، وذلك بهدف الاستفادة منها فى الدراسة الحالية من حيث منهج البحث وخطته وتحديد العينة والأدوات المستخدمة، وأساليب المعالجة الإحصائية وطرقها وأهم النتائج التى توصلت إليها كل دراسة.

أما الفصل الرابع فقد تضمن وصفاً شاملاً لعينة البحث، من حيث مصدر العينة وطريقة اختيارها، حيث اشتمل هذا البحث على عينتين أحدهما تجريبية، والاخرى ضابطة، وكان حجم كل واحدة منهما ثمانية وأربعون (٤٨ فرداً) تم اختبارهم بطريقة عشوائية وذلك من الاماكن

المختصة بدمنى المخدرات بالنسبة للعينه التجريبية وبالنسبة للمجموعه الضابطه تم اختيارهم من بعض الوحدات الانتاجية المختلفه بمدينة الاسكندرية.

وتناول هذا الفصل أيضاً وصف للعينتين التجريبية والضابطه من حيث السن، الحالة الاجتماعية، المستوى السكنى، الحالة التعليمية. ثم تم وصف العينه التجريبية من حيث مهنة الزوجه، وعدد الأولاد، وعدد مرات الزواج، وعدد الزوجات الحاليات، ونوع المخدرات المدمنه حالياً، وعددها، وسن المدمن عند بداية التعاطى، ثم وصف الدافع للتعاطى فى أول مرة، ومدة الإدمان. وقد تضمن هذا الفصل أيضاً وصف لأدوات البحث وهى كما يأتى:

١- استمارة المقابلة المقيده من اعداد الباحثة.

٢- بعض مقاييس من اختيار الشخصية المتعدد الأوجه. بعد صياغتها باللغة العامية وهى مقاييس (توهم المرض، الهستيريا، الاكتئاب، الانحراف السيکوباتى) من اعداد لويس كامل ملكية وآخرون.

٣ - استبيان مستوى الطموح من اعداد كاميليا عبد الفتاح.

٤ - اختبار الذكاء المصور من اعداد أحمد زك صالح.

٥ - استمارة الاجتماعى الاقتصادى من اعداد الباحثة.

٦ - بعض اختبارات القدرة على التفكير الابتكارى:

وهى اختبارات (المرونة التلقائية، الاصاله، الطلاقة الفكرية) من اعداد عبد السلام عبد الغفار.

واشتمل هذا الفصل على الاجراءات التى قامت بها الباحثة بما فيها الدراسة الاستطلاعية ثم الاجراءات التى بها الدراسة الاساسية من حيث تطبيق الاختبارات، وتصحيحها...إلخ.

المراجع

أولاً- المراجع العربية:

- ١ - أحمد زكي صالح، ١٩٧٥، كراسة تعليمات اختبار الذكاء المصور، القاهرة: المطبعة العالمية ص ٤.
- ٢ - أحمد عزت راجع، ١٩٧٥، أصول علم النفس، القاهرة: المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر، ص ٢٢.
- ٣ - أحمد عزت راجع، ١٩٦٥، الأمراض النفسية والاجتماعية، أسبابها، علاجها وآثارها الاجتماعية، القاهرة: دار المعارف، ص ٦٩.
- ٤ - أحمد فايق، ١٩٨١، الأمراض النفسية والاجتماعية - دراسة في اضطراب علاقة الفرد بالمجتمع - القاهرة: مطبعة النسر الذهبي، ص ص ٤١٤ - ٤١٥.
- ٥ - أسعد رزق، ١٩٧٧، موسوعة علم النفس، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- ٦ - الادارة العامة لمكافحة المخدرات (١٩٨٢): التقرير السنوي، القاهرة: هيئة المطابع الأميرية، ص ١١٥.
- ٧ - الادارة العامة لمكافحة المخدرات ١٩٨٣، التقرير السنوي، القاهرة: هيئة المطابع الأميرية، ص ص ٢٣ - ٤٥.
- ٨ - الأمم المتحدة ١٩٧٦، مكافحة أساءة استعمال المخدرات، نيويورك: جينيف، ص ص ٢٦٠، ٢٦٨.
- ٩ - السيد محمد خيرى، ١٩٧٥، الاحصاء النفسي والتربوي، القاهرة: دار الفكر العربي.
- ١٠ - السكرتارية العامة للهيئة الدولية للشرطة الجنائية، ١٩٧١، تعاطي الشباب للمخدرات والمواد المؤثرة على النفس والعقل، القاهرة: المكتب الدولي العربي لشئون المخدرات.
- ١١ - المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ١٩٦٠، تعاطي الجشيش في الاقليم الجنوبي - التقرير الأول - القاهرة: منشورات المركز.
- ١٢ - المركز القومي للبحوث الاجتماعية، ١٩٦٤، نتائج المسح الاستطلاعي في مدينة القاهرة - التقرير الثاني - القاهرة: منشورات المركز.

- ٢٧ - سمير نعيم أحمد، ١٩٧١، خطر تعاطي المخدرات القائم في المنطقة العربية. القاهرة: المكتب الدولي العربي لشئون المخدرات.
- ٢٨ - سيد صبحي، ١٩٧٥، دراسات وبحوث في الشخصية - القاهرة: عالم الكتب. ص ص ١٧ - ١٩.
- ٢٩ - صبري جرجس، ١٩٥٧، مشكلة السلوك السيكوباتي. القاهرة: دار المعارف. ص ص ٥٦ - ٦٢.
- ٣٠ - عبد الحليم محمود السيد، ١٩٨٠، الأسرة وإبداع الأبناء - دراسة نفسية اجتماعية لمعاملة الوالدين في علاقتهما بقدرة الإبداع لدى الأبناء - القاهرة: دار المعارف.
- ٣١ - عبد السلام عبد الغفار، إبراهيم قشقوش، ١٩٧٨، دليل تقدير الوضع الاجتماعي الاقتصادي للأسرة المصرية - مجلة التربية - المجلد الأول - العدد الأول.
- ٣٢ - عبد المنعم الحفنى، ١٩٧٨: موسوعة علم النفس والتحليل النفسى. القاهرة: مكتبة مدبولي. ص ص ٢٤ - ٢٤٣.
- ٣٣ - عثمان لبيب فراج، ١٩٧٥، أضواء على الشخصية والصحة العقلية. القاهرة: مكتبة مدبولي.
- ٣٤ - فاروق عبد السلام، ١٩٨١، بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية المتعلقة بالإدمان - رسالة دكتوراه (غير منشورة) - كلية التربية - جامعة الأزهر. ص ١٠٤.
- ٣٥ - فؤاد البهي السيد، ١٩٨٠، علم النفس الاحصائي وقياس العقل البشري. القاهرة: دار الفكر العربي.
- ٣٦ - كاميليا عبد الفتاح، ١٩٦١، الاتزان الانفعالي وعلاقته بمستوى الطموح. رسالة ماجستير - كلية الآداب - جامعة عين شمس. ص ٦٢.
- ٣٧ - كاميليا عبد الفتاح، ١٩٧٢، مستوى الطموح والشخصية. القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة. ص ص ٧ - ١٢.
- ٣٨ - كاميليا عبد الفتاح، ١٩٧٥، كراسة تعليمات استبيان مستوى الطموح: القاهرة: النهضة المصرية ص ٣.
- ٣٩ - لويس كامل مليكة، محمد عماد الدين اسماعيل، عطية محمود هنا، ١٩٥٩، الشخصية وقياسها. القاهرة: النهضة المصرية. ص ١٥٥.
- ٤٠ - لويس كامل مليكة، محمد عماد الدين اسماعيل، عطية محمود هنا، ١٩٧٤، تعليمات الشخصية المتعدد الأوجه. القاهرة: النهضة المصرية. ص ٤٢.
- ٤١ - لويس كامل مليكة، ١٩٨٠، علم النفس الاكلينيكي - الجزء الأول - القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص ١٣١.

٤٢ - محمد أحمد غالي، ١٩٦٤، دراسة مقارنة للجانحين والعصابيين من حيث تنظيم الشخصية - رسالة دكتوراه (غير منشورة) كلية التربية - جامعة عين شمس.

٤٣ - محمد جميل منصور، ١٩٧٣، دراسة تحليلية للقيم المرتبطة بالعمل لدى المراهقين المصريين - رسالة دكتوراه (غير منشورة) كلية التربية - جامعة عين شمس.

٤٤ - محمد حلمي المليجي، ١٩٨٤، سيكولوجية الابتكار. الإسكندرية: دار المعارف. ص ٢٣٨.

٤٥ - محمد حلمي المليجي، ١٩٨٤، علم النفس المعاصر. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. ص ١٥٣.

٤٦ - محمد حلمي المليجي، ١٩٦٩، القياس السيكولوجي في الصناعة. القاهرة: دار المعرفة الجامعية، ص ٣٩.

٤٧ - محمد رشاد سيد كفاقي، ١٩٧٣، سيكولوجية اشتهاؤ المخدر لدى متعاطي المخدرات - رسالة ماجستير (غير منشورة) - كلية الآداب - جامعة عين شمس.

٤٨ - محمد رمضان محمد، ١٩٨٢، تعاطي المخدرات لدى الشباب المتعلم - رسالة دكتوراه (غير منشورة). - كلية الآداب جامعة عين شمس.

٤٩ - محمد نسيم رأفت وآخرون، ١٩٦٧، دراسة مقارنة عن شخصية المتفوقين والعاديين من طلبة وطالبات المدارس الثانوية العامة - المجلة القومية - المجلد الرابع - العدد الثاني.

٥٠ - محمود عبد الحليم منسي، ١٩٨٣، دليل استمارة المستوي الاجتماعي الاقتصادي، الإسكندرية: دار الناشر الجامعي.

٥١ - منير وهيب، ١٩٦٠، معجم مصطلحات علم النفس. بيروت: دار النشر للجامعيين. ص ٦٠.

٥٢ - مصطفى زبور، ١٩٦٣، تعاطي الحشيش مشكلة نفسية - من أعمال الحلقة الثانية لمكافحة الجريمة - القاهرة. المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. ص ص ٢٦ - ٣٩.

٥٣ - مصطفى فهمي، ١٩٦٧، الصحة النفسية في الأسرة والمدرسة والمجتمع. القاهرة: دار الثقافة.

٥٤ - مصطفى فهمي، ١٩٧٠، الانسان وصحته النفسية. القاهرة: الانجلو المصرية.

٥٥ - يحيى الرخاوي، ١٩٧١، علاج المدمنين صحياً - في الندوة الدولية العربية حول ظاهرة تعاطي المخدرات - القاهرة: المكتب الدولي العربي لشئون المخدرات.

٥٦ - يوسف مراد، ١٩٥٧، مبادئ علم النفس العام. القاهرة: دار المعارف. الطبعة الثالثة.

ملف - المراجع الأجنبية

- 1 - Anslinger H. J., and W. F., Tampling, 1966, The Murders, New York: Avonbooks Division.
- 2 - Ausubel; D.P., 1961, Causes and Types of Narcotics Addiction A Psychological View, New York, Psychiat (9).
- 3 - Belknad J. K., 1978, Drugs and Human Behaviour, In: Joltzman, W.H., (ed) Introductory Psychology in Depth-developmental Topics; New York: Harper's College Press .
- 6 - Becker, H.S., 1959, Becoming a Marijuana Users- A Psychological Approach - Morton: Mental Health and Mental Disorders. .
- 7 - Baul, J. C., and Snar R.W., 1969, A Test of Maturation Hypothesis Report to Opiate Addiction, New York; Bulletin on Narcotics, Geneva.
- 8 - Bernard, G. W. and Ritch, L. (1968), Psychodynamics of Narcotics Addiction, New York; Jacksonwill.
- 9 - Copera I.C., an Copera I.N., 1955, The Use of the Cannabis Durg India. Bulletin on Narcotics, Vol. L. New York: Geneva.
- 10 - Chein I., 1956, Narcotics use Among Juvenils. Social Work (Vol No. 1).
- 11 - Department of Health and Education and Welfare 1977, Cocaine-Washington, Research Minography No. 13.
- 12 - Donald Taffit D., 1957, Criminology, New York: The Macmillan Company. P 24.
- 13 - Dihell H.S., and Laton D. A., 1954, Health and Safety for Youth, New York: Mcrcrawhill.
- 14 - Ellinwood E. H., Smith W.G., and Vaillan G.E., 1960, Narcotics Addiction in Males and Females, New York: A Comparison International Journal of Addiction (1).
- 15 - Easton, 1965, Clinical Study on the Pathogenic and Personality Structure of Male Narcotics Addiction, New York. Hill Sid Hospital. Geneva.

16 - Evenson, M., 1964, Research With Female Drug Addicts at Prison for Woman, Attawa: Journal of Correction (6).

17 - Fort D. P., 1967, Drug as a Mean of Relieving Tension. New York: Holt Corp.

18 - Fort P. J., 1980, Heroin Addiction Among Young Men, New York: Geneva.

19 - Fith E. and Awinc, 1980, Drug Problem in the Sociocultural Context, A Basis for Polices and Progamme Planning, New York: Geneva.

20 - Hekimian L.J. and Grashon, 1966.Characterestions of Drug Abusers Admitted to a Psychiatric Hospital, Chicago.I.A.M.M.

21 - Hill, Haertzen and Glasser,1972, Psychological Aspects in Drug Addiction, In: David L. Sills (ed) International Encyclopedia of The Social Sciences, (Vol 3 and 4) New York: The Free Press.

22 - Hikilla I., and Schoolar; J.C., 1969: Heroin Use Among Multiple Drug Users-Its Diagnostic and Theraputic Significance. New York: International Conference on Drug Abuse-Geneva.

23 - Henden H., 1980, Psychological Theory of Drug Abuse. A research Monography No. (25) New York, NID.

24 - Huba, Wingar and Benter, 1979, Framework for an Interactive Theory of Drug Abuse. New York : NIDA. Amonography No.(24).

25 - Herbert, A., and Richard, 1981, A Dolscent Marijuana Abusers and Their Families, New York : National Institute of Drug Abuse.

26 - Halback, H., 1973, Defining Durg Dependence and Abuse. Berlin: Federal Republic of Germany.

27 - Jualith G., 1982, Abnormal Psychology Concepts. Issues. Trends, New York: Macmillan Publishing Co., INC.

28 - Jon S.L. and Laskawitz D., 1964. Rorschach Study of Adolescent Addicts Who Die of Over Dose A Sign Approach-Psychiatry Digest, Math Field.

29 - Knight, E., and Beoubrun. M.H., 1973. Psychiatric

Assessment of 30 Chronic Users of Cannabis and 30 Matched Control. New York: Amer. J. Psychiat.

30 - Kazdine E. A., Bellack A. S., and Micheal Hersen, 1980. New Prespective in Abnormal Psychology, New York; University Press.

31 - Lukoff L., 1980, Toward A Psychology of Drug Abuse. New York : Department of Health and Human Services.

32 - Lindsmith A.R., 1980, Basic Problem in the Social of Addiction and Theory, New York : W.H.O.

33 - Marlatt G.A., Rose F., 1980, Addictive Disorders, In: Alan S. Bellack and Bellack and Michell Hereson (eds.), New Perspec-
tive in Abnormal Psychology, New York, University Press.

34 - Mule S. J., and Brill H., 1974, Chemical and Biological Aspects of Heroin Dependence Ohio: CRC Press.

35 - Mehr J., 1983, Abnormal Psychology, New York: Winston and Harltrinehart.

36 - Mahi T., 1958, Durg Addiction-Cannabis India (Hashish), Kartoum: Faculty of Medicine.

37 - Merton R.K., 1968, Social Theory and Social Structure, New York: The Macmillan Company.

38 - Marcovitz E., and Myers H., 1944, Marijuana Addicts in the Army War: Chicago.

39 - Norback J., 1980, The Alcohol and Drug Absue-Yearbook Directory, New York: Vannorstrand.

40 - Nyswander, M., 1960, Durg Addiction, New York: Silvano.

41 - Nitezl M. T., Awinett R., Marian L., Macdonald and Wil-
liams S., Davidson 1977, Behavioural Approaches to Community Psychology, New York, Pergaman Press INC.

42 - Oakely S., Ray, M., 1974, Durg Society and Human Beha-
yious, Santi Louis: The C. V. Mosby Company.

43 - Okasha A., 1977, Clinical Psychiatry, Cairo: Egyptian Book Organization.

44 - Pescor M.J., 1980, "Physician Durg Addicts", In: Griffith

Edward and Awin Arfith (eds), *Durg Problem in the Sociocultural Context A Basis for Polices and Programne Planning*. New York, Geneva.

45 - Pescor 1953, *A Statistical Analysis of the Clinical Records of Hospitalized Durg Addicts*. Washington: Government Printing Office.

46 - Pouquet, R. J., 1951, *Cannabis*, New York; Bulletin on Narcotics. (Vol. II).

47 - Rathod H.N., 1968, *Prevelance and Early Detection of Heroin Abuse*. New York: Geneva.

48 - Rathod H.N., 1970, *Early Experience in the Life of a Narcotics User*, In: Tongue A. et al (eds), *Papers Presented to the International Institute on Prevention and Treatment of Drug Dependence* : Clausanne.

49 - Robert C., Kolondy 1975, *Research Issues in the study of Marijuana and Male Reporductive Physiology in Human* In: Jared R. Tintenberg (ed), *Marijuana and Health Hazards - Metho - dological Issues in Current Research* - London: Academic Press (INC.), .

50 - Saltman, Jules, 1970, *What We can do About Durg Abuse*. New York: Harvard University.

51 - Schultes R. E., et al, 1968, *Gannabis*. New York: Harvard University.

52 - Schaeffer, J., 1975. *The Significance of Marijuana in a small Agricultural Community*. Mouton: The Hauge and Paris.

53 - Smith D. E., 1967, *LSD - an Historical Perspective*, New York: Journal of Psychedlic Drugs.

54 - Smith D.E., Rose A. J., 1971, *LSD-Its Use Abuse- and Suggested Treatment*, New York: Journal of Psychedelic Drugs.

55 - Smith M., 1980; *Perceived Effects of Substances Use-A General Theory*, New York : Departmen of Health and Human Services.

56 - Smith H. D., 1977, "Drug Use and Abuse". In: Ruch and Zimbardo (eds) *Psychology and Life*, New York. Grow Hill Book, (Co. INC).

57 - Souief M. I., and Others, 1980. The Egyptian Study of Chronic Cannabis Consumption. Cairo: National Center for Social & Criminological Research.

58 - Souief M.I., 1971, The Use of Cannabis (Hashish) In Egypt - A Behavioural Study - Bulletin on Narcotics, Vol XXIII No.4.

59 - Souief M. I., 1973. Cannabis Ideology, A Study of Opinion and Beliefs Centering Around Cannabis Consumption. Bulletin on Narcotic (XXX 4). Cairo: UCSCR.

60 - Teasdal J. D., 1973, Drug Dependence, In: Eysenck (ed) Handbook of Abnormal Psychology, London, Pitman Medical.

61 - Trouton, D., and Eysenck H. J., 1961, The Effects of Drug on Behaviour, In: Eysenck H. J., (ed), Handbook of Abnormal Psychology, New York: Basic Book.

62 - Tinkleenberg I.R., Kappell, S., and Hallister, L.E., 1972, Marijuana and Alcohol, New York: Arch. Gen Psychiatry.

63 - Vogel V.H., and Murer D.W., 1957, Narcotics and Science Research, Chicago: ASSO.

64 - World Health Organization 1977, The Use of Cannabis, Technical Report, No. 478, Geneva: W.H.O.

65 - World Health Organization, 1967, Services for the prevention and Treatment of Dependence on Alcohol and Other Drugs, Techn. R. Ser. No. 363, Geneva: W.H.O.

66 - World Health Organization, 1969, Expert Committee on Drug Dependence, Sixteen Report-Tech. R. Ser. No. 407. Geneva W.H.O.

67 - World Health Organization 1978, Expert Committee on Drug Dependence. Techn. R. Ser. No. 618. Geneva: W.H.O.

68 - World Health Organization 1973, Expert Committee on Dependence, Tech. R. Ser. No. 516. Geneva: W.H.O.

69 - World Health Organization 1975, Expert Committee on Drug Dependence, Techn R. Ser. No. 560. Geneva: W.H.O.

70 - World Health Organization, 1970, Expert Committee on Drug Liable to Produce Dependence. Techn. R. Ser. No. 312. Geneva: W.H.O.

71 - World Health Organization, 1965, Expert Committee On Drugs Liable to Produce Addiction, Tech. R. Ser. No. 116, Geneva: W.H.O.

72 - Wikler A., 1962, Opiates Addiction - A Psychological and Neurophysiological Aspects in Relation to Clinical Problem, Washington.

73 - Walker and Kenon, 1980, Aspects of Alcohol and Drug Dependence, London: Pittman Medical.

74 - Winick C., 1974, A Sociological Aspect of Drug Dependence, Ohio: CRC Press.

75 - Wikler A., 1970, A Dynamic of Drug Dependence Implications of A Conditioning Theory for Research and Treatment, New York: Arch Gen Psychiat.

76 - Woolf, P. O., 1948, Marijuana In Latin America, Washington: Lincor Press.

77 - Winick C., 1980, A Theory of Drug Dependence Based on Role, New York : Department of Health and Human Services.

78 - Yolles S. F., 1968, Statement on LSD-Marijuana and Other Dangerous Drugs - Washington, United Press International.

79 - Zhukovski and Azilevskaya 1975, Opium Poppy, Newdelhi: Amerind Publishing Co. PVT, LTD.

فهرس الكتاب

٥	إهداء
٧	مقدمة
١٥	الفصل الأول
١٧	مقدمة
٢٠	الحجم العالمي للمشكلة
٢٧	الحجم المحلي للمشكلة
	الفصل الثاني
٤٥	الدراسة النظرية
٤٧	تعريف المخدرات
٥٠	تأريخ تاريخية عن المخدرات
٧٧	الواجهة السيكولوجية للإدمان
٧٧	النظرية السلوكية للإدمان على المخدرات
٨٣	نظرية التحليل النفسي للإدمان على المخدرات
٨٧	الواجهة الاجتماعية للإدمان على المخدرات
٩٤	سمات المدمنين الاجتماعية
٩٨	نواظم التعاطي

الفصل الثالث

١٠١ الدراسات السابقة

١٠٣ الدراسات العربية

١٤٧ ثانياً: الدراسات الأجنبية

الفصل الرابع

العوامل النفسية والاجتماعية المؤدية

١٦٣ لإدمان المخدرات وأثارها على السلوك

١٦٥ أهمية البحث

١٦٥ تحديد مشكلة البحث

١٦٦ حدود الدراسة

١٦٦ متغيرات البحث

١٩١ بمنهج البحث

١٩١ أدوات البحث

١٩٣ عينة البحث

الفصل الخامس

٢٦٥ نتائج البحث

٢٦٧ اختبار صحة الفروض

٢٨٥ نتائج المقابلة الشخصية

٣٢٢٢ سمات المدين كما أوضحتها المقابلة الشخصية

الفصل السادس

٣٢٤٥ تفسير النتائج

٣٢٢٧ تفسير نتائج الفروض

٣٢٤١ أثر الإدمان على السلوك

٣٢٨٥ ملخص

٣٢٩٩ المراجع

